

作用的同时,应该对中医药对其它并发症是否有治疗作用,治疗作用的大小,甚至副作用等做同步的研究。

5 参考文献

- 1 贾文华. 中医治疗糖尿病性肢端坏疽的临床观察. 中医杂志, 1996, 37(9):552.
- 2 刘祖高. 糖尿病足 62 例临床小结. 湖北中医杂志, 1994, 14(4):8.
- 3 谢文秀, 屈国云, 伍汉文, 等. 糖尿病足 16 例中西医结合治疗分析. 中西医结合杂志, 1990, 10(9):554.
- 4 郭国臻, 张德义, 赵建辉, 等. 中西医结合治疗糖尿病肢端坏疽 20 例. 中西医结合杂志, 1990, (3):165.
- 5 章士美. 中西医结合治疗糖尿病足 12 例报告. 江苏中医,

1995, 16(5):214.

- 6 潘保华, 杨庆运, 李蓉. 温经活血法治疗糖尿病并发坏疽. 中医研究, 1993, 6(3):27.
- 7 张万能. 中药煎液浸泡治疗糖尿病性趾端坏疽 20 例. 浙江中医杂志, 1990, 25(3):176.
- 8 池芝盛. 糖尿病微血管病变的发病机理. 国外医学内科分册, 1978, 5(8):348.
- 9 刘德辉, 朱西娥, 郑世荣, 等. 山莨菪碱治疗前后糖尿病足坏疽病人的甲皱微循环变化. 微循环学杂志, 1994, 4(4):16.
- 10 唐祖宣, 王云恒, 高华林, 等. 30 例消渴病脱疽治疗前后的微循环变化和临床疗效观察. 上海中医药杂志, 1987, (9):8.

祛毒汤熏洗治疗痔疮 220 例临床观察

陶淑芬* 孙家欣*

痔疮是临床常见病,其发病率较高,我们以中医经验方祛毒汤为主,治疗痔疮 220 例,取得满意疗效,现总结报告如下。

1 临床资料

治疗组病人共 220 例,男性 156 人,女性 64 人;最大年龄 72 岁,最小年龄 16 岁,20~50 岁占 77%。炎性混合痔 93 人(42.3%),血栓痔 78 人(35.5%),嵌顿痔 49 人(22.3%)。病程计算以本次症状发作起到就诊时止,病程最短 1 天,最长 5 天,平均 2.1 天。对照组 90 人,男性 60 人,女性 30 人;最大年龄 80 岁,最小年龄 15 岁,20~50 岁,占 70%。病程最短 0.5 天,最长 6 天,平均 2.5 天。炎性混合痔 42 人(6.7%),嵌顿痔 18 人(20%),血栓痔 30 人(3.3%)。

2 治疗及观察方法

祛毒汤药物组成:马齿苋 10g,甘草 10g,五倍子 10g,防风 10g,枳壳 12g,侧柏叶 12g,芒硝 30g(另包),当归 12g,红花 6g,川芎 15g。以上药除芒硝外,余均研细末装入小布袋中备用,使用时将药袋和芒硝放入盆中,加入开水 2500ml,浸泡 30 分钟后,让患者坐入药液中熏洗患处,熏洗时间为 20 分钟。每日 1 剂,每剂熏洗 2 次,早晚各 1 次,第 2 次使用时只需将药液加温即可,熏洗后患处涂以马应龙痔疮膏,7 天为一疗程。对照组选用 1:5000 浓度的高锰酸钾溶液坐浴,每日 2 次,熏

洗后患处涂以马应龙痔疮膏,7 天为一疗程。

3 结果

经临床观察,优:治疗组中,炎性混合痔、嵌顿痔、血栓痔分别为 52 例(55.9%)、11 例(22.4%)、42 例(3.8%),总计 105 例(47.7%);对照组分别为 12 例(8.6%)、2 例(11.1%)、5 例(16.7%),总计 9 例(21.1%)。良:治疗组 3 类痔分别为 21 例(2.5%)、18 例(6.7%)、21 例(6.9%),总计 60 例(27.2%);对照组分别为 10 例(23.8%)、3 例(16.7%)、6 例(20%),总计 19 例(21.1%)。中:治疗组 3 类痔分别为 8 例(8.6%)、12 例(24.5%)、9 例(11.5%),总计 29 例(13.2%);对照组分别为 12 例(28.6%)、15 例(83.3%)、10 例(33.3%),总计 27 例(30%)。差:治疗组 3 类痔分别为 12 例(12.9%)、8 例(16.3%)、6 例(7.7%),总计 26 例(11.8%);对照组分别为 8 例(19%)、8 例(44.4%)、9 例(30%),总计 25 例(27.8%)。经观察,治疗组与对照组对炎性混合痔、嵌顿痔、血栓痔均有疗效,但两组比较,前者疗效好,特别是客观症状缓解更佳($P<0.05$)。

4 讨论

在治疗中,选用枳壳、防风理气祛风,当归、红花、川芎活血化瘀,侧柏叶、五倍子收敛燥湿,活血止血,芒硝清热解毒消肿;配以甘草、马齿苋以清热解毒,诸药协助,使肛门局部气血运行,疼痛消失,水肿缓解,出血得以停止,有效地缓解了症状。传统用药是采用煎汤熏洗,病人使用时多有不便,因此,采用将药研成粗末,开水冲泡后熏洗,易被病人接收,其疗效可靠。

* 中国中医研究院广安门医院,北京宣武区北线阁(100053)

收稿日期:1997-09-04;修回日期:1998-02-16