

活血利水法在眼科的应用

湖北省宜昌市中医院 秦大军

根据“血不利则为水”(《金匱要略·水气篇》)的理论,运用活血利水法治疗眼科水肿证,疗效显著,现举隅如下:

一、眼型 Graves 氏病

该病为眼科罕见病,表现为眼睑退缩、迟落,眼球突出,眼肌麻痹等,甲状腺功能试验正常。原因未明,病理基础为眼眶组织浸润水肿。中药治疗尚无报道,笔者单用中药治愈一例。

例一:余××,男,40岁。视物呈双影一个月余,先后在两家医院诊为眼型 Graves 病,治疗无效,于1987年12月8日到我院求治。

检查:视力右1.5,左1.5;双眼同时注视时有复视,复象检查左颞下方向复象距离最大,分析结果为左下直肌麻痹;双眼上睑轻度回缩和迟落,以左眼为明显;眼球突出度右19毫米,左21毫米;余部无阳性体征。甲状腺功能检查正常。诊断为眼型 Graves 氏病。治宜活血利水。处方:泽兰10克,益母草30克,桃仁15克,川牛膝15克,猪苓15克,泽泻15克,车前子15克,木通15克。水煎服,每日一剂。连服五剂,复视消失,复象分析也正常,上睑不回缩和迟落,眼球突出度右17毫米,左17毫米。随访五个月病情稳定。

二、原发性青光眼

原发性青光眼包括开角和闭角,闭角为房角狭窄闭塞,开角与小梁网阻塞相关,二者均导致房水积聚。房水积聚属水湿停聚范畴,房角和小梁网阻塞属瘀证范畴,二者因果关系可视为血瘀水肿,故治宜活血利水。

例二:李××,男,67岁。左眼胀痛伴

视力减退半年。先后在两家医院诊治,诊断未明,服用明目地黄丸等中成药和维生素类无好转,且逐渐加重。于1987年6月24日入我院。

检查:左眼视力0.2,眼压59.10毫米汞柱,无睫状充血,角膜无水肿,前房不浅,瞳孔不散大,视盘生理凹陷深大, $C/D \approx 0.8$,有动脉搏动,视野向心性缩小,以鼻侧为甚。诊断为慢性单纯性青光眼。治宜活血利水。处方:泽兰10克,丹参30克,鸡血藤30克,乌药10克,葛根20克,桂枝10克,槟榔10克,猪苓10克,泽泻10克。水煎服,每日一剂。同时用0.5%噻吗心安眼药水,每日滴一次,一次一滴。每周测一次眼压,至第二周时眼压降至21毫米汞柱以内,视盘动脉搏动消除,视力增至0.3。至一个月时视力增至0.5,视野扩大约5度,眼压稳定。停用噻吗心安眼药水,仅服前中药,仍每日一剂,治疗27天,眼压在正常范围内,视力增至0.7,视野扩大约10度,视盘动脉搏动未再出现,杯盘比未变。

三、中心性浆液性视网膜脉络膜病变

该病多发于青壮年,表现为视力下降,视物变形或小视,黄斑部水肿和渗出,认为与血管痉挛相关。血管痉挛属血瘀证范畴,病机属血瘀水停。运用活血利水法有肯定疗效,治疗数十例,多在一个月內治愈。

例三:牛××,男,38岁。右眼视物模糊,变形,变小。在××医院诊为中心性浆液性视网膜脉络膜病变,住院半个月,用强的松、青霉素、维生素等不见好转,于1986年10月10日转诊我院。

检查:右眼视力0.2,黄斑部水肿和点状

渗出, 中心凹反射消失。治宜活血利水。处方: 丹参 15 克, 红花 10 克, 鸡血藤 15 克, 当归 10 克, 茺蔚子 10 克, 茯苓 10 克, 泽泻 10 克, 猪苓 10 克, 车前子 10 克, 桂枝 10 克, 白术 10 克, 木香 10 克。水煎服, 每日一剂。连服 10 天, 视力增至 1.5, 黄斑部水肿消退, 渗出吸收, 中心凹反射出现。

四、体会

活血利水法在眼科应用范围较广, 除上述病种外, 还可佐用于其他多种眼病。如急性虹膜睫状体炎、视盘脉管炎、视乳头炎、角膜炎、眼睑水肿、巩膜炎以及眼眶病变等都不同程度的存在水肿或渗出, 佐用活血利水法往往收效更佳。对一些原因不明的疑难病, 只要其病理基础有水肿或渗出, 用活血利水法可以收到出乎意料的效果。

活血化瘀法治疗肝硬化患者的血浆 β -TG 含量测定及其临床意义

上海第二医科大学附属瑞金医院 王冠庭* 周玉琴* 史爱兰**

β -血小板球蛋白(简称 β -TG) 是一种血小板特异性蛋白。测定其含量对许多疾病的诊断、疗效观察具有重要意义。本文测定肝炎后肝硬化患者应用活血化瘀法治疗前后的血清中 β -TG 含量, 并以正常人血浆作对照, 探讨肝内血液循环的改善及其临床意义。

一、病例选择: 本组共 39 例, 均为肝炎后肝硬化患者, 男 29 例, 女 10 例, 年龄 32~50 岁 32 例, 51~60 岁 7 例。临床表现肝功能显著异常, 白/球比例倒置, HBsAg 均为阳性, 所有患者均有不同程度脾脏肿大, 门静脉高压及腹水, 本组有 17 例经中药活血化瘀法治疗, 22 例不用活血化瘀法治疗。另 41 例年龄相仿的正常人作为对照组。

二、血浆 β -TG 测定方法: 静脉采血, 弃去最初 2 ml 血液, 抗凝剂采用 EDTA 苯碱-PGE 混合液, 摇匀, 置于冰浴内, 经离心后吸出上层血浆 0.5 ml, 以上海瑞金医院核医学放射免疫测定方法测定血浆中 β -TG 含量。

活血化瘀方药: 小生地 15 克, 紫丹参 15 克, 地鳖虫 12 克, 赤芍 12 克, 当归 10 克, 桃仁 12 克。肝功能异常加黄精、姜黄、厚朴等; 脾脏肿大加炙鳖甲、穿山甲等; 气虚加黄芪、党参; 腹水加大腹皮、云苓、葫芦瓢等。每日服 1 剂, 每例连服 2~3 个月。

测定结果: 正常对照组血浆 β -TG 为 23.4 ± 7.3

ng/ml。22 例未经活血化瘀法治疗的肝硬化患者血浆 β -TG 含量明显增高, 其平均含量为 49.83 ± 31.84 ng/ml, 而活血化瘀组 17 例患者血浆 β -TG 平均含量显著降低, 为 21.37 ± 9.17 ng/ml, 未经活血化瘀治疗组血浆 β -TG 含量明显高于治疗组及正常对照组。治疗组与正常对照组之间无显著差异。

讨论: 本文测定结果表明, 肝硬化患者血浆 β -TG 含量明显高于正常人, 而经活血化瘀法治疗后, 其含量明显降低, 与正常对照组无差异, 说明肝硬化患者 β -TG 增高, 而活血化瘀药能使之下降。肝硬化患者血浆中 β -TG 含量明显增高, 可能由于肝硬化肝细胞坏死, 肝脏纤维组织增生, 肝内血液循环障碍, 加之门静脉高压, 门静脉血流缓慢等因素引起。笔者认为, 血瘀的含义有二: 一为血流受阻; 二是某些凝血物质增多, 促使肝内血液粘性增加血流不畅, 故肝硬化患者 β -TG 增多可能为血瘀因素之一。活血化瘀药使 β -TG 含量下降, 可减轻肝脏血流瘀滞, 改善肝脏血液循环, 促使肝细胞再生, 从而改善肝脏功能。本组活血化瘀组经治疗后大部分患者肝功能有不同程度改善, 临床症状好转, 腹水消失或减轻, 血浆 β -TG 含量均降至正常范围亦证明了此点。

* 内科 ** 核医学科