

本文血浆 NE、E 含量测定采用公认可靠的 HPLC—ED 检测法,而 TCD 检测 MCA 血流速度能客观、定量反映颅内血流动力学变化情况,且具有无创、价格适宜的优点,故认为上述 4 项指标有在中医临床推广应用的可能。

4 参考文献

- 1 金益强, 朱崇学, 刘爱平, 等. 中医肝病五类证候血浆去甲肾上腺素和肾上腺素含量及诊断意义. 湖南医科大学学报, 1997, 22(1): 29.
- 2 金益强, 黎杏群, 陈国林, 等. 肝阳上亢证本质研究. 中西医结合杂志, 1988, 8(3): 136.
- 3 胡随瑜, 刘湘华, 刘尚明, 等. 肝阳上亢证患者经颅多普勒超声及辨证诊断价值的初步研究. 湖南医科大学学报, 1997, 22(2): 131.
- 4 陈贵廷, 薛赛琴. 最新国内外疾病诊疗标准. 北京: 学苑出版社, 1991: 710.

- 5 中国人民解放军总后勤部卫生部主编. 临床疾病诊断依据治愈好转标准. 北京: 人民军医出版社, 1991: 58, 407.
- 6 王新德. 1986 年中华医学会第二次全国脑血管病学术会议修订各类脑血管病诊断要点. 中华神经精神科杂志, 1988, 21(1): 60.
- 7 Eisenhofer G, Goldstein DS, Stolt R, et al. Simultaneous liquid — chromatographic determination of 3, 4 — dihydroxyphenylglycol, catecholamines, and 3, 4 — dihydroxyphenylamine in plasma, and their responses to inhibition of monoamine oxidase. Clin chem, 1986, 32(11): 2030.
- 8 金益强. 中医肝阳证候实验诊断指标的研究思路和方法. 湖南医科大学学报, 1997, 22(5): 404.

注: 本研究系国家自然科学基金资助课题的部分内容(项目编号: 39330240)

自拟冠心宁胶囊治疗冠心病伴发心律失常 65 例临床观察

肇龙起¹ 孙茂森¹ 许秀梅¹ 李连生¹ 艾 华² 谭素娟²

我们以益气养阴、活血安神法自拟方药, 研制了冠心宁胶囊治疗冠心病伴发心律失常, 经临床观察及实验研究, 有较好疗效, 现报告如下。

1 临床资料

本组病例系我院 1992 年 7 月~1996 年 6 月的住院和门诊病人。治疗组 65 例, 其中男 46 例, 女 19 例; 年龄最大 65 岁, 最小 46 岁, 平均 56.7 岁; 病程最长 11 年, 最短 2 月, 平均 2 年 1 月。对照组 43 例, 其中男 30 例, 女 13 例, 年龄最大 65 岁, 最小 45 岁, 平均 57.8 岁; 病程最长 10 年, 最短 1 月, 平均 1 年 11 月。

2 治疗及观察方法

治疗组用冠心宁胶囊, 剂量 6 丸/次, 每日 3 次口服, 疗程为 1 个月。冠心宁主要成分为红参、三七、琥珀、麦冬、五味子、酸枣仁、淫羊藿、黄连、葛根等。前三味药研末; 余药煎煮过滤, 减压浓缩至干膏, 碎成细粉; 共同混匀装胶囊(0.5g/丸)。对照组用西药抗心律失常药物。其它用药两组无明显差异。治疗观察 1 月后做临床总结。

3 结果

疗效判定按《中药新药临床研究指导原则》中“中

药新药治疗心悸的临床研究指导原则”的疗效判定标准分治愈、显效、有效、无效进行判定。治疗组 65 例, 临床治愈 10 例, 显效 25 例, 有效 26 例, 无效 4 例, 有效率 93.85%; 对照组 43 例, 临床治愈 9 例, 显效 13 例, 有效 20 例, 无效 1 例, 有效率 97.67%。延长疗程至 45 天, 治疗组有效率增至 96.92%, 对照组无变化。两组差异无显著意义($P>0.05$)。

不同类型心律失常治疗结果不同: 房早 19 例, 临床治愈 4 例, 显效 10 例, 有效 5 例; 室早 32 例, 临床治愈 3 例, 显效 13 例, 有效 15 例, 无效 1 例; 房颤 9 例, 显效 1 例, 有效 6 例, 无效 2 例。说明本药对房早、室早疗效较好, 而房颤稍差。

4 体会

冠心病伴发心律失常属于祖国医学“心悸”、“怔忡”等范畴, 表现为本虚标实。本虚主要是气虚, 或有偏阴虚和阳虚的, 标实指本虚影响血液循环、津液输布而导致的血瘀气滞痰浊等病机。方中红参益心气, 安神定志, 三七散瘀止血, 两药相伍重在益气活血; 麦冬、葛根生津、清心除烦; 五味子、酸枣仁敛心和营安神; 琥珀重镇安神, 化瘀通脉; 淫羊藿补肾助阳, 益精, 强心力; 黄连、葛根现代药理证明均有较好的抗心律失常的作用。实验结果证明, 本方具有抗乌头碱所致心律失常的作用, 可对抗豚鼠垂体后叶素性冠脉收缩, 从而起到抗心肌缺血的作用。

1 辽河油田中心医院, 辽宁省盘锦市兴隆台区 (124010)

2 辽宁中医学院

收稿日期: 1997-12-04