

共有兴奋中枢神经系统的功能。睾酮升高是否引起中枢兴奋过度,而使大脑功能紊乱,引起发热、汗出、烦躁等一系列的症状,清心平肝法的作用机理之一是否是降低了T水平,这些均有待进一步探讨。

24小时尿儿茶酚胺的含量反映了外周肾上腺能神经原的兴奋状态,交感神经功能亢进时,其外周儿茶酚胺浓度增加^[1]。一般认为,更年期综合征与植物神经功能失调有关。本文证明,以发热、汗出为主症的更年期综合征患者,其24小时尿儿茶酚胺含量与更年期健康人比有增高的倾向。6例患者经治疗后,随着

临床症状的改善,其中4例尿中儿茶酚胺有不同程度的降低。这提示清心平肝能改善外周交感神经功能活动。10例交感神经功能亢进者治疗后恢复正常也支持了这一点。

参 考 文 献

- (1) 上海中医学院生化教研组. 反相高效液相色谱—电化学检测用于尿儿茶酚胺类化合物的定量分析, 内部资料。
- (2) 梁月华. 植物神经平衡的综合指标测定法, 北京医学院学报 1979; (4):239。

治愈坏疽性脓皮病 1 例报告

中国人民解放军空军北京医院中医科 罗普树

患者富××,女,66岁,退休工人。于1985年8月3日,无何诱因,高烧,体温38.3℃,周身酸痛,寒战,恶心,食纳不香。胸透正常,血常规检查:白细胞11000/立方毫米,中性82%、淋巴18%,血培养为蚕茧杆菌感染,凝固酶试验阳性,经服中西药疗效不满意。于同年9月4日下午体温升至39.8℃,去××医院给输液及中药汤剂治疗,体温降至正常。一周后左小臂起一绿豆大小红点,逐日增大,10天后如蚕豆大小,开始破溃挤出脓血,局部烧灼样疼痛,周围组织红肿,经用1:1000雷佛奴尔液湿敷无效,溃烂组织逐日增大,经某医院治疗无效,一月后溃烂组织逐日向近端扩散,面积达6×10厘米大小,深达肌层,流出脓血液体,疼痛难忍,夜不能寐,需两小时服一片止痛片,方可缓解,去首都医院诊断为:坏疽性脓皮病,某医院外科动员病员截肢治疗,病员和家属拒绝截肢而出院。后继转数家医院治疗无效。于1985年10月21日邀余诊治:视患者为痛苦面容,卧床不起,局部溃烂面积约7×15厘米大小,深达肌层,溃烂近端约7×5厘米大小,皮肤呈黯黑色僵硬,略挤压从溃烂处流出脓血,疼痛难忍,周围组织红肿,接近溃烂组织由红变黯黑,食纳不香,口干口渴,欲饮,大便干结,脉弦大,舌红无苔如镜。证属:热毒壅盛,伤阴耗气,治以清热解毒,益气养阴。内服方用仙方活命饮加减:

炙山甲6克,天花粉20克,皂角刺10克,赤芍

15克,白芍15克,白芷20克,当归15克,银花15克,炙乳没各5克,生大黄6克,元参20克,生黄芪40克,连翘15克,蒲公英20克,土茯苓20克。每日一剂,水煎,频服。外用自拟提脓生肌散。

二诊(85年11月15日)上药共服24剂,服药一周后,局部脓液减少,溃烂面未再向上蔓延,疼痛略减,止痛片减至半日一片,仍宗前法施治2周后脓液明显减少,守前方继服。每日一剂,每次半剂,水煎服。

三诊(86年1月14日)上药服59剂,疼痛基本消失,局部长出新的肉芽,周围长出新的皮肤,疮面明显缩小,已停服止痛片。前方加儿茶6克、煅龙骨20克、赤石脂20克继服。每日一剂,每次半剂,水煎服。

四诊(86年2月19日)上药共服35剂,局部肉芽已和表皮长平,疼痛消失,疮面已缩小四分之三,继用前法一月后臂部溃疡痊愈。停药观察至1988年5月仍属正常。治疗过程除用止痛片外,未用西药和西医处理。

自拟提脓生肌散:象皮、青黛、黄连、黄柏、儿茶、煅龙骨、轻粉。将前药用文火焙黄,共为细末,再将轻粉研细和前五味药混匀。先用生理盐水冲洗疮面,然后将药粉直接撒入疮面,敷盖纱布,一日一换。