

专

题

笔

谈

重用葶苈子治心衰

山东中医药大学附属医院(济南 250011)

郭 佐 莉

笔者有幸跟师邵念方教授临证,每见其对各种原因引起的心力衰竭在辨证论治的基础上重用葶苈子,取得良效。如治王某某,男,43岁,农民。因心悸、气短、双下肢水肿加重半月来诊。心脏彩超示:扩张型心肌病。症见胸闷心慌,心前区隐痛,乏力气短,活动后加重,腹胀满,纳呆,双下肢水肿至大腿处,生活不能自理,舌质暗红、舌苔薄白,脉细数。治以益气活血,行水消肿。药用:炒葶苈子 30g,人参 15g,生黄芪 30g,云茯苓 30g,白术 15g,丹参 30g,益母草 15g,炙甘草 3g,水煎服。服药 3 剂,病人心悸减轻,下肢水肿渐消,纳食好转。又于上方加減調理月余,症状消失。

又治张某某,男,59岁,工人。肺心病 10 余年,近 1 月加重。经中西医治疗,病情时有反复。入院时患者胸闷,憋喘,不能平卧,咳嗽,咯少量黄粘痰,心慌气短,活动后加重,双下肢水肿,口咽干,纳呆,大便干,两日一行。舌质暗绛、苔黄厚而干,脉沉细数。证属本虚标实,既有心肺之虚,又有痰热壅滞,故治以补虚祛邪。药用:炒葶苈子 24g,西洋参 9g,麦冬 30g,五味子 3g,菖蒲 12g,胆南星 9g,炒黄芩 9g,鲜竹沥 30ml,瓜蒌 18g,浙贝母 9g,水煎服,日 1 剂。服上方 4 剂病情好转。去西洋参,改用沙参 30g,調理 20 余日,症状明显好转出院。

葶苈子辛苦寒,有小毒,入肺、膀胱经,具有泻肺定喘,行水消肿之功。一般多用于治疗肺实壅塞所致水液内停之证。邵老师根据心肺同居上焦,肺朝百脉,为水之上源;心主血脉,为气血运行之动力的理论,重用葶苈子泻肺行水,以助心脉正常运行,达到纠正心衰的目的。现代药理

研究证明:葶苈子具有强心作用,其有效成分中含有强心甙类物质。动物实验能明显增加心输出量,降低静脉压,加强心肌收缩功能。另外,邵老师认为用本品治疗心衰,用量须大(一般 15~30g)才能取得药到病除之功,但应中病即止,以防耗伤心肺之气。临床应用葶苈子有生品和炒品两种,我们认为该药炒用比生用效果好。有人实验证明炒品水煎液中有效成分含量是生品的 2.73 倍,且炒后可减少刺激性物质的含量,故临床多用炒葶苈子。

葶苈子治疗自发性气胸效著

四川省绵阳市人民医院(四川 621000)

赵 甫 成

葶苈子性大寒,味辛、苦,入肺、膀胱经。有泻肺平喘、利水消肿之功效。多用于痰壅气逆、实证喘咳、水肿、小便不利;现代常用于治疗急性心功能衰竭、肺心病并心衰、胸膜腔积液效果显著。但是,用于治疗自发性气胸报道则较少。笔者自 1992 年以来,用葶苈子加大黄,再根据辨证加味治疗自发性气胸疗效显著。现总结资料介绍如下。

共治疗 16 例,男 14 例,女 2 例,年龄最小 18 岁,最大 70 岁,平均 46.8 岁;右侧气胸 10 例,左侧 6 例;肺压缩 90% 1 例,50%~60% 10 例,40% 4 例,30% 1 例;16 例均为单纯性气胸;病因为肺气肿 6 例,支气管哮喘 1 例,肺结核 2 例,慢性支气管炎 2 例,肺心病 1 例,不明原因 4 例。

病人入院后经 X 线透视或摄片诊断,用气胸箱测压分型,若症状严重出现明显缺氧者,在测压的同时适量抽气 400~500ml。方剂组成:葶苈子 15~30g,生大黄 10~15g,苏子 10g,枳实 12g。咳喘甚者加桑白皮、杏仁、炙麻黄;胸痛加延胡索、没药;水肿加车前子、茯苓、泽泻。水