

肺为水之上源,通调水道,下输膀胱。肺气的肃降功能对膀胱气化有着直接的推动作用。葶苈子辛、苦、寒、滑利,入肺、膀胱经,为泻肺利水、肃降肺气之峻药。故用于治疗膀胱湿热之淋证功著效捷。

葶苈子化结石排结石有特效

湖北省中医药研究院(武昌 430074)

万 传 贵

笔者早年治疗胆肾结石,用传统的清热利湿、通淋排石方药见效甚微。后治疗一哮喘合并肾结石的病人,因属肺壅实喘,故以葶苈子为主组方治疗,3剂后,不但哮喘症减,患者还从尿道排出大小不等3粒结石,经B超检查,肾内结石已消失。后在治疗结石病中遇有体壮实的患者,往往在化石排石方中加入小量(1~3g)的葶苈子,也屡试屡效。

如治吴某,男,50岁,农民。患右肾结石、肾积水10余年,经常右腰部疼痛难忍,小便赤涩,久治不效。初诊时,因虑其年老体虚,未在排石方中加用葶苈子,服药1月无效,后加用葶苈子并辅以益气养阴扶正之药,服药1周即将结石排出。

值得说明的是,葶苈子为攻利峻品,体弱脾虚者宜慎用,肺虚有出血倾向者要忌用,一般剂量要小,也不可久服,久用致人虚。体虚之人可以微量制成丸剂胶囊缓图,同时还必辅以益气健脾、养阴扶正之药味,以免伤正或造成不良反应。

葶苈子治疗创伤性血肿

福建省永春县中医院(福建 362601)

郑跃进 林祖贤

笔者在临床实践中,根据祖国医学气血水相关理论,用葶苈子配合桃红四物汤治疗创伤性血肿效果满意。创伤性血肿是由于外力作用,骨断筋伤,络脉破损。笔者认为临床治疗本病必须气、血、水三者兼治,在活血行气的同时用利水渗湿之葶苈子,能通利积存于组织间隙之液体,改善气血的循环,有利于肿痛的消退。葶苈

子利水消肿作用显著,能及时减轻组织间的压力,用量每剂约15~30g。

如治曾某某,女,24岁,住院号9550。患者被摩托车撞伤,于1996年2月20日入院。X线片报告:右胫腓骨中下段粉碎性骨折,远折端向前内方移位。经手法整复夹板固定,第2天右小腿及足背肿胀明显,并有水泡出现,小腿发胀、疼痛,右足背动脉搏动存在但较弱,给予行气活血利水消肿中药内服。处方:葶苈子30g,桃仁10g,红花6g,忍冬藤15g,牛膝10g,生地15g,川芎8g,赤芍10g,水煎服。连服6剂后,右小腿肿胀明显消退,疼痛减轻,足背动脉搏动有力,水泡消失。

葶苈子能降眼压

辽宁省鞍山市铁东区医院(辽宁 114000)

隋 谊 深

笔者以葶苈子单用或加入应证方剂中治疗青光眼、高血压症5例,收到满意疗效。

用法:体质壮实者葶苈子每日10g,加水煎成30ml煎液,分2~3次温服,体虚者在辨证施治方剂中加葶苈子10g,水煎服,并适量加用健脾药。如1995年3月曾治石某,女,38岁,发现眼压高4个月。曾用噻吗心安滴眼液点眼、乙酰唑胺片口服眼压下降;近因用眼过度病情复发。症见头眼胀痛,眉心重坠,恶心胸闷,不能阅读,抱轮红赤(轻度),舌尖红、苔白,脉弦滑,测眼压:右眼4.5kPa,左眼3.2kPa。证属痰火上扰。处方:菊花20g,竹茹15g,栀子10g,钩藤15g,枸杞子20g,熟地20g,郁金15g,泽泻10g,牡蛎30g,每日1剂,水煎服。连用6剂,症状无明显改善,在原方基础上加葶苈子10g,3剂后头眼胀痛、胸闷、抱轮红赤均基本消失,测眼压为右眼3kPa,左眼2.1kPa。

青光眼属祖国医学的内障眼病范畴,传统认为本病主要与肝肾虚损及功能失调有关,而笔者认为本病出现的头眼胀痛、胸闷泛恶、抱轮红赤等症当责之肺失肃降,聚湿为患所致。治疗当加泻肺行水之品。葶苈子有泻肺行水之功,验之临床确能降眼压。