

四川省1988年上半年高等中医自学考试

《中医外科学》试题参考答案

(考题登在上一期)

一、单项选择题:

1. ④ 2. ③ 3. ⑤ 4. ④ 5. ③ 6. ③ 7. ④
8. ③ 9. ② 10. ① 11. ④ 12. ① 13. ② 14.
③ 15. ④ 16. ② 17. ④ 18. ③ 19. ① 20.
④ 21. ① 22. ③ 23. ② 24. ② 25. ④

二、多重选择题:

1. ②⑤ 2. ①③⑤ 3. ①②③⑤ 4. ①②④ 5.
②④ 6. ①③④ 7. ②⑤ 8. ②④⑤ 9. ①②③④⑤
10. ②③⑤ 11. ①②③④⑤ 12. ①③④ 13. ①②③
⑤ 14. ②③ 15. ①②③⑤ 16. ①④ 17. ①②③④
⑤ 18. ②③④⑤ 19. ①② 20. ①③ 21. ②④ 22.
①③④⑤ 23. ②③④⑤ 24. ①②④ 25. ①②④

三、判断分析题:

1. (误) 痒是皮肤病的一个主要的自觉症状。其发生是因风、湿、热、虫之邪客于皮肤肌表, 引起皮肉间气血不和而成, 或由于血虚风燥阻于皮肤间, 肤失濡养而成。其中虫淫而痒可有状如虫行皮中之感, 并非是虫行于皮肤而发生的。

2. (正) 乳痈成脓后宜早期切开引流, 否则可致传囊之变。乳痈成脓后作切开引流, 循乳络方向作放射状切口, 是保证乳络、乳晕、乳头不受损伤的方法。从而可使乳络畅通, 乳汁分泌正常。乳晕、乳头完好也可使婴儿顺利吮吸乳汁。

3. (误) 岩证患者, 除用扶正培本法外, 尚需维护胃气, 而不是肾气。因为“有胃气则生, 无胃气则死”。岩证邪毒易消耗人体正气, 致使脾胃运化功能失常。食欲不振是恶性肿瘤(岩证)的通病, 因而健脾益气、调理脾胃, 也是扶正补虚的重要内容。只有胃纳旺盛, 中土健运, 使生化之源不竭, 养营充沛, 才能耐受岩证邪毒的伤害, 同时也有利于祛邪药物的攻伐。

四、简答题:

1. 答: 用于外疡初起时, 宜敷满整个病变部位; 假使毒已结聚, 或溃后余肿未消, 宜敷于患处四周, 不要完全涂布。敷贴应超过肿势范围。此外, 箍围药敷后干燥之时, 宜时时以液体湿润, 以免药物剥落及干板不舒。

2. 答: 发颐和疔腮均发生于颌颌之间, 并都有疼痛肿大。二者的不同点是: 发颐患处皮色发红, 肿如结核, 并有化脓溃破, 成人及儿童均可发生, 但无传染性。疔腮患处皮色不变, 肿软不硬, 不会化脓, 多见于儿童, 且有传染性。

3. 答: 初起为丘疹或水疱, 逐渐形成边界清楚的钱币形红斑, 其上覆盖细薄鳞屑。以后病灶中央常有自愈倾向, 而向四周蔓延, 有丘疹、水疱、脓疱、结痂等损害, 日久形成环形、多环形或同心环形等形态。

五、论述题

1. 答: 流痰的内治为: 初期须益肾温经、散寒化痰, 用阳和汤加味。中期应扶正托毒, 用透脓散加味。后期气血两虚者要调补气血, 用人参养荣汤。腰背酸痛, 下肢瘫痪, 加川断、狗脊、菟丝子、怀牛膝、鹿角粉。如阴虚火旺者, 须养阴除蒸, 用清骨散加味。自汗不止加黄芪、浮小麦、煅牡蛎、龙骨、丹皮; 咳嗽痰血加南沙参、麦冬、百合、川贝母、丹皮。

此外, 本病各期无明显虚象时, 可用鹿角粉3克, 小金片4片, 或虎骨散0.3克, 每日2次。

流痰的外治为: 初期用阳和解凝膏加黑退散外敷。中期脓成可穿刺抽脓, 或切开引流。溃后先用五五丹药线提脓祛腐, 外敷红油膏; 形成窦道, 疮口过小, 脓出不畅, 可用千金散附在药线上, 插入窦道引流; 脓尽可用生肌散收口。

2. 答: 清热法在具体运用时, 首先必须分清热之盛衰, 火之虚实。实火宜清热解毒; 热在气分者, 当清气分之热; 邪在营分者, 当清血分之热; 阴虚火旺者, 当养阴清热。

清热解毒法用于红肿热痛的阳证, 如疮疡中的疖、疔疮、有头疽等。清气分之热适用于红肿或皮色不变、肿胀疼痛的阳证; 皮肤病之皮损焮红灼热脓疱糜烂等, 如颈痈、流注、附骨疽、蕴热证肠痈、接触性皮炎、脓疱疮等等, 均伴发热、口渴、喜冷饮、大便燥结、小便短赤、苔薄黄或黄腻, 脉数或滑数等症。但在临

(下转第62页)

说明：下列1至6共六题，每题3分。各题概见于大纲规定的课文。请用现代汉语对译。

1. 若翁者，殆古所谓直谅多闻之益友，又可以医师少之哉？

译文：

2. 固知一死生为虚诞，齐彭殇为妄作。

译文：

3. 顾无以报，愿惠一言，识区区之感焉。

译文：

4. 其为医，专事乎大观之方，他皆愤愤。

译文：

5. 当祁寒时，遽自溺于火，为身计者，良已左矣。

译文：

6. 因录其所授，重加芟订，存其可济于世者，部居别白，都成一编，名之曰《申雅》。

译文：

五、阅读：(30分)

说明：下列1至10共十题。第1题3分；第2题14分；第3到6题，每题0.5分；第7到9题，每题1分；第10题3分。

(一)标点

说明：以下一则文字见于教材练习部分。请用标点符号在文中断句。

1. 幸我使于齐而反见夫子曰梁丘据遇魃毒三旬而后瘳朝齐君会大夫众宾而庆焉弟子与在宾列大夫众宾复献攻疗之方弟子谓之曰夫所以献方将为病也今梁丘子已瘳矣而诸夫子乃复献方将安施意欲梁丘大夫复有魃毒当用之乎众座默然无辞弟子此言何如夫子曰汝说非也夫三折肱为良医梁丘子遇魃毒而获瘳犹有与之同疾者必问所以已之方焉众人于此故各言其方欲售之以己人疾也凡言其方者称其良也且以参据所以已之方优劣耳

(二)断句、注释、今译、分段

说明：以下一则文字出于教材之外。仔细阅读后，完成文后各题。

(上接第64页)

床上，清热解毒与清气分之热有时不能截然分清，常相互合并应用。清血分热用于焮红灼热的外科疾病，如烂疔、发、大面积烧伤；皮肤病之红斑、淤点、灼热，如丹毒、药物性皮炎、红斑性狼疮、血热证白疮；可伴有高热，口渴不喜饮，苔黄腻舌质红，脉弦数或弦滑数等症。以上三法在热毒炽盛时往往可兼

余少婴俗病汤熨针石咸罔奏功而年日益久病日益深殆由腠理肌肤以达于骨髓而为痼人矣客有过余谓苏长公竹诗至士俗不可医之句嗟然谓曰余病其痼也耶何长公之诗云尔也既自解曰士俗坐无竹耳假有竹安知其俗之不可医哉则求竹以居之家之东偏隙地仅半亩墙角萧然有竹数十箇于是日使僮奴壅且沃之以须其盛越明年挺然百余其密如簪而竹盛矣复自喜曰余病其起也耶因构小亭其中食饮于是坐卧于是唱歌于是起而行于是倚而息于是倾耳注目举手投足无不在乎是其藉此以医吾之俗何如耶吾量之隘俗也竹之虚心有容足以医之吾行之曲俗也竹之直立不挠足以医之吾宅心流而无制竹之通而节足以医之吾待物混而无别竹之理而析足以医之竹之干云霄而直上足以医吾志之卑竹之历冰雪而愈茂足以医吾节之变其潇洒而可爱也足以医吾之凝滞其为箴为箴为箴为箴为箴也足以医吾陋劣而无用盖逾年而吾之病十已去二三矣久之安知其体不飘然而轻举其意不释然而无累其心不亢然而有得哉古之俞附秦越人辈竹奚以让为然而竹也不苦口不腥眩不濡浣肠胃不漱涤五脏长公不余秘而授之余用之既有功绪矣使人皆用之天下庶几无俗病与明年余将北去京师京师地不宜竹余恐去竹日远而病复作也既以名其亭复书此为记迟他日归亭中愿俾病根悉去之不识是竹尚纳我否

2. 用“。”给上文断句。

注释上文加重点号的词语。

3. 婴：

4. 仅：

5. 须：

6. 量：

今译上文加横线的句子：

7. 余病其起也耶

译文：

8. 长公不余秘而授之

译文：

9. 不识是竹尚纳我否

译文：

10. 上文可分为四段。请在文中用“||”加以划分。

用。假如热毒内伤，而见烦躁不安，神昏谵语，昏厥不语，舌焦黑而干，舌质红绛，脉象洪数或细数，如走黄、内陷，又当加用清心开窍法，常用药物为安宫牛黄丸（针剂为醒脑净）或紫雪丹。养阴清热用于阴虚火旺的慢性炎症、红斑性狼疮，或走黄、内陷后阴伤有热者。清骨蒸潮热用于瘰疬，流痰等虚热不退的疮疖。