

而以治疗神经性耳鸣耳聋尤为显著。曾撰写“葛根的实验研究与临床应用新进展”,刊于《中国中药杂志》1989年第5期。

葛根治疗迟发性运动障碍

北京安定医院(北京 100088)

杜 万 君

迟发性运动障碍是由于长期服用抗精神病药引起的一种不良躯体反应,主要表现为面、颊、口唇、舌、颈、四肢等不自主运动,睡眠时消失,紧张时加重,此症一旦发生,治疗较为棘手。笔者根据多年临床经验,中药方中重用葛根治疗此症,可取得满意的疗效。

1990~1996年重用葛根治疗迟发性运动障碍24例,均为我院中医病房住院病人,诊断为精神分裂症伴迟发性运动障碍。年龄20~53岁,迟发性运动障碍病程最长1年半,最短2个月,其中男14例,女10例。所有病例根据症状轻重,处方中加葛根20~50g,水煎服,每日1剂。结果24例中治愈16例(症状完全消失),好转6例(症状有不同程度减轻),无效2例(症状无改变)。

如治邱某某,男,21岁,病案号54959。1992年11月24日住院,患精神分裂症9年,经抗精神病药治疗,精神症状逐渐缓解,随后出现头不自主后仰,经多种方法治疗不见好转,逐渐加重,走路时必须一只手抱头,站立时后脑部要顶着墙。处方消迟汤(验方):生石膏80g,生地30g,花粉30g,石斛30g,麦冬30g,瓜蒌30g,黄连15g,酒大黄15g。加入葛根50g。服药14剂后,症状减轻,颈部松软。继服30剂症状消失,1994年9月22日痊愈出院,随访2年未复发。

又如治文某,女,40岁,病案号50721。患精神分裂症7年,伴咀嚼不利、右下肢行走障碍1年,1993年12月17日入院。诊断为精神分裂症伴迟发性运动障碍,经抗精神病药治疗,精神症状很快缓解,但迟发性运动障碍依存。处方:消迟汤(组成同上)加葛根30g,服药10剂,症状好转,继服20剂缓解如常人。

体会:据《神农本草经》记载,葛根性味甘、

辛、平,功效升阳解肌,透疹止泻,生津止渴。迟发性运动障碍乃由于长期服用抗精神病药,药物毒邪蕴积日久,化热伤津,肌肉筋脉失养所致,故重用葛根以达濡养筋脉,升阳解肌之功效,可取得满意的疗效。

葛根用于 β 受体功能亢进症

山东省泰安市中医院(山东 271000)

姬 生 勤

笔者近年来重用葛根为主治疗多例 β 受体功能亢进症,均收到满意疗效。基本方:葛根30~60g,党参20g,麦冬20g,五味子15g,酸枣仁20g,生龙骨30g。随症加减,水煎服,日1剂,早晚分服,4周为一疗程。一般坚持服药1个疗程后,症状、心电图等即有明显改善。

如患者张某,女,36岁,1996年10月18日就诊。患 β 受体功能亢进症4年余,常服心得安、谷维素等药物治疗,用药后,症状只能暂时控制,精神紧张或劳累时病情反复。1周前,因情志刺激又出现心悸、气短、胸闷、焦虑不安、五心烦热、出虚汗等症状,血压19/12kPa,心率96次/分,律齐,心音亢进,各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音,舌质红、苔少,脉细数。心电图示:窦性心律,S-T段呈缺血型下移,T波低平。心得安试验阳性。中医诊断:心悸,气阴不足、虚火内扰。西医诊断: β 受体功能亢进症。治疗以益气养阴、滋阴降火、宁心安神为法,处方:葛根60g,党参20g,麦冬20g,五味子15g,酸枣仁20g,生龙骨20g,天冬15g,生地20g,玄参15g,夜交藤20g,百合30g。水煎服,日1剂。用药4剂后,症状即明显改善。随症加减,共调治1个月,症状消失,心电图恢复正常。随访半年,病情未再复发。

笔者认为中药治疗 β 受体功能亢进症,能从根本上调节机体机能,纠正植物神经功能紊乱,达到阴平阳秘、气血调和的目的。现代药理研究证实,葛根具有显著的 β 受体阻滞效应,能降低血压、减慢心率、扩张冠状动脉,降低心肌耗氧,与心得安等 β 受体阻滞剂作用相似,且无明显抑制心脏作用,能使 β 受体兴奋引起的心