

名 医 验 方

溃 疡 散

北京市中医医院 王 若 玉

一、药物组成：黄芪3克，党参3克，白芍3克，元胡索3克，白及2克，三七1.5克，煅瓦楞子3克，川楝子3克，象贝母3克。

二、适应证：胃及十二指肠溃疡。

三、制法：上药共研极细末，过筛，混和。

四、用法：日服三次，每服6克，温开水送下。亦可将药末分装胶囊吞服。

五、验案举例：曾通过16例胃及十二指肠溃疡患者的治疗观察，并经X线钡片复查，

其中愈合者10例，溃疡面缩小者3例，控制症状者2例。

六、按：本方用黄芪、党参补益中气；白芍、甘草、川楝、元胡解痉缓痛；瓦楞子、象贝制酸和中；三七活血化瘀；白及护膜生肌；共奏养胃止痛、生肌医疡之功。根据献方者介绍，此方主要用于溃疡病疼痛、吐酸基本控制或缓解后，解决患者常服煎药之不便，以及溃疡愈合非短期所能奏效之矛盾。且散剂可加大药物对溃疡面的附着作用，有利于更好地发挥药效。本方应连续服用二个月以上。

舒 肝 和 胃 汤

山西医学院第二附属医院 邢 子 亨

一、药物组成：当归12克，炒白芍12克，乌贼骨15克，生苡仁24克，五灵脂12克，佛手15克，白檀香(后下)9克，川楝子12克，炙甘草9克。

二、适应证：胃及十二指肠球部溃疡、慢性胃炎，症见胃脘疼痛，暖腐吞酸，嘈杂，消化不良，严重者消瘦体弱，大便化验有潜血等。

三、用法：每日早晚分服。

四、验案举例：魏××，男，45岁，干部，1970年6月20日初诊。恙延四五载，胃部疼痛，寒冷刺激物下咽即痛，泛酸，食欲不振，有时呕吐不能食，形体瘦弱，精神不振，舌苔白滑，脉弦虚。经西医检查，诊为十二指肠球部溃疡。予上方连服十余剂，胃痛大减，食欲增进，又予上方加炒山药、黄精、炒扁豆各15

克，以巩固疗效，继服30余剂，身体康复，照常工作，近二十年未复发。

五、按：胃、十二指肠球部溃疡和慢性胃炎的临床表现颇为复杂，证属肝胃不和者，运用疏肝和胃法可以取效。方用归、芍养血和肝，川楝、佛手、檀香疏肝理气止痛，五灵脂化瘀镇痛，苡仁利湿和中，乌贼骨制酸护膜，共奏疏肝和胃、化瘀止痛之效。加减法：胃寒呕吐加干姜6克，砂仁9克(后下)；大便干结加冬瓜子20克，郁李仁15克，二味均捣碎；病久气血虚弱，身体消瘦，加炙黄芪15克，鹿茸5克，白及9克(二味研末，分二次冲服)；慢性胃炎，消化不良，加陈皮9克，焦山楂6克，六神曲9克，炒麦芽9克。对于此类病证的调理，应禁忌饮酒，勿食生冷瓜果以及辛辣刺激性食物。