DOI:10.13288/j.11-2166/r.1999.05.002

专 题 笔 谈

葛根治汗出偏沮症

黑龙江省肇州县中医院(黑龙江 166400)
丁 济 良

笔者在临床实践中,常重用葛根30～60g加入辨证方药中治疗汗出偏沮症,收效甚佳,简介如下,以供参考。

本证是指身体一侧汗出,《内经》谓之"偏沮",中医多从气血不足,邪气阻滞,营卫不和论治。笔者学习本院老中医经验,于1995年10月～1997年6月间,门诊治疗11例,其中辨证气血不足3例,寒湿痹阻2例,营卫不和6例。均在相应方剂中重用葛根60g,5日为一疗程,一般均在1～3疗程后汗止病愈。葛根一味具有解肌生津,祛邪开腠,舒挛缓急之功,可鼓舞脾胃阳气,使气血津液畅行达于肌表。如治许某,女,35岁。左半身汗出半年,恶风,手足屈伸无力,苔白润,脉缓,辨证给予桂枝汤加味,收效甚微,遂于原方中加入葛根60g,2剂后自诉右侧半身有微汗,此营卫经络调和,气血津液畅行之象,继服3剂后左半身汗止,病告痊愈。

葛根通乳善治乳痈

新乡医学院第一附属医院(河南 453100)
杨烈彪 赵习德

葛根为辛凉解表药。临床用于风热表证,或斑疹、泻痢兼有表证,消渴病生津止渴,心脑血管病通血络效果均良好。我们临床还发现葛根能够通乳,善治乳痈,现述于下。

1 缺乳:魏某某,24岁。产后1周少乳,为顺产,出血量不多,恶露不多,饮食一般,形体微胖,舌淡红、苔白腻,脉微虚。给以常规通乳药,处方:穿山甲10g,王不留行10g,漏芦10g,路路通15g,川芎10g,黄芪15g,白术10g,当归10g,陈皮10g,甘草6g,3剂。服后乳量略有增加。二诊,加用葛根15g,继3剂,乳量明显增加,再进3剂,乳量如常。

按:我们认为缺乳病机首先是乳络郁滞,其次是脾胃生化之气血不能尽快转注于乳房化为乳汁。传统的通乳药一般从通乳络、益化源入手并无可非议,但如何能使气血转注于乳房尤为重要。葛根善升清,入脾胃,通血络,且胃经循两乳,恰合此义。所以临床常用葛根15～20g,加用于常规通乳药内治疗缺乳效果良好。

2 乳痈:朱某某,26岁。左乳有4个大小不等的硬结,局部微红,触痛明显,伴恶寒发热3天,服抗生素无效,舌微红、苔白腻,脉实。此为乳痈早期,积乳化热,治以通乳散结清热解毒。处方:葛根20g,牛蒡子15g,王不留行15g,穿山甲10g,路路通20g,桔梗10g,川贝10g,海浮石20g,连翘20g,蒲公英20g,漏芦10g,虎杖15g,白芷10g,甘草6g,5剂。配合吸乳,局部按摩而愈。

按:乳痈多发于乳多汁浓之人,产后2～3月乳旺食少,极易出现积乳化热,乳热互结,久之血瘀乳腐血败为脓,治疗颇为棘手,所以应早期着手控制病情发展。本方重用葛根为君,一通乳络,二引诸药行于乳,三解表热,配以王不留行、穿山甲、路路通通乳活血,牛蒡子、漏芦通乳消肿,川贝、海浮石化痰散结,连翘、蒲公英、虎杖清热解毒,佐桔梗、白芷消肿排脓。临床可加减使用,并配合吸乳,局部按摩效果较好。

葛根治疗内痔

重庆市綦江松藻矿务局职工总医院(重庆 401445)
李 星 全

笔者在临床实践中应用葛根治疗内痔脱出坠胀之症,收到良效,试举例说明。

如治黄某某,男,62岁。大便干燥,便时肛门内肿块脱出,便后自行回纳肛内,反复发作2

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net