

10. 督脉中治疗胃肠病为主的穴位大多分布在十四椎至二十一椎。()

11. 根据骨度分寸,神庭穴上1寸是上星穴。()

12. 根据骨度分寸,两乳头间为9寸。()

13. 根据骨度分寸,肘横纹至腕横纹为12寸。()

14. 头维穴是足少阳胆经经穴。()

15. 灵道穴在通里穴上1寸。()

16. 三焦俞在第一腰椎棘突下。()

17. 雀啄灸属于直接灸。()

18. 八脉交会穴是指人体脏、腑、气、血、筋、骨、髓、脉等精气所会聚的腧穴。()

19. 手少阳经的下合穴是委阳。()

20. 第二腰椎棘突下是命门穴。()

四、问答题(15分)

试述痹证的辨证分型、针灸治疗方法与处方取穴。

五、病案分析(每题15分,共30分)

1. 石××,男性,56岁,教员。素患高血压病十余年,形体肥胖,于两月前患中风(脑血栓形成),经住院治疗痊愈。恢复期中,因家事思虑过度,于某日晚突然昏仆在地,面色红赤,失语。约15分钟后神志昏迷,牙关紧闭,舌被咬破,喉中痰鸣,呼吸气粗,脉弦滑,因牙关紧闭未曾获得舌象。

请对此案做出中医诊断,提出针灸治疗处方,并说明穴义和手法。

2. 李××,女性,60岁,工人。三年前头晕目眩,西医诊为高血压病,嗣后血压时高时低。患者形体消瘦,近二周因暴怒而致头晕目眩加重,且伴耳鸣如潮,头重脚轻,心悸而烦,失眠,腰膝痠软,舌红脉弦。

试对此案做出中医诊断及辨证分析和针灸治疗处方及手法。

上海市1988年高等中医自学考试

《医古文》试题答案

(考题登在上一期)

一、选择

(一) 简繁体、异体字(每题0.5分)

1. 恹 2. 粗 3. 睹 4. 暗 5. 视 6. 蛇
7. 郁 8. 灾 9. 溯 10. 俯 11. 欢 12. 痼

(二) 成语典故(每题0.5分)

13. D 14. F 15. Q 16. I 17. H
18. A 19. P 20. R 21. E 22. K 23. C 24. N

(三) 文句意义(每题1分)

25. B 26. A 27. D 28. C

二、填空

(一) 文史常识(1~8题每题0.5分,9~12题每题1分)

1. 王冰 2. 班固 3. 袁枚 4. 柳宗元 5. 前赤壁赋 6. 陈情表 7. 温病条辨叙 8. 鼻对 9. 信巫不信医 10. 徘徊于斗牛之间 11. 日薄西山 12. 传不习乎

(二) 文意理解(每题1分)

13. 邪气实(或“邪实”、“邪气旺盛”等);正气虚

(或“正虚”、“正气虚弱”等)。

14. 知音(或“懂得音律”等);知人(或“识别人才”等)。

15. 颖悟与否;果敢与否;浅深与否。

16. 洩;后。

三、注释

(1~32题每题0.5分,33~40题每题1分)

1. 施:延续(或“继续”、“延长”)。

2. 老:使……疲惫(或“使疲惫”、“使……疲乏”、“使疲乏”、“使……倦怠”、“使倦怠”等)。

3. 如:往(或“到”、“到达”、“抵达”、“前往”等)。

4. 盍:何不(或“为什么不”、“为何不”、“怎么不”等)。

5. 不旋踵:喻时间短暂(或“很快”、“不一会”、“时间很短”等)。

6. 以:原因(或“缘故”等)。

7. 且犹:尚且(或“犹且”、“还”等)。

8. 径庭:悬殊(或“差别很大”、“差别甚远”等)。

9. 得毋：莫不是(或“莫非是”、“莫非”等)。
10. 诸：之乎(或“他那里吧”等)。
11. 是：认为……正确(或“认为正确”、“认为……对”、“认为对”等)。
12. 束手：喻毫无办法(或“没有办法”、“无能为力”等)。
13. 佩：违背(或“违反”、“通‘倍’”等)。
14. 择：排除(或“拒绝”等)。
15. 稍：逐渐(或“渐渐”等)。
16. 黎元：百姓(或“平民”、“人民”、“黎民”等)。
17. 首丘：头向山丘(或“不忘故乡”、“怀念家乡”等)。
18. 厌：满足(或“自满”、“通‘厌’”等)。
19. 长物：多余的东西。
20. 贵人：认为人类贵重(或“认为人高贵”等)。
21. 赍：持(或“怀着”、“拿着”等)。
22. 删：选取(或“取”、“节取”等)。
23. 经济：治理国家，济助人民(或“经世济民”等)。
24. 见信于人：被人们信任。
25. 张：通“胀”(或“胀满”、“膨胀”等)。
26. 何以方为：用什么方剂呢(或“还用什麼处方呢”等)。
27. 无奈之何：不能对它怎么办(或“不能对疾病怎么样”等)。
28. 如欲生者：象将要生产似的(或“象快要生小孩一样地”等)。
29. 强弱：偏义于“强”(或“强”、“强壮”等)。
30. 安危：使危重的疾病好转(或“使危重的病人安好”、“转危为安”等)。
31. 善：多。
32. 嗜欲：嗜好和欲望(或“嗜好和食欲”等)。
33. ① 颇：稍(或“稍微”)。
- ② 颇：很(或“甚”、“非常”等)。
34. ① 应：反应(或“效验”、“效应”、“效果”等)。
- ② 应：应时(或“立刻”等)。
35. ① 夷：平(或“平坦”等)。
- ② 夷：句首语气词(或“无义”、“不用解释”等)。
36. ① 尚：崇尚(或“重视”等)。
- ② 尚：久远(或“久”等)。
37. ① 治：研究(或“钻研”等)。
- ② 治：安定(或“平安”等)。
38. ① 当：匹配(或“嫁给”等)。

② 当：遇到。

39. ① 会：适逢(或“正好”等)。

② 会：集中(或“聚集”等)。

40. ① 经理：研究原理(或“探求理论”等)。

② 经理：经文的道理(或“医经的原理”等)。

四、今译

(每题3分)

1. 象丹溪翁这样的人，大概是古代所说的正直、诚信、博学的有益的朋友，又能因是医师而轻视他吗？

2. 于是知道认为死亡和生存一样是虚假荒诞的言论，认为长寿和夭折相同是胡乱造作的说法。

3. 只是无从报答，希望您赠送一篇文学，记下我的感激之情。

4. 他行医，专门阅读《和剂局方》，对其他医术都糊里糊涂。

5. 在大寒的时节，就自行迷恋炉火，为身体打算，实在是已经错了。

6. 于是记录他传授的内容，重新加以删除订正，保存其中对于社会有帮助的部分，按类排列，区别清楚，汇集成一部书，命名它叫做《串雅》。

五、阅读

(一) 标点(8分)

宰我使于齐而反，见夫子曰：“梁丘据遇魋毒，三旬而后瘳，(或“。”)朝。齐君会大夫、众宾而庆焉。(或：“朝齐君。会大夫、众宾而庆焉。”)弟子与在宾列。大夫、众宾复献攻疗之方。弟子谓之曰：‘夫所以献方，将为病也。今梁丘子已瘳矣，而诸夫子乃复献方，方将安施？意欲梁丘大夫复有魋毒，(或不断)当用之乎？众座默然无辞。弟子此言何如？’夫子曰：‘汝说非也。(或“！”)夫三折肱为良医，(或“。”)梁丘子遇魋毒而获瘳，魋犹有与之同疾者，(或不断)必问所以已之方焉。众人为此，故各言其方，欲售之，以己人疾也。凡言其方者，称其良也，且以参据所以已之方优劣耳。’

(二) 断句(14分)、注释(2分)、今译(3分)、分段(3分)。

余少婴俗病。汤熨针石。(或不断)咸罔奏功。而年日益久。病日益深。殆由腠理肌肤以达于骨髓。而为废人矣。客有过余。诵苏长公竹诗。(或不断)至士俗不可医之句。瞿然惊曰。余病其痼也耶。何长公之诗云尔也。既。(或不断)自解曰。士俗坐无竹耳。使有竹。安知其俗之不可医哉。则求竹以居之。家之东偏。隙地仅半亩。墙角、萧然有竹数十箇。于是日

使僮奴壅且沃之。以须其盛。越明年。挺然百余。其密如簍。而竹盛矣。复自喜曰。余病其起也耶。因构小亭其中。食饮于是。坐卧于是。啸歌于是。起而行于是。倚而息于是。倾耳注目。(或不断)举手投足。(或不断)无不于是。其藉此以医吾之俗何如耶。吾量之隘俗也。竹之虚心有容足以医之。吾行之曲俗也。竹之通而带足以医之。吾待物混而无别。竹之理而析足以医之。竹之干云霄而直上。足以医吾志之卑。竹之历冰雪而愈茂。足以医吾节之变。其潇洒而可爱也。足以医吾之凝滞。其为箠为简为箠为笙箫为簠簋也。足以医吾陋劣而无所用。盖逾年。(或不断)而吾之病十已去二三矣。久之。(或不断)安知其体不飘然而轻举。其意不释然而无累。其心不充然而有得哉。||古之俞跗(或断)秦越人辈。竹奚以让为。然

而。(或不断)是竹也。不苦口。不瞑眩。不湔浣肠胃。不漱涤五脏。长公不余秘而授之。余用之。既有功绪矣。使人人皆用之。天下庶几无俗病与。||明年(或断)余将北去京师。京师地不宜竹。余恐去竹日远而病复作也。既以名其亭。复书此为记。迟他日归亭中。愿俾病根悉去之。不悞是竹尚纳我否。

嬰：被缠绕(或“缠绕”、“遭受”等)。

仅：几乎(或“将近”等)。

须：等待。

量：器量(或“度量”、“胸襟”等)。

余病其起也耶：我的病大概要好转了吧？

长公不余秘而授之：长公不对我隐秘而传授给我。

不悞是竹尚纳我否：不知道这些竹子还接纳我吗？

治愈笑性强迫症1例

河南夏邑县中医院 吕长青

北京中日友好医院 史载祥 指导

李××，男，28岁，1986年7月23日就诊。患者于一年前因家事不和，与家人发生口角，其后发现该患者日间除叹息外，常无故发笑，每小时狂笑大笑10余次不等，每次大笑持续5~6秒钟。由于终日张嘴大笑，自觉咽干舌燥，频频喝水，每天饮水约3000~5000毫升。既往健康，自幼胆小怕事，性格孤癖，家族中两系均无类似患者。检查：发育营养中等，意识清晰，衣冠整洁，对人有礼，对答切题，内科和神经系统检查无阳性体征，未发现幻觉、妄想。脑电图：正常。西医诊断为“笑性强迫症”，给予阿米替林、氟丙咪唑、利眠宁等药治疗，效果不佳。刻下：不自主发笑，胸闷善太息，心烦失眠，急躁易怒，口干口苦，常欲饮水，舌红苔黄，脉弦数，脉症合参，证属肝气郁结，气郁化火，火扰心神，神明错乱所致。治宜疏肝泄热，养血安神，方用丹栀逍遥散加减：

丹皮12克，栀子12克，柴胡12克，白芍12克，当归10克，薄荷10克，郁金12克，炙远志12克，酸枣仁15克，柏子仁12克，夜交藤15克，甘草6克。

煎服六剂后，胸闷善太息、心烦、失眠消失，哈哈大笑亦明显减少，平均每小时出现一次。又煎服10剂后，哈哈大笑基本控制，但微笑症状仍未消除，并伴有口干喜饮、急躁易怒等症，思火热之邪势必耗散阴液，阴虚阳亢，火邪内扰神明，改予滋补肝肾，养血安神之法，投一贯煎加减：

生地15克，北沙参15克，麦冬12克，枸杞子15克，炒川楝子10克，炙远志12克，酸枣仁15克，甘草6克。

煎服10剂后，诸症消失而告愈。为巩固疗效，又以养血安神片2瓶调理善后，随访一年半未再发作。

按：笑性强迫症临床少见，中医学虽无此病名，但最早在《内经》亦有记载，如《灵枢·本神篇》曰：“心藏脉，脉舍神，心气虚则悲，实则笑不休”。本例始由肝气郁结，气郁化火，火扰心神，神明错乱所致，故首用丹栀逍遥散以疏肝泄热，炙远志、酸枣仁、柏子仁、夜交藤以养血安神。后又火邪伤阴，阴虚阳亢，心神被扰而致余症未除，故改用一贯煎滋补肝肾，酸枣仁、炙远志养血安神，以调理善后，巩固疗效。