

3 结果

疗效判断标准:痊愈:症状消失,皮肤、巩膜黄染及体征消失,肝功能恢复正常,TBIL 降至 $17\mu\text{mol/L}$ 以下;显效:症状明显改善,皮肤、巩膜黄染及体征大有好转,TBIL 降至 $17\sim 25\mu\text{mol/L}$ 以下;有效:症状有所改善,皮肤、巩膜黄染及体征好转,血清总胆红素下降至 $25.6\sim 34\mu\text{mol/L}$;无效:症状无改善,体征、血清胆红素无变化。32 例经治疗 1 疗程后痊愈 14 例(43.8%);显效 10 例(31.2%);有效 4 例(12.5%);无效 4 例(12.5%),总有效率为 87.5%;病人在治疗 2 周后 18 例黄疸开始明显减退,但均未达 $17\mu\text{mol/L}$ 以下;30 天后 14 例黄疸退净。对照组:痊愈 6 例(30%),显效(25%),有效 2 例(10%),无效 7 例(35%)。两组疗效经 Ridit 检验,差异无显著性。

4 讨论

本方运用丹参味苦,性微寒,入血分,有清热凉血,祛瘀通络之效,从而有利于黄疸的消退。赤芍辛、苦,微寒,入肝经,清热凉血活瘀,清肝利胆。虎杖清热解毒,活血散瘀,与赤芍同用活血化瘀,清肝利胆,有促进胆汁排泄的作用。郁金辛散苦降,寒能清热,入心、肝二经,既能清而疏肝解郁,又能行血中之气而凉血破瘀。茵陈味苦,气微寒,功专清热利湿退黄,为治黄疸症主药。皂矾化痰祛湿。

李春棠以瞿麦为主治疗 囊肿性疾病的经验

河北省职工医学院附属医院(071000)

成 秀 梅

保定中医院李春棠主任,临证 50 余载。善以瞿麦为主治疗多种囊肿,取得了良好的效果,现介绍如下。

1 胰腺囊肿

李老治胰腺囊肿,除大量应用瞿麦外,还善于配伍厚朴、枳实、香附、郁金、玄明粉等药,以加重理气散结功效。

病例:罗某,男,52 岁,1990 年 7 月 23 日初诊。主诉上腹部胀满疼痛半年余,目黄 20 天。伴恶心,厌食油腻,口渴不欲饮,小便黄赤,大便不爽。体检:双侧巩膜黄染,于左上腹部可触及一肿物,表面光滑。舌质红,苔黄微腻,脉弦数。B 超示:胰腺囊肿, $4.5\text{cm}\times 3.2\text{cm}$ 大小。证属气滞湿热内阻。予瞿麦 50g,厚朴 10g,香附 15g,郁金 12g,金钱草 20g,玄明粉 3g,延胡索 10g,牡丹皮 10g,甘草 3g。水煎服,每日 1 剂。服 20 剂后,上腹疼痛及黄疸症状减轻。原方加苍术、黄柏各 15g,服 40 剂

后黄疸消退,B 超复查囊肿 $2.0\text{cm}\times 1.1\text{cm}$ 。由于患者长期吃中药不便,故改为单味瞿麦煎汁代茶饮服用。3 个月后 B 超复查囊肿消失。

2 多囊肾

李老治疗肾囊肿性疾病在重用瞿麦的同时,配伍温阳利水益气之品,如附子、桂枝、黄芪、茯苓、白茅根等。另外还酌情加入牡丹皮、丹参、当归、芍药等凉血活血药物。

病例:李某,男,50 岁,1991 年 8 月 3 日初诊。主诉腰痛反复发作,间断血尿 2 年余,加重伴双下肢水肿 10 天。纳食欠佳,小便不利,神疲体倦,面色桃白。2 年前 B 超示:多囊肾、肾积水。舌质淡、苔白滑,脉沉。中医辨证属阳虚水饮内停。处方:瞿麦 60g,白茅根 30g,茯苓 10g,牡丹皮 10g,丹参 20g,当归 10g,白芍 10g,附子 5g,黄芪 50g,桂枝 10g,泽泻 20g,甘草 3g。水煎服,每日 1 剂。服用 15 剂,血尿控制,其它症状减轻。上方去白茅根、牡丹皮,加淫羊藿 15g,继续服用半年,浮肿消失,B 超复查示肾体较前缩小,积水减少。以后改为瞿麦煎汁代茶饮长期服用,随访至 1998 年初病情未继续发展。

奇授藿香丸治疗慢性鼻窦炎 54 例

湖北医科大学附属第一医院(430060)

朱素琴 刘公汉 马铭钧

我们对已经采用通常的非手术疗法治疗,效果不显的 54 例慢性鼻窦炎患者,用奇授藿香丸进行治疗,现报告如下。

1 临床资料

选择具有较典型的临床症状和体征,经上颌窦穿刺确诊,能够坚持门诊治疗者共 54 例。计男性 22 例,女性 32 例。本组病例均接受过上颌窦穿刺冲洗,冷冻,鼻息肉摘除术,中隔矫正术,变压置换疗法,理疗及药物治疗等多种疗法,但疗效皆不满意。均有程度不等的鼻阻、脓涕多、头痛、嗅觉减退等症,并经上颌窦穿刺获脓液者。

2 治疗方法

组方成分:藿香叶 8 份,苍耳子 5 份,猪胆汁 9 份,蜂蜜适量。先将藿香叶研成粉末,将苍耳子分煎数次,取浓汁。将猪胆汁煎煮浓缩,最后再将粉、汁混合,加入适量蜂蜜炼蜜为丸,如绿豆大小。成人每日 2 次,每次 15g,小儿酌减,饭后温开水吞服,5 周为一疗程。

3 治疗结果

痊愈:临床鼻阻、脓涕、头痛等症状消失或基本消失。嗅觉好转,中鼻道无蓄脓。复查上颌窦穿刺无脓液。