

- (3):162.
- 10 张淑玲,朱闽,沈迪.根皮甙治疗糖尿病的实验研究.中国中西医结合脾胃杂志,1996,4(3):151.
 - 11 王佳珍,黄小明,陈秀芳.月见草油和多烯康对糖尿病大鼠胰岛素抵抗的治疗作用.浙江医学,1998,20(1):24.
 - 12 方朝晖,陶文,杨升杰,等.真菌降脂素对糖尿病模型大鼠血脂质、胰岛素、C 肽及血液流变学的影响.中医药研究,1997,13(1):42.
 - 13 刘永玉,毛良,莫启忠,等.实验性 NIDDM 大鼠的胰岛素抗性.中国病理生理杂志,1991,7(4):422.
 - 14 熊曼琪,梁柳文,林安钟,等.加味桃仁承气汤治疗Ⅱ型糖尿病的临床和实验研究.中国中西医结合杂志,1992,12(2):74.
 - 15 朱章志,熊曼琪,林安钟,等.三黄降糖方对Ⅱ型糖尿病患者外周胰岛素抵抗的影响.中国中西医结合杂志,1997,17(10):590.
 - 16 熊曼琪,林安钟,朱章志,等.加味桃仁承气汤对Ⅱ型糖尿病大鼠胰岛素抵抗的影响.中国中西医结合杂志,1997,17(3):165.
 - 17 李惠林,熊曼琪,邓尚平,等.加味桃仁承气汤对实验性糖尿病大鼠胰岛素受体的影响.中国中西医结合杂志,1995,15(基础理论研究特集):388.
 - 18 申竹芳,谢明智,刘海帆.金芪降糖片对实验动物血脂、胰岛素抗性 & 免疫功能的影响.中药新药与临床药理,1997,8(1):23.
 - 19 冯世良,高斌,白淑英,等.应用胰岛素敏感性指数研究中药对Ⅱ型糖尿病人胰岛素抵抗的作用.中医杂志,1997,38(2):100.
 - 20 陈少华,孙玉萍,陈秀杉,等.降糖康对Ⅱ型糖尿病患者血糖、血液粘度、胰岛素敏感性等指标的影响.中国中西医结合杂志,1997,17(11):666.
 - 21 徐云生.中药对磺脲类降糖药治疗失效的Ⅱ型糖尿病作用观察.中医杂志,1997,38(3):167.
 - 22 徐云生,杜丙会.中西医结合治疗 X 综合征 30 例.山东中医杂志,1998,17(5):224.
 - 23 周鹏.优降糖和中成药渴乐宁胶囊联合治疗Ⅱ型糖尿病的临床观察.中国中西医结合杂志,1997,17(1):29.
 - 24 谌剑飞.针治糖尿病的血浆胰岛素含量变化研究.中医杂志,1986,(6):42.
 - 25 许能贵,梁兴伦.针刺对自发性高血压大鼠血压及胰岛素抵抗的效应研究.中国针灸,1997,(8):493.
 - 26 DeFronzo RA, Ferrannini E. Insulin resistance. A multifaceted syndrome responsible for NIDDM, obesity, hypertension, dyslipidemia, and atherosclerotic cardiovascular disease. Diabetes Care, 1991,14(3):173.
 - 27 李光伟,潘孝仁,Stephen Lillioja,等.检测人群胰岛素敏感性的一项新指标.中华内科杂志,1993,32(10):656.
 - 28 DeFronzo RA, Tobin JD, Andres R. Glucose clamp technique: a method for quantifying insulin secretion and resistance. Am J Physiol, 1979,237(3):E214.

巨髌穴透刺法治疗双侧面瘫 12 例

吕 小 桃*

双侧面瘫临床罕见,表现为双侧面部表情肌运动丧失,不能作蹙额、皱眉、露齿、吹哨、鼓腮等动作,上下眼睑不能闭合,流泪、流涎、不能张嘴,只可进流食。给患者生活美容方面造成极大痛苦。经临床观察发现巨髌穴透刺法治疗双侧面瘫疗效满意,现报告如下。

1 临床资料

12 例患者均来源于门诊及住院病人。男性 8 例,女性 4 例;病程最短 3 天,最长 18 个月,年龄最小 16 岁,最大 73 岁,平均 43 岁。

2 治疗方法

巨髌穴透刺法:取巨髌为中心向四白、颧髌、地仓透刺,或反透刺亦可。配穴法:风寒者加外关,肝阳上亢加太冲,肝肾阴虚加太溪,耳后疼痛加翳风,味觉障碍加廉泉,听觉过敏加听官,谷合善治头面诸疾。旋提旋

插手法使巨髌穴行针得气,大指向后,食指向前,针下出现阻力,由深而浅向上提为泻,大指向前,食指向后,针下出现阻力,由浅而深向下插为补。5~10 分钟重复手法。

3 治疗结果

疗效标准:痊愈:临床症状及体征全部消失。显效:临床症状及体征基本消失。好转:临床症状减轻,体征部分恢复。无效:治疗前后症状体征无改变。12 例中,痊愈 9 例,占 75%,显效 2 例,占 15%,好转 1 例,占 10%,总有效率 100%。12 例患者治疗日最少 15 天,最多 45 天,平均 28 天。

4 讨论

巨髌穴属足阳明胃经,与足太阳、足少阳经相交。穴位位于鼻旁颧骨内下缘。而手足三阳经脉循行均与颧部有密切关系。面瘫病多因外风侵袭使筋肉弛缓不收,故取巨髌穴为临床最有效之选择。

* 山西省人民医院,太原市双塔东街 17 号(030012)

收稿日期:1998-08-19