

表热。

王洪绪《外科证治全生集》治疗阳证，重用“醉盖取汗”的醒消丸、蟾酥丸、梅花点舌丹等丸剂（见阳症门痈疽篇），利用其解表而排除一切阳毒。至于阴证，则也是“滋补而不兼开腠，仅可补其虚弱，则寒凝之毒，何以能觅路行消？且毒盛者反受其助”（见痈疽总论篇）。“非麻黄不能开其腠理，……腠理一开，寒凝一解，气血乃行，毒亦随之消矣”（见阴疽治法篇）。由此可证，王氏正因为能掌握好汗法而得以提高了消散率。

麻黄，是解表中最有名的出汗药。用于外科，有两张名方，一为七星剑汤，一为阳和汤，其中主药，就是麻黄。

这两方，一治大热大毒的阳证，一治至阴

至里的阴证，而麻黄以出汗的表药起到这样大的作用，这不是偶然的。更能证明认为汗法仅是用之于表寒表热、风寒风热的见解，是十分不全面的。

通过以上讨论，可见汗法并不是单单用来处理表证，它是适用于一切痈疽的前期或中期偏前。汗法对外症的适应范围是：不论阴证、阳证；不论内、外、深、浅；不拘皮、肉、筋、脉、骨；不拘气滞、血瘀痰凝、热毒。

最后，必须指出它的慎重使用问题。固然《卫生宝鉴》《普济方》等书都一致推崇地认为“汗之则疮已”，但毕竟也有其禁忌症。一般在下列两个情况下，就宜考虑：第一，为阴虚之体。第二，为出汗本已嫌多或夏令暑天。

（于千整理）（续完）

推拿治疗外伤性眼外肌麻痹10例

内蒙古医学院附属医院 雷 征 艾育德

外伤性眼外肌麻痹是眼科较为常见的眼病，最多受累的眼肌是外直肌和上斜肌，症状为头歪、眼斜、姿态异常以及复视。目前西医无特殊疗法，我们运用推拿治疗该病10例取得满意疗效。现介绍如下：

一、一般资料

本组病例均经眼科诊断，属外直肌麻痹者6例，上斜肌麻痹者4例。男性6例，女性4例。年龄4~66岁。其中被钝器击伤者4例，拳击伤者6例。病程1个月以内至1年，疗程最短6天，最长2个月。

二、手法操作

患者取仰卧位，医者先用一指禅推法推睛明、承泣、四白、太阳穴，后用双手拇指分别按揉百会、鱼腰、攒竹、睛明、瞳子髻、丝竹空、风池、太阳穴，再用双拇指指腹分抹眼眶周围。上述手法反复交替使用，约治疗20分钟。

患者取坐位，医者在患者背部点揉肝俞、胆俞及拿对侧合谷穴及下肢光明穴约5~10分钟，全套手法治疗30分钟左右，每日一次，10天为一疗程。

三、疗效观察

10例患者治疗后患侧眼球位置均恢复到正位，眼球各方运动特别是转向麻痹肌作用方向均不受限制，向麻痹肌方向注视时复视现象消失，达到治愈标准。

四、病案举例

田×，男，56岁，1988年5月6日就诊。左侧头部被木棍击伤后左眼内斜伴复视一月。查体：视力右1.0，左1.0，双眼外部及眼底检查正常，角膜映光法查左眼内斜15°，外转受限不过中线，复像为水平性，双眼向左侧注视时复像分离距离最大，左眼像在外侧，头位不明显，全身查体正常，脑电图及CT检查正常。诊断为左眼外直肌麻痹。经过推拿治疗10次而痊愈。

五、讨论

中医认为外伤性眼外肌麻痹都是由于外伤导致的人体气血、经络、脏腑功能发生紊乱，以致眼部肌肉的脉络受阻，气血不通，眼肌失其濡养，筋脉挛急，眼球运动失灵，偏于某一侧而出现眼斜、复视。推拿治疗则能疏通其经脉，调节气血之运行，特别是取膀胱经之睛明、攒竹，胃经之承泣、四白，少阳经之丝竹空以及鱼腰、太阳等穴，都紧靠眼眶而且各穴都具有通经活络、调节气血运行之功效，尤以鱼腰、太阳二穴善于缓解经脉挛急，而合谷为治疗头面部疾患的要穴。肝开窍于目而与胆相表里，取膀胱经的肝俞、胆俞，胆经之光明穴以利肝胆之气，通调经络气血，诸穴相伍，而达到治疗目的。