

高等中医自学考试及中医晋升考试辅导

四川省 1987 年下半年高等中医自学考试

《中医儿科学》试题

一、单项选择题(每小题 1 分,共 25 分。在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案,并将正确答案的符号写在题后面的括号内)

1. 《小儿斑疹备急方论》的作者是: ()
① 扁鹊 ② 巫方 ③ 陈文中 ④ 董汲
2. “生机蓬勃,发育迅速”的生理特点,说明小儿是: ()
① 纯阳之体 ② 稚阴未长 ③ 稚阳未充 ④ 阳多阴少
3. 新生儿期是指从出生至: ()
① 28 天 ② 29 天 ③ 30 天 ④ 40 天
4. 咳嗽痰壅,痰白而稀,胸闷纳呆,神乏困倦,舌质淡红,舌苔白腻,脉象濡滑。当以下列何法治之? ()
① 化痰止咳 ② 健脾燥湿 ③ 健脾化痰 ④ 化痰燥湿
5. 小儿哮喘缓解期,治疗肺气虚弱的首选方剂是: ()
① 六君子汤 ② 玉屏风散 ③ 人参五味子汤 ④ 补中益气汤
6. “疳气”病儿易发脾气是由于: ()
① 肝气抑郁 ② 肝火太旺 ③ 土虚木旺 ④ 肝阴不足
7. 新生儿脐带脱落以后,脐部红肿热痛有溃烂,脓水流溢,诊断为: ()
① 脐血 ② 脐疝 ③ 脐湿 ④ 脐突
8. 治疗寒湿阻滞型胎黄的首选方剂是: ()
① 茵陈术附汤 ② 茵陈五苓散 ③ 茵陈理中汤 ④ 参苓白术散
9. 气阴虚弱型汗证,若见精神困顿,食少不眠,不时汗出,面色无华者,乃是: ()
① 气阳偏虚 ② 阴血不足 ③ 气阴两伤 ④ 肝肾阴亏
10. 超过几岁的小儿,不能自主控制排尿,睡时

经常遗尿者,才能诊断为遗尿? ()

- ① 2 岁 ② 3 岁 ③ 4 岁 ④ 5 岁
11. 治疗解颅属脾虚水泛型的首选方剂是: ()
① 实脾饮 ② 参苓白术散合猪苓汤 ③ 防己黄芪汤 ④ 附子理中汤合五苓散
12. 治疗五软证脾肾两亏型的首选方剂是: ()
① 虎潜丸合四君子汤 ② 补肾地黄丸合补中益气汤 ③ 加味金刚丸合参苓白术散 ④ 附子理中汤
13. 疫毒痢的临床表现,哪一项是错误的? ()
① 可发生内闭外脱的危象 ② 发热、抽风、昏迷 ③ 突然起病 ④ 下痢脓血为必先出现的症状
14. 《温病条辨·解儿难》中指出的“小儿肤薄神怯,经络脏腑嫩小,不耐三气发泄,邪之来也,势如奔马,其传变也,急如掣电”指的是: ()
① 丹痧 ② 白喉 ③ 小儿麻痹症 ④ 暑温
15. “疳腮”之病理,为外感风温邪毒壅阻于: ()
① 少阳经脉 ② 阳明经脉 ③ 厥阴经脉 ④ 太阳经脉
16. 出疹性疾病中,见咽喉肿痛,甚则腐烂的疾病是: ()
① 麻疹 ② 风痧 ③ 丹痧 ④ 奶麻
17. 麻疹初热期的诊断依据,最主要是: ()
① 泪水汪汪 ② 眼睑红赤 ③ 倦怠思睡 ④ 麻疹粘膜斑
18. 小儿水肿湿热内侵型的水肿特点是: ()
① 浮肿不明显 ② 下肢浮肿明显 ③ 眼睑浮肿明显 ④ 全身浮肿明显
19. 风痫的治疗首选方剂是: ()

① 益脾镇惊散 ② 定魄丸 ③ 定痫丸 ④ 羚角钩藤汤

20. 慢惊风, 土虚木亢型, 证见胃阴虚而肝阳亢动者, 可用: ()

① 益胃汤加减 ② 增液汤加减 ③ 连梅汤加减 ④ 一贯煎加减

21. 治疗小儿乳食积滞腹痛的首选方剂是: ()

① 香砂平胃散 ② 楂曲平胃散 ③ 枳实导滞丸 ④ 木香导滞丸

22. 小儿暴泻不止, 便稀如水, 面色苍白, 神疲气弱, 表情淡漠, 四肢厥冷, 冷汗, 舌淡苔白, 脉象沉微。其治法是: ()

① 益气温中 ② 温阳救逆 ③ 温中补肾 ④ 回阳固本

23. 小儿哺乳后, 乳汁自口角溢出, 其原因多为: ()

① 受凉 ② 受热 ③ 受惊 ④ 以上都不是

24. 脐风多在生后几日内发生? ()

① 1~2 天 ② 3~4 天 ③ 4~7 天 ④ 7~10 天

25. 小儿断奶时间, 一般为: ()

① 5~7 个月 ② 8~12 个月 ③ 12 个月~1 岁半 ④ 1.5 岁~2 岁

二、多项选择题(每小题 1 分, 共 25 分。每小题各有五个备选答案, 其中有 2~5 个是正确的, 请将正确答案全部选出, 并将正确答案的符号写在该题后的括号内。凡正确答案未选全, 或有错选者, 都不能得分)

1. 小儿五脏辨证中, 下列哪几项属肝脏本病? ()

① 大叫 ② 目直视 ③ 颈项强直 ④ 四肢抽搐 ⑤ 神昏

2. 哪些是鹅口疮虚火上浮型的主症? ()

① 口舌白屑稀疏 ② 形体怯弱 ③ 大便秘结 ④ 面白颧红 ⑤ 神气困乏

3. 以下哪些是肺炎喘嗽常见的证型? ()

① 风寒闭肺 ② 风热闭肺 ③ 痰浊滞肺 ④ 痰热闭肺 ⑤ 心火乘肺

4. 五硬的治疗原则有: ()

① 活血化瘀 ② 益气温阳 ③ 回阳救逆 ④ 温经通络 ⑤ 补肾养肝

5. 以下哪几项因素可以导致小儿口舌生疮? ()

① 婴儿胎中受热 ② 脾胃湿热内蕴 ③ 热病后火盛阴伤 ④ 口腔不洁和破损, 秽毒入侵 ⑤ 食积之火上熏口舌

6. 小儿泄泻的主症是: ()

① 大便次数增多 ② 粪量或多或少 ③ 粪质稀薄或如水样 ④ 粪色青白或黄 ⑤ 粪内多夹完谷不化

7. 小儿厌食证的证型有: ()

① 脾虚夹食 ② 脾运失健 ③ 胃阴不足 ④ 脾胃气虚 ⑤ 脾胃阴虚

8. 急惊风的病变主要在: ()

① 心 ② 肝 ③ 脾 ④ 肺 ⑤ 肾

9. 姜片虫的主要症状是: ()

① 腹痛 ② 慢性腹泻 ③ 形体消瘦 ④ 嗜食异物 ⑤ 夜寐不宁

10. 小儿感冒的发病原因是: ()

① 脏腑娇嫩, 肌肤疏薄 ② 生机蓬勃, 发育迅速 ③ 寒暖不能自调 ④ 饮食不知自节 ⑤ 四时气候骤变

11. 小儿感冒挟滞时, 临床表现为感冒症状兼见: ()

① 不思饮食 ② 呕吐酸腐 ③ 大便酸臭 ④ 惊惕啼叫 ⑤ 舌苔厚腻

12. 风痧的常见证型有: ()

① 邪郁肺卫 ② 邪热炽盛 ③ 邪陷心肝 ④ 毒在气营 ⑤ 疹后阴伤

13. 水痘的分布特点有: ()

① 躯干为主 ② 腋窝、肘弯及腹股沟最明显 ③ 最后手心、足底、鼻准部都见疹点 ④ 口腔粘膜、眼结合膜亦可见疹点 ⑤ 面部皮肤仅有红晕, 不见疹点

14. 顿咳痉咳期的典型症状为: ()

① 阵发性痉咳 ② 发作时连咳持续 ③ 日重夜轻 ④ 咳后有鸡鸣样回声 ⑤ 必待吐出痰涎及食物后, 痉咳暂缓解

15. 小儿暑温, 邪在气营的典型症状表现是: ()

① 夜热早凉 ② 神志昏迷 ③ 颈项强直 ④ 四肢抽搐 ⑤ 舌红绛, 苔黄糙

16. 小儿麻疹症候的特点: ()

① 不规则 ② 不对称 ③ 多见于上肢 ④ 弛缓性 ⑤ 病久形成骨骺畸形

17. 疫毒痢的常见证型有: ()

① 湿热内蕴 ② 食积化热 ③ 毒邪内闭 ④

内闭外脱 ⑤ 风寒外束

18. 疰夏各型的常用治法有: ()

① 清暑泄热 ② 健脾益气 ③ 醒脾化湿 ④ 温补脾胃 ⑤ 补益气血

19. 夏季热的病因可归于: ()

① 护理不当 ② 体质因素 ③ 某种诱因 ④ 冒受暑气 ⑤ 遗传因素

20. 小儿湿热下注型尿频的主要症状有: ()

① 尿频、短赤 ② 尿道灼热、疼痛 ③ 腰部酸痛 ④ 下肢浮肿 ⑤ 少腹胀坠

21. 小儿紫癜证属肾阳不足者, 临床可见: ()

① 紫癜出血不多 ② 精神萎软, 神倦乏力 ③ 畏风怕冷, 四肢欠温 ④ 低热盗汗 ⑤ 面色㿠白不华

22. 小儿脾脏虚寒型夜啼的症状有: ()

① 夜间突然啼哭, 似见异物 ② 精神不安, 时作惊惕 ③ 四肢欠温, 吮乳无力 ④ 便溏溲清 ⑤ 舌质红, 苔黄

23. 治疗赤游丹的常选方剂有: ()

① 犀角解毒饮 ② 黄连解毒汤 ③ 神犀丹 ④ 清瘟败毒饮 ⑤ 五味消毒饮

24. 初生儿出生后一周内常见疾病有: ()

① 脐风 ② 脐血 ③ 脐疮 ④ 口疮 ⑤ 胎黄

25. 脐突的发病原因是: ()

① 脐部护理不当 ② 脐部发育不全 ③ 不洁之污物污染 ④ 啼哭叫扰过度 ⑤ 脐带结扎过松

三、判断分析题(每小题5分, 共20分。判断正误, 并将“正”或“误”写在该题后的括号内, 并简述其理由)

1. 肺炎喘嗽重证病儿, 常有颜面苍白, 口唇、爪甲、舌质发紫等气滞血瘀证象出现。()

2. 麻疹、风痧、奶麻、丹痧四种发疹性时行疫病的恢复期中, 只有麻疹, 丹痧二病出现脱皮, 并留色素沉着。()

3. 小儿疳证, “胃气杳然”则预后不良。()

4. 小儿用药时, 要忌用攻伐之品。()

四、简答题 每小题5分, 本大题共15分。(答题要求简要明确。)

1. 为什么小儿患病后易趋康复?

2. 丹痧的面部表现是怎样的?

3. 小儿指纹的部位在何处?

五、论述题(8分)

试论小儿麻痹症的病因病理。

六、病案处理(7分。要求按以下四项答题, 需有方有药)

患儿梁××, 男, 6岁。

双下肢有针尖样瘀点, 伴低热, 右膝部肿痛三天。

患儿三天前发现双下肢有针尖样瘀点, 压之不退色, 伴低热(体温37.6℃), 右膝部肿痛, 在本单位医务室服扑炎痛等药未愈而来就诊。

现查见患儿双下肢有针尖样出血点, 压之不退色, 臀部有大块紫斑, 颜色鲜红, 压之亦不退色。腹部隐痛不适, 今日大便一次, 呈褐色, 小便颜色黄赤, 舌质红, 舌苔黄, 脉数。

体温37.6℃(患儿于发病前三天食过虾蟹之物)

实验室检查: 周围血象: 白细胞12000/mm³, 中性74%, 淋巴25%, 单核1%, 血小板20万/mm³。大便潜血试验(+++), 小便常规: 蛋白(-), 红细胞(+++)。

诊断: 辨证分型; 治法: 方药:

蒲公英败酱草治疗足癣

西北铁合金厂铁路运输公司 尹国祖

自1984年以来笔者用蒲公英、败酱草二药治疗足癣十多人, 均获得满意的疗效, 介绍如下。

方法: 鲜公英、鲜败酱草各500克, 洗净切碎, 放在盆内加水1500毫升, 煮开后煎10分钟, 离火待温浸泡患部, 以不烫伤皮肤为度。凉后再加热浸泡, 每剂如此反复三次即可。

病例: 孙××, 男性, 52岁, 1986年6月诊。两足趾缝间起小水疱、溃破、糜烂、奇臭而痒数十年, 每当冬季转轻, 夏季糜烂合并感染, 局部红肿, 鼠蹊淋巴结肿胀疼痛。用上药一剂后, 糜烂处渗出液减少, 溃烂部开始收敛, 红肿也消退。按上法连用三剂后, 溃烂好转, 鼠蹊部疼痛消失。随访2年未再复发。