

内闭外脱 ⑤ 风寒外束

18. 疰夏各型的常用治法有: ()

① 清暑泄热 ② 健脾益气 ③ 醒脾化湿 ④ 温补脾胃 ⑤ 补益气血

19. 夏季热的病因可归于: ()

① 护理不当 ② 体质因素 ③ 某种诱因 ④ 冒受暑气 ⑤ 遗传因素

20. 小儿湿热下注型尿频的主要症状有: ()

① 尿频、短赤 ② 尿道灼热、疼痛 ③ 腰部酸痛 ④ 下肢浮肿 ⑤ 少腹胀坠

21. 小儿紫癜证属肾阳不足者, 临床可见: ()

① 紫癜出血不多 ② 精神萎软, 神倦乏力 ③ 畏风怕冷, 四肢欠温 ④ 低热盗汗 ⑤ 面色㿠白不华

22. 小儿脾脏虚寒型夜啼的症状有: ()

① 夜间突然啼哭, 似见异物 ② 精神不安, 时作惊惕 ③ 四肢欠温, 吮乳无力 ④ 便溏溲清 ⑤ 舌质红, 苔黄

23. 治疗赤游丹的常选方剂有: ()

① 犀角解毒饮 ② 黄连解毒汤 ③ 神犀丹 ④ 清瘟败毒饮 ⑤ 五味消毒饮

24. 初生儿出生后一周内常见疾病有: ()

① 脐风 ② 脐血 ③ 脐疮 ④ 口疮 ⑤ 胎黄

25. 脐突的发病原因是: ()

① 脐部护理不当 ② 脐部发育不全 ③ 不洁之物污染 ④ 啼哭叫扰过度 ⑤ 脐带结扎过松

三、判断分析题(每小题5分, 共20分。判断正误, 并将“正”或“误”写在该题后的括号内, 并简述其理由)

1. 肺炎喘嗽重证病儿, 常有颜面苍白, 口唇、爪甲、舌质发紫等气滞血瘀证象出现。()

2. 麻疹、风痧、奶麻、丹痧四种发疹性时行疫病的恢复期中, 只有麻疹, 丹痧二病出现脱皮, 并留色素沉着。()

3. 小儿疳证, “胃气杳然”则预后不良。()

4. 小儿用药时, 要忌用攻伐之品。()

四、简答题 每小题5分, 本大题共15分。(答题要求简要明确。)

1. 为什么小儿患病后易趋康复?

2. 丹痧的面部表现是怎样的?

3. 小儿指纹的部位在何处?

五、论述题(8分)

试论小儿麻痹症的病因病理。

六、病案处理(7分。要求按以下四项答题, 需有方有药)

患儿梁××, 男, 6岁。

双下肢有针尖样瘀点, 伴低热, 右膝部肿痛三天。

患儿三天前发现双下肢有针尖样瘀点, 压之不退色, 伴低热(体温37.6℃), 右膝部肿痛, 在本单位医务室服扑炎痛等药未愈而来就诊。

现查见患儿双下肢有针尖样出血点, 压之不退色, 臀部有大块紫斑, 颜色鲜红, 压之亦不退色。腹部隐痛不适, 今日大便一次, 呈褐色, 小便颜色黄赤, 舌质红, 舌苔黄, 脉数。

体温37.6℃(患儿于发病前三天食过虾蟹之物)

实验室检查: 周围血象: 白细胞12000/mm³, 中性74%, 淋巴25%, 单核1%, 血小板20万/mm³。大便潜血试验(+++), 小便常规: 蛋白(-), 红细胞(+++)。

诊断: 辨证分型; 治法: 方药:

蒲公英败酱草治疗足癣

西北铁合金厂铁路运输公司 尹国祖

自1984年以来笔者用蒲公英、败酱草二药治疗足癣十多人, 均获得满意的疗效, 介绍如下。

方法: 鲜公英、鲜败酱草各500克, 洗净切碎, 放在盆内加水1500毫升, 煮开后煎10分钟, 离火待温浸泡患部, 以不烫伤皮肤为度。凉后再加热浸泡, 每剂如此反复三次即可。

病例: 孙××, 男性, 52岁, 1986年6月诊。两足趾缝间起小水疱、溃破、糜烂、奇臭而痒数十年, 每当冬季转轻, 夏季糜烂合并感染, 局部红肿, 鼠蹊淋巴结肿胀疼痛。用上药一剂后, 糜烂处渗出液减少, 溃烂部开始收敛, 红肿也消退。按上法连用三剂后, 溃烂好转, 鼠蹊部疼痛消失。随访2年未再复发。