

中医药治疗 II、III 期宫颈癌 30 例 10 年疗效观察

陕西省兴平县中医医院肿瘤科 田 景 丰

笔者自1967年以来,即用中医药治疗癌肿。为了探索中医药治疗癌肿远期疗效,现整理1970~1977年用中医药内外合治方法为主,治疗II、III期宫颈癌患者共30例,远期疗效较满意。现介绍如下:

一、临床资料

本组30例中最大年龄67岁,最小年龄26岁,多数在50岁左右。经临床诊断宫颈癌II期19例,III期11例,其中放疗后复发5例,均病理诊断为宫颈鳞癌。放疗后复发2例,用中药内服治疗,其余均予内外合治。全部患者住院治疗。

二、治疗方法

1. 中药内服:内服基本方由黄芪、当归、白术、莢术、三棱、白花蛇舌草、仙鹤草、半枝莲、败酱草组成。肝郁气滞者去黄芪,加柴胡、陈皮、郁金、茯苓、白芍;肝肾阴虚者加女贞子、枸杞子、山萸肉、生地;虚火较甚者加黄柏、知母;湿热瘀毒者减白术,加土茯苓、蒲公英、生薏仁、滑石、车前子、丹参、黄柏;心脾两虚者去败酱草,加党参、茯苓、阿胶、龙眼肉、生龙牡、酸枣仁、陈皮;出血加三七粉、小蓟炭、阿胶;少腹痛或小腹痛加元胡、制乳没、香附;腰疼加川断、桑寄生、狗脊;便秘加蜂蜜;尿赤短加木通、瞿麦、蒲蓄。每日一剂,分三次服,每周服六剂,休息一日。若宫颈连续三次刮片无癌细胞,局部停止上药,再续服三个月以善其后。本组疗程(不包括善后药、间歇服药)最短两个月,最长10个月,一般4~6个月。从治疗起三年内,每半年内服中药一个月,以巩固疗效。

2. 中药外用:

(1) 二白散:功用去腐止血,促进局部癌细胞脱落。取白矾、白砒各等分,先放白砒于瓦罐中,次以白矾末盖之,用火煨至青烟尽,白烟起,取出研末,供局部用。

(2) 二品条:功用摧毁颈管内癌灶及组织。取二白散与捣烂的适量熟粳米,制成粗细不等条型,阴干供局部用。

(3) 三黄散:功用清热燥湿,有控制炎症,促进上皮新生的作用。取黄连、黄柏、大黄、煅炉甘石、枯矾、煅石膏各等分,冰片少许,共研细末,供局部用。

常规消毒阴道壁,于宫颈病灶上放二白散30~50 mg,同时用凡士林纱布保护正常阴道壁,一般隔日上药一次。待病灶呈灰白色,改用三黄散至癌组织自行脱落,此时若用探针触及宫颈病灶处仍质硬,再上二白散。二白散不得连用二次以上。二白散与三黄散常交替使用。若复盖宫颈口的癌组织脱落,即可插入二品条于颈管内,五日内不得上二白散。若伤面腐肉已净,用探针触及宫颈组织质软,此时作宫颈刮片细胞学检查,若连续三次未找见癌细胞,即以三黄散收功。用药后有少数病人感觉下腹疼痛或不适,持续半日至一日可自行缓解。若将二白散装瓶内放置一年后,或外用二白散、二品条时,加用蟾酥粉,并在内服药中加入银花、生甘草、蒲公英等,均可减轻疼痛。

三、治疗效果

按1972年全国抗癌药物经验交流学习班所拟定的“子宫颈癌疗效标准”统计疗效,统计结果见附表。本组病例近期治愈17例(56.7%),

附表 II、III期宫颈癌 30 例疗效统计

分期	例数	近期疗效				远期疗效(存活期)		
		治愈	显效	有效	无效	3年	5年	10年
II期	19	12	3	1	3	16	13	12
III期	11	5	4	0	2	7*	4 [△]	4 [△]
合计	30	17	7	1	5	23	17	16

* 5例带瘤生存; [△] 1例带瘤生存。

显效7例(23.3%), 有效1例(3.3%), 无效5例(16.7%)。经分析, 宫颈癌II期和III期的近期疗效无显著性差异。治疗后3年随访, 生存23例(76.7%); 5年随访, 生存17例(56.7%); 10年随访, 生存16例(53%)。

四、讨论

笔者认为, 本病系由正气不足, 冲任损伤, 邪气滞留胞络, 导致湿热瘀毒凝聚所酿成。宫颈癌是整体性疾病在局部的反映。

在30例患者的临床证候中, 血瘀证表现除舌质暗红7例外, 舌下静脉曲张或瘀点16例, 占本组53.3%; 多数病例在不同程度上兼有湿热瘀毒证候, 提示本病有其共性, 用药似有规律可循。我们自拟的“内服基本方”适用于癌肿未愈而自觉症状消失及善后用药、间歇服药者。方中黄芪、白术甘温益气健脾; 血为

气之母, 故辅以当归补血和营; 仙鹤草止血, 且有强壮补虚之功; 三棱、莪术逐瘀; 白花蛇舌草、半枝莲、败酱草清热解毒、活血化瘀、利湿消肿。综观全方, 凉而不寒, 补而不滞, 补中寓攻, 攻中寓补, 有益气健脾、清热解毒、活血化瘀止血和利湿消肿的功用。

从宫颈癌局部来看, 其病灶似外科的外痔与息肉之类, 故选用腐蚀攻毒很强的白砒和收敛止血的白矾组成“二白散”, 此方源于张觉人所著《外科十三考》, 专治痔漏, 由三品一条枪衍化而来, 可直接使癌细胞脱落。临床观察到, 部分宫颈癌灶上二白散后, 阴道壁上1/5处出现充血、水肿。腐肉已净后宫颈出现糜烂面, 中医谓之“湿毒”, 因而配合选用能清热燥湿的治急性湿疹效方“三黄散”。由于局部上药, 药证合拍, 奏效明显。

本文部分宫颈癌III期患者取得远期治愈的效果, 其中有2例复发性宫颈癌是单用内服基本方加减治愈的。本组病例中也有经内外合治未能取得近期治愈而转入门诊只服内服药者, 部分病例仍取得3~10年带瘤生存效果。由于重视整体治疗, 细致辨证, 分清主次用药, 强调服善后药, 间歇服药, 体现了中医治病求本, 因此获得了较满意的生存10年的远期疗效。

蜂蜜治疗水蛭咬伤阴道出血

广西桂林市第二人民医院妇产科 龙筱梅

水蛭, 民间称蚂蟥, 吸血时分泌水蛭素, 使被咬伤者伤口局部血液凝固延迟。南方幼儿多喜下水嬉戏, 易被水蛭咬伤外阴或阴道, 引起局部出血不止。多年来, 在临床用蜂蜜治疗水蛭咬伤阴道出血10例, 效果良好, 现介绍如下:

一、病例资料: 10例患儿平均年龄5岁半, 咬伤后出血至就诊时间, 2小时内1例, 2~3小时2例, 3~4小时4例, 4~5小时3例。咬伤部位均在阴道。

二、治疗方法与结果: 从病史和体检得出确诊后, 让患儿取膀胱截石位, 用一灭菌导尿管或塑料软

管插入阴道, 而后用注射器吸取20~30毫升蜂蜜经导管缓缓注入阴道内, 静卧观察5~30分钟。待血止后患儿方可起身活动, 阴道内蜂蜜任其自然流出。

经治疗后, 10分钟止血者2例, 20分钟止血者4例, 30分钟止血者3例, 有1例经注入蜂蜜治疗后8小时仍未完全止血, 后辅以压迫止血, 5分钟即止血。血止后, 可根据患儿全身情况, 给予适当输液。

三、小结: 蜂蜜外用有收敛、营养、生肌和促进伤口愈合作用, 对各类细菌有不同程度的抑菌作用。局部使用时, 可不作其它消毒处理。此方法操作简单, 药源丰富, 极易于基层乡村医疗单位采用。