

们的用药原则若与之相比较,有很多相似之处。

外伤性截瘫康复期合并尿路感染的中药治疗,除发热者外,临床上以补中益气汤、保元汤、知柏地黄汤、五子衍宗丸为最常用。现代研究表明,上述方剂的主药如黄芪、人参、白术、茯苓、山药、生地、山茱萸、黄柏、枸杞子、菟丝子等,具有增强免疫力的效能;当归、黄芪还具有调节免疫力的效能。黄芪、人参、白术、山药、茯苓、车前子、牛膝等,又可直接作用于泌尿系统。据此推测,本病的产生可能系外伤卧床之后,全身免疫力下降。加之膀胱麻痹,尿液滞留,使之过度扩张,内壁上皮细

胞受损,粘膜屏障功能减退,免疫机能低下,因而遭致难以治愈的尿路感染。内服补益肺脾肾三脏的中药后,患者全身和膀胱局部的免疫力提高,功能状态改善,利于尿路感染的控制。

本文承蒙陈可冀研究员审阅指导,谨此致谢。

参 考 文 献

- (1) H·A 腊斯克著,陈过主译,康复医学,杭州:浙江科学技术出版社,第一版,1984:239.
- (2) 阎亚峰. 外伤性截瘫并发尿路感染的防治体会. 中国康复医学杂志 1986; 1(5):26.
- (3) 黄英华. 截瘫60例康复的临床观察. 中国康复医学杂志 1987; 2(3):108.

中医药治愈军团病一例报告

华北煤炭医学院中医科 刘艳芳 李重恩

病例介绍

某某,男,20岁,学生,住院号3743。患者于1987年12月18日无明显原因突发高热,持续1周。伴恶寒、头身痛,按上感口服板蓝根冲剂治疗无效,于12月24日收住本院。

患者高热大汗,面红目赤,咽痛烦渴,头痛如裂,胸闷咳嗽,小便黄赤,大便秘结,苔黄,脉洪数。体温39.6℃,脉搏120次/分,呼吸30次/分,血压110/70毫米汞柱,神清,急性病容,呼吸急促,咽部充血,左肺呼吸音低。血白细胞6500/毫米³,中性52%,淋巴48%,血沉37毫米/小时。X线示左下胸膜炎,少量胸腔积液。血清IFA>1:256,确诊为军团病。

此例证属热厥气分,充斥三焦,治宜清热解毒,通腑泄下,方以白虎汤合凉膈散加减:生石膏45克,大黄6克,枳实、芒硝、黄芩、知母、栀子、甘草各10克,板蓝根、白花蛇舌草各30克,连翘20克。水煎服,每日一剂。

12月28日:药后高热未减,夜间尤甚(39.5℃),躁扰不寐,汗出谵语,大便已通,小溲仍黄,唇舌红绛,苔薄黄而脉数。此邪热入营,内陷心包,治当清营开窍,泄热养阴,方以清营汤加减:生地、石膏、银花各30克,丹皮、黄连、知母、甘草各10克,赤芍12克,麦冬、紫草各15克,连翘20克,竹叶8克。水煎服,每日一剂。

1月12日:上方加减服药两周,高热已退,诸证

悉除,唯小便仍黄,舌红苔白,脉细数。复查体温36℃,双肺呼吸音清晰,X线示左下胸腔积液吸收,血沉15毫米/小时。此为温病后期,余热未尽,气阴已伤,拟益气养阴,轻清余热。处方:百合30克,沙参15克,生地、麦冬、党参、五味子、栀子、白芍各10克,甘草6克。

患者于1988年1月18日痊愈出院,随访半年未复发。

体会

该病为一种新发现的疾病,是由嗜肺性军团病杆菌引起的肺炎,1976年在美国首次发现,1978年正式命名,1981年6月在我国南京发现第一例患者,1987年6月在唐山市某大学暴发流行。据国外报道,西药治疗本病首选仅有红霉素一药,且有用药时间长、停药后易复发缺点。中药治疗本病在国内尚未见之报道。

此病临床突出表现为高热,因其起病急、病情重、变化快,并具有暴发性、流行性和传染性,故中医分析此病属于温病范畴,宜按卫气营血分阶段辨证施治。本例患者初起发热、微恶寒、头身痛,乃温邪客于肺卫,继之出现高热、大汗、烦渴、便秘、苔黄、脉洪数,此邪热入里,病在气分,宜用白虎汤合凉膈散加减,清热解毒,通腑泄下,以祛邪热而护津液。而后由于邪热深重,犯及营阴,内陷心包,致使营阴耗损,心神被扰,改方清营汤加减,清开凉营,养阴泄热,使其透营转气,终获卓效。随之病至后期,益气养阴,轻清余热,终收全功。