

高等中医自学考试及中医晋升考试辅导

四川省 1987 年下半年高等中医自学考试

《中 医 外 科 学》试 题

一、单一选择题(共 25 分, 每小题 1 分) 下列每小题各有四个备选答案, 其中只有一个正确答案, 请将正确答案号码填入该题后的括号内。

1. 瘰癧初期的内治宜: ()

① 清肝养血、健脾化痰, 方用柴胡清肝汤合二陈汤加減

② 疏肝养血、健脾化痰, 方用逍遥散合二陈汤加減

③ 清肝凉血、健脾化痰, 方用丹栀逍遥散合二陈汤加減

④ 清肝养血、软坚化痰, 方用柴胡清肝汤合消瘰丸加減

2. 乳癖好发于乳房之: ()

① 上内象限 ② 下内象限

③ 上外象限 ④ 下外象限

3. 红灵丹属于: ()

① 提脓去腐药 ② 腐蚀药与平胬药

③ 生肌收口药 ④ 消散药

4. 疥疮奇痒发作时间多在: ()

① 上午 ② 下午

③ 遇冷时 ④ 遇热及夜间

5. 热疔的治疗法则是: ()

① 清热解毒 ② 清暑解毒

③ 清热利湿 ④ 清暑化湿解毒

6. 结节性红斑, 发病季节多为: ()

① 春夏 ② 春秋 ③ 夏秋

④ 秋冬

7. 寻常疣好发部位是: ()

① 头面 ② 手指、手背

③ 足背 ④ 足掌

8. 蛇串疮当水疱未破时, 一般外敷药用:

① 青黛膏

② 玉露膏

③ 冲和膏

④ 回阳玉龙膏

9. 治疗脂瘤简便有效的外治法是: ()

① 外敷消肿、化痰、活血药

② 外掺腐蚀化管药

③ 外敷去腐药

④ 手术摘除

10. 皮肤病外用药物剂型, 选择的原则是:

① 根据皮损的大小

② 根据皮损的颜色

③ 根据皮损的表现

④ 根据皮损的轻重

11. 颈痈初起内治宜: ()

① 散风清热、解毒消肿

② 散风清热、化痰消肿

③ 清热解毒、和营消肿

④ 清热解毒、行气消肿

12. 清热收涩药适用于: ()

① 溃疡脓水将尽时

② 溃疡腐肉已脱时

③ 急性或亚急性皮炎渗液多时

④ 急性或亚急性皮炎渗液不多时

13. 混合痔的手术治疗, 一般采用: ()

① 注射法 ② 切除法

③ 结扎法 ④ 外痔剥离, 内痔结扎法

14. 轻度烧伤, 伤情判断是指: ()

① 总面积在 5% 以下

② 总面积在 10% 以下的 II 度烧伤

③ 总面积在 11~15% 之间

④ 总面积在 12% 以下的 I 度烧伤

15. 发于颈部结喉处附近的肿块, 首先应考虑的诊断是: ()

① 瘰癧 ② 瘰 ③ 失荣

④ 颈痈

16. 麻疹样或猩红热样药疹皮损特点是:

① 针尖至米粒大红色丘疹, 散在分布

- ② 针尖至米粒大红色丘疹,密集成片
 ③ 针尖至米粒大焮红灼热的丘疹或斑丘疹,散在分布或密集成片
 ④ 米粒大的焮红灼热的斑丘疹或丘疱疹,散在分布

17. 寻常型白疔发生于龟头上的皮损表现有:()

- ① 呈光滑干燥性红斑,有细薄白色鳞屑
 ② 呈湿润红斑,有少量渗液
 ③ 出现溃疡,有少量脓性分泌物
 ④ 高出表面的结节,有少许鳞屑

18. 一般说来,病情较严重的有头疽多发生在:

()

- ① 项后 ② 胸部 ③ 腹部
 ④ 四肢

19. 治疗失荣证,体现“扶正培本”治法的方剂是:

()

- ① 开郁散 ② 和营散坚丸
 ③ 香贝养营汤 ④ 十全大补丸 ()

20. 肠痈的辨证,下列哪项判断是错误的?

()

- ① 八纲辨证多属里实热证
 ② 脏腑辨证多涉及胃肠
 ③ 三焦辨证多属下焦
 ④ 病机辨证多由气滞、血瘀、毒蕴而成

21. 牛皮癣风湿热证,外治选用的药物为:

()

- ① 二号癣药水 ② 枫油膏
 ③ 三黄洗剂 ④ 青黛散油

22. 一病员48小时未排尿,膀胱极度膨胀,现决定常规导尿,第一次放尿正确的是:()

- ① 放完为止
 ② 需留少量尿液于膀胱
 ③ 一般可放出1000 ml
 ④ 一般可放出500 ml

23. 肛裂的主要症状是:()

- ① 便血、疼痛
 ② 便血、便秘,周期性疼痛
 ③ 疼痛、便秘
 ④ 便血、便秘,持续性疼痛

24. 清代创立以阴阳为主辨证论治的外科医家是:()

- ① 陈士铎 ② 祁广生
 ③ 吴师机 ④ 王洪绪

25. 下列外科辨脉纲要中,哪项是错误的?

- ① 肿疡见不足之脉,为毒气盛,正气虚
 ② 肿疡见有余之脉,为毒气盛,正不虚
 ③ 溃疡见不足之脉,为正气虚,毒亦去
 ④ 溃疡见有余之脉,为正未伤,邪气盛

二、多重选择题 (共25分,每小题1分) 下列每小题各有五个备选答案,其中符合题意的正确答案有二至五个,请将正确的答案号码全部填入该题后括号内,凡正确答案少选或多选均不得分。

1. 外治法中的“其他疗法”包括有:()

- ① 挂线法 ② 垫棉法
 ③ 烙法 ④ 药筒拔法
 ⑤ 熨法

2. 火陷证的临床表现有:()

- ① 根盘散漫 ② 疮色晦黯
 ③ 局部灼热剧痛 ④ 全身发热或恶寒
 ⑤ 神昏谵语

3. 流痰初期的症状有:()

- ① 局部不红不热 ② 局部肿胀
 ③ 患处刺痛 ④ 继则关节活动障碍
 ⑤ 动则刺痛加剧

4. 肠痈初期内治常用方剂有:()

- ① 大黄牡丹皮汤 ② 红藤煎
 ③ 藿香正气散 ④ 一贯煎
 ⑤ 银翘散

5. 毒蛇咬伤后的急救排毒法有:()

- ① 吮吸法 ② 利尿法
 ③ 攻下法 ④ 扩创法
 ⑤ 烧灼法

6. 脓疱疮湿热证皮损特点有:()

- ① 脓疱较密,色黄 ② 疱周围有红晕
 ③ 脓疱稀,色淡黄 ④ 破后糜烂面鲜红
 ⑤ 破后糜烂面淡红

7. 皮肤病血瘀证皮损表现有:()

- ① 色暗、紫红、青紫
 ② 瘀斑、瘀点
 ③ 肥厚
 ④ 结节、肿块
 ⑤ 舌质紫,有瘀点

8. 蛇串疮的病情轻重与部位有关,一般病情较重的部位有:()

- ① 胸部 ② 胁肋部 ③ 腰部
 ④ 颜面部 ⑤ 大腿内侧

9. 外科疾病总的发病机理有:()

- ① 气血凝滞 ② 营气不从
③ 脏腑功能失调 ④ 经络阻塞
⑤ 痰凝血阻
10. 下面属气瘰(单纯性甲状腺肿)的临床表现有: ()
- ① 颈部呈弥漫性肿大
② 按之皮宽而软
③ 消谷善饥
④ 剧烈活动时呼吸困难
⑤ 伴有眼突,手指震颤
11. 乳腺增生病的特点有: ()
- ① 肿痛在经前加重
② 肿痛在经前减轻
③ 肿痛在经后减轻
④ 好发于 20~30 岁的妇女
⑤ 好发于 30~40 岁的妇女
12. 流注发生在髂窝的症状有: ()
- ① 一侧髂窝部出现疼痛
② 患侧大腿突然拘挛不适
③ 步履出现跛行
④ 膝关节不能伸屈
⑤ 大腿向上收缩
13. 肛瘻挂线疗法的适应症,下列哪些是正确的? ()
- ① 有内、外口的低位肛瘻
② 瘻管仍有脓液现象者
③ 合并有严重肺结核者
④ 作为复杂性肛瘻切开疗法的辅助疗法
⑤ 肛周有皮肤病者
14. 系统性红斑性狼疮,肾脏损害严重者可出现: ()
- ① 水肿 ② 腹水
③ 肾病性高血压 ④ 尿毒症
⑤ 肾病综合征
15. 臀痈初起的局部症状有: ()
- ① 漫肿不痛 ② 皮色如常
③ 肿块有硬结 ④ 肿块逐渐扩大
⑤ 肿界清楚
16. 不属于颜面部疔疮独有的特征有: ()
- ① 疮形如粟
② 坚硬根深,如钉丁之状
③ 反应剧烈
④ 发病迅速
⑤ 容易引起“走黄”
17. 多形性红斑严重者,皮损有: ()
- ① 红斑 ② 丘疹 ③ 水疱
④ 大疱 ⑤ 紫癜
18. 下述外用中,有升丹配成的药有:
- ① 九黄丹 ② 九一丹
③ 黑虎丹 ④ 五五丹
⑤ 红灵丹
19. 辨外科病的顺证、逆证中,下列哪些表现属顺证的范畴? ()
- ① 初起:由小渐大,不痛不热
② 化脓:顶高根束,易脓易腐
③ 溃后:时流血水,肿痛不减
④ 收口:疮面新肉易生,知觉正常
⑤ 已成:疮顶软陷,肿痛不减
20. 急性湿疹有多形性损害特点,皮疹常有: ()
- ① 潮红、丘疹 ② 水疱
③ 脓疱 ④ 流滋
⑤ 结痂
21. 治疗疥疮主要用硫黄软膏外涂,其正确的涂药方法有: ()
- ① 涂药前先用药水或温水肥皂洗澡
② 涂药时先涂好发部位,再涂全身
③ 涂药时只涂发病部位
④ 每天早上涂一次,晚间洗澡换衣裤,连续三天
⑤ 每天早、晚各涂一次,连续三天不换衣被,第四天洗澡,换洗衣被
22. 瘾疹临床辨证时,一般分为: ()
- ① 风寒证 ② 风热证
③ 肠胃湿热证 ④ 气血两虚证
⑤ 冲任不调证
23. 属于有头疽的局部特点有: ()
- ① 初起即有粟粒样脓头
② 中期开始出现粟粒样脓头
③ 病变易向深部发展
④ 病变易向周围扩散
⑤ 初起肿胀疼痛、皮微红
24. 寒湿证脱疽的常用方剂宜选: ()
- ① 桂附八味丸加味 ② 十全大补丸加味
③ 独活寄生汤加味 ④ 阳和汤加味
⑤ 桂枝茯苓丸加味
25. 子痢属湿热下注所致者的症状有: ()
- ① 起病虽急,但无恶寒发热

- ② 一侧睾丸肿大疼痛
- ③ 有的子系亦肿胀疼痛
- ④ 有的阴囊亦红、肿
- ⑤ 化脓时皮肤光亮而软

三、判断分析题(共15分,每小题5分)先判断“正”或“误”,请将“正”或“误”填入该题后括号内,然后简述其正确或错误的理由。

1. 对药物性皮炎的处理原则,首先是积极控制病情,加强抗感染和支持疗法。()

2. 清养胃阴法,重点在于抓住以“胃纳不香”和“脉象细数”为主症。()

3. 脓是因热胜由血肉化生,如《内经》所说:“热胜则烂筋骨,筋骨烂则为脓”。()

四、简答题(共15分,每小题5分)

1. 何谓发?发的特点有哪些?

2. 毒蛇咬伤的辨证分为哪几种?内治法则如何?

3. 托补法的适应证有哪些?(不要求答温补托毒法的适应证)

五、论述题(共20分,每小题10分)

1. 试述走黄的原因及走黄的内治。(不要求答处方的药物组成,但要求答加减法)

2. 辨溃瘍的形色与疮瘍的预后有何关系?

针刺大横穴治疗癡症性晕厥及其他疾患的临床经验

河南省泌阳县医院 沈书宇

癡症性晕厥属于祖国医学的“脏躁”、“气厥”范畴。1979~1987年,笔者以大横穴作为主穴,经治癡症性晕厥,因高烧引起的痉挛和强直性痉挛共184例,仅兹临床疗效特报导如下:

一、临床资料:凡上所经治者,皆具有典型的临床症状。癡症性晕厥患者152例,其中147例在情感暴发时发生,约占96.7%,单独发生的5例,约占3.3%;男性患者22例,约占14.5%,女性患者130例,约占85.5%;年龄10~16岁7例,17~25岁36例,25~63岁109例;在152例病历中有135例以往有癡病史,约占89.5%。高热痉挛19例,其中男性患者12例,女性患者7例。强直性痉挛13例,其中男性患者5例,女性患者8例。

二、治疗方法:一般取仰卧位,松解腰带。常规皮肤消毒,用1寸5分毫针快速刺入大横穴,然后以小角度快速持续捻针。同时认真观察病人的表情变化,如出现呻吟、屏气消失、睁眼、肢体僵直解除,继而恢复常态,可出针结束治疗;如肢体仍僵直不解,不言不语,可配加刺中脘穴乃佳。

三、疗效观察:在184例患者中,单刺大横一穴,治愈181例,其中高热痉挛和强直性痉挛治愈率均为100%;而癡症性晕厥152例,治愈149例,约占98%;其余3例患者加刺中脘穴后治愈,约占2%。

四、典型病例:王××,女,42岁,某高中教师。患者于1982年4月13日在课堂讲课时,突然倒地屏气,言断语塞,双目紧闭,全身僵直,男女生十多名

急用简易担架床抬送我院急救。检查:血压130/70 mmHg,眼球活动良好,反射正常,病理反射未引出,两肺正常,心界不大,律整,无杂音。诊断:癡症性晕厥。治疗:当即针刺大横穴,做小角度持续捻针,约1分钟左右,病人即双目圆睁,随之言语复常,稍休息后即健步返校。

五、讨论:1. 本穴始载于《针灸甲乙经》,为足太阴、阴维之会。《针灸聚英》中的百证赋曾云:“反张悲哭,仗天冲大横须精。”笔者从而得以启迪。杨继洲亦曾谓:“主大风逆气,多寒善悲,四肢不可举动,多汗,洞洞。”近代郑魁山同志所著的《针灸集锦》中有所述及:“绕脐腹痛、泄泻、痢疾、便秘、脏躁症等。”然而查阅古今有关针灸论著,记载本穴治疗癡症者却为罕见。深究大横穴治疗癡症之原理,尚须对本病的病机加以认真研究。该病主要由于阴血亏耗,不能濡养五脏,五志之火内动所致。正如《女科要旨》所说:“脏属阴,阴虚而火乘之则为躁……五志生火,动必关心,阴脏既伤,穷必及肾。”也正因这种五志之火由血虚引动,并与肾阴不足有密切关系。

大横穴为足太阴阴维之会,阴维脉有维系诸阴而主一身之里的作用,所以本穴对阴虚阳无所附而致上扰神明的晕厥有着颇大的治疗意义。

2. 本穴治疗癡症性晕厥以疗效卓著而显示于临床,又用其穴治疗了高热痉挛和强直性痉挛,其临床效果尤佳。不过,终究经治的病例尚少,也许不足以有代表性,尚待作进一步的观察、探讨。