

用⁽⁴⁾。对 I 号方进行热板法及扭体法的镇痛实验表明,对小白鼠的外周和中枢都有一定镇痛作用。II 号方对小白鼠热板镇痛试验亦有明显的镇痛作用(尚未发表)。此外,从临床应用来看, I 号方有免疫抑制作用,特别对体液免疫,能使增高的 IgG、IgA、IgM 及 γ 球蛋白下降,使补体 C₃ 逐渐恢复正常。对 II 号方进行实验病理研究后,发现此药能使胸腺皮质细胞有丝核分裂增加,外周血中 T 淋巴细胞增多,故认为 II 号方有增强细胞免疫的功能。由此证明,复方雷公藤具有消炎、镇痛、免疫抑制及免疫调整作用。其副作用主要在胃肠

道, II 号方因偏于温补,故可出现口干、口苦及大便干结。I 号方早期可出现纳差、上腹不适,若出现腹痛、腹泻,可减量或停药。本方对心、肝、肾均无损害。

参 考 资 料

- (1) Katz WA. Rheumatic Diseases, 1 ed, Lippincott Philalphia. 1977; 420.
- (2) 严碧玉,等.雷公藤治疗类风湿性关节炎 165 例疗效分析.中西医结合杂志 1985; 5:280.
- (3) 严碧玉,等.类风湿性关节炎的研究 II.急性活动期与慢性稳定期的免疫状态及临床意义.第一军医大学学报 1983; 3:203.
- (4) 孟庆棣,等.关节灵对佐剂性关节炎的影响.第一军医大学学报 1985; 5:281.

阳和汤加减治疗卵巢囊肿 26 例

山东省临沂地区中医院妇产科 李学君 指导: 刘文奎

卵巢囊肿属祖国医学“症瘕”“积聚”范畴,目前多以手术治疗为主。据我们观察,囊肿漫肿不痛,或隐痛以夜间为重,多喜温喜按,口不渴、舌苔白,证同阴疽。笔者自 1982 年以来用阳和汤加减治疗本病 26 例,收到了较好的效果,现介绍如下:

一、临床资料

本组 26 例均经妇科检查和 B 超检查确诊,囊肿最大径在 10 cm 以内未扭转者为观察对象。26 例中年龄最小为 17 岁,最大 50 岁;已婚 23 例,未婚 3 例。囊肿均为单侧。

二、治疗方法

熟地 20 克,鹿胶 10 克(烊化),肉桂 6 克,麻黄 6 克,白芥子 12 克,桃仁 10 克,海藻 10 克,莪术 6 克。腹痛有下坠感者加党参 20 克,黄芪 15 克,升麻 6 克;面色萎黄加阿胶 10 克(烊化),当归 12 克,白芍 12 克;小腹胀痛加乌药 12 克或三棱 10 克,莪术 10 克;小腹刺痛加五灵脂或乳没各 10 克;腹寒痛加附子 10 克,艾叶 10 克;心烦、苔黄腻加夏枯草 12 克,苡仁 15 克,龙胆草 12 克;带下量多加昆布 15 克,生牡蛎 20 克;肾虚腰痛加川断 15 克,桑寄生 15 克;肾阳虚加附子 6 克,肉苁蓉 15 克;肾阴虚加女贞子 15 克,枸杞子 20 克。水煎服,一日一剂。

三、疗效观察

服药后囊肿及症状消失,并经 B 超检查证实评为

治愈 23 例,服药后囊肿缩小,症状好转或消失评为有效 2 例,其中一例经手术证明为畸胎瘤;服药 10 剂后,包块无缩小,未再继续服药,评为无效 1 例。治愈病例最少服药 5 剂,最多服药 36 剂。

四、典型病例

王××, 34 岁,工人,已婚,1985 年 11 月 10 日就诊。患者小腹下坠隐痛 2 年,偶有胀痛及刺痛,经前乳房胀痛,月经先后无定期,经期小腹冷痛,得温则舒,经色黑,有血块,平日带下量多、色白、质稠。既往身体健康,末次月经 1985 年 10 月 28 日,曾人工流产 3 次。末次流产在 5 年前,未采取节育措施,5 年来未再孕。查:形体较胖,舌质淡、苔白,脉沉迟。经妇科及 B 超检查诊断为右侧卵巢囊肿(8×7×6 cm)。处方:熟地 20 克,鹿胶 10 克(烊化),肉桂 6 克,当归 12 克,白芥子 12 克,麻黄 6 克,没药 10 克,莪术 10 克,桃仁 10 克,海藻 12 克。每日一剂,水煎服。

11 月 22 日二诊,服药后腹痛减轻,白带减少,经前乳房胀痛减轻,上方加牛膝 12 克。12 月 3 日三诊:囊肿明显减小,约呈 4×4×3 cm 大小,继用上方去麻黄加菟丝子 20 克,女贞子 20 克。12 月 10 日四诊:妇科检查双侧未触及包块,予逍遥丸、六味地黄丸调理善后。后于 1986 年 9 月 20 日在本科顺产一女婴,母婴身体健康,随访囊肿未复发。