

合生脉注射液的疗效可能与促进巨噬细胞吞噬功能,使活性凝血因子、纤维蛋白凝块、内毒素等及时被吞噬、灭活机理有关。内毒素清除实验结果表明:等量攻击内毒素2小时,犀角地黄合生脉注射液组小鼠血浆内毒素含量明显低于对照组,提示该药的疗效可能与降解内毒素或促进机体对内毒素清除、解毒机理有关。

五、结语

总之,热瘀气脱证的提出和建立,为临床应用凉血化瘀、益气固脱法治疗邪入血分严重出血提供了重要的理论依据。部分重症温病邪入血分病机由浅入深演变的三个层次的揭示,

为根据病机发展过程不同阶段的特征,建立具体的证候概念,提供了新的研究思路。同时,热瘀损络、气不摄血病机的阐明,也就相应地提出了必须重新讨论现行血分证概念等重大问题(现行血分证概念未能包括邪入血分具体证候的建立及气脱与热瘀的内在联系),这有待今后进一步研究。

参 考 文 献

- (1) 天津市第一中心医院,天津医药1977;(4):164.
- (2) 邓世发,辽宁中医杂志1982;(6):23.
- (3) 毕维德,等,中医杂志1982;(12):23.
- (4) 罗道,浙江中医杂志1982;(5):45.

三蛇汤治疗乳糜尿60例小结

江苏淮阴县乳糜尿专科医院 王兆凯 王兆军

笔者在长期从事辨证治疗乳糜尿工作中,也注意观察单味药和小方剂对乳糜尿的临床疗效。兹介绍自拟方“三蛇汤”治疗乳糜尿60例与萆薢分清饮的对照观察如下,供参考。

一、一般资料

本治疗将60例患者分为一蛇汤组、二蛇汤组、三蛇汤组,每组各为20例。另设萆薢分清饮对照组20例。每组选择男女各10例;年龄均在30~60岁之间;均为1985年6、7月份首次发病患者。尿检乳糜试验均为阳性。

二、治疗方法

1. 一蛇汤:主治乳糜尿(白浊),药用蛇床子60克,六月雪30克,冬葵子15克,刘寄奴15克。加水500毫升,煎取300毫升,日服3次。

2. 二蛇汤:主治乳糜血尿(赤浊),药用蛇床子60克,蛇葡萄50克,六月雪30克,冬葵子15克,刘寄奴15克。加水500毫升,煎取300毫升,日服3次。

3. 三蛇汤:主治乳糜血尿(赤白浊),药用蛇床子60克,蛇舌草20克,蛇葡萄50克,六月雪30克,冬葵子15克,刘寄奴15克。加水600毫升,煎取400毫升,日服3次。

4. 萆薢分清饮,按常规用量,煎水日服2次。

每组均以连服7天为一疗程,一般不超过3个疗程。

三、治疗结果

1. 治疗标准:痊愈:肉眼观察尿清,并经尿检乳糜试验阴性,尿常规正常者无不适感为临床痊愈。好转:肉眼观察尿清,但尿检乳糜试验阳性,或乳糜试验阴性,尿常规不正常仍有少量血细胞、尿蛋白为好转。无效:接受治疗三疗程无改变者为无效。

2. 疗效统计:一蛇汤组痊愈11例,好转7例,无效2例;二蛇汤组分别为12例,5例,3例;三蛇汤组分别为13例,6例,1例;合计治愈36例,好转18例,无效6例。对照组痊愈3例,好转7例,无效10例。经统计学处理, $P<0.01(X^2=23.90)$,有显著性差异。

四、体会

乳糜尿的发病是丝虫寄生淋巴结造成淋巴管或淋巴管增生的结果。丝虫长期寄生在淋巴组织必然造成其代谢产物的大量积蓄,淋巴组织产生炎性病变,以蛇床子的杀虫,蛇葡萄、蛇舌草的清热解毒利尿,三药的相互配合加六月雪清热治浊,冬葵子利二便、治五淋,刘寄奴和血通络、改善淋巴管的阻塞并促进建立侧枝循环达到治疗目的,故取得良好的治疗效果。对照组所用的萆薢分清饮,对乳糜尿虽有效,但并非理想方剂,萆薢分清饮所治的尿浊,包括现代的磷酸盐尿等。笔者认为三蛇汤治疗乳糜尿的三种不同病型均是有效的,可以临床试用。单味药到小方剂运用治疗乳糜尿是可取的。