

高等中医自学考试及中医晋升考试辅导

北京市 1988 年下半年高等中医自学考试

《中医外科学》试题

一、多选题(A、B、C型题要求回答其中一最佳选择。K型题回答方法是:如①、②、③正确,用A表示;①、③正确,用B表示;②、①正确,用C表示;④正确,用D表示;①、②、③、④都正确,用E表示。请把正确答案的标号填写在括号内。每小题1分,共40分)

A型题:

1. 西汉前后的____是我国第一部外科专著,可惜没有保存下来。()

- A、《刘涓子鬼遗方》 B、《五十二病方》
C、《金疮痍瘕方》 D、《理渝衍文》
E、《外科精义》

2. 气痛的特点是什么?()

- A、阵发性攻痛无常 B、木痛,垂胀感
C、游走性痛,无定处 D、随情绪波动而时作痛

作痛

E、持续性固定性胀痛

3. 在中医学史上出现疡医在什么朝代?()

- A、春秋 B、战国 C、周代
D、东汉 E、西汉

4. 疮疡证见疮肿由小渐大,疮顶高突,掀红疼痛,根脚不散,这说明:()

- A、气血壮盛 B、疮已化脓
C、邪毒深沉 D、病情重笃
E、将愈之象

5. 透脓散的药物组成是:()

- A、黄芪、银花、当归、角刺、川芎
B、黄芪、当归、川芎、角刺、山甲
C、黄芪、当归、桔梗、角刺、山甲
D、黄芪、银花、白芷、角刺、川芎
E、黄芪、当归、银花、桔梗、角刺

6. 疔疮走黄的治疗原则是:()

- A、疏风清热解毒 B、清气凉营解毒
C、凉血清热解毒 D、滋阴清热解毒
E、益气清热解毒

7. 疖、疔、发是以什么命名的:()

- A、疾病特性 B、病情
C、病因 D、颜色 E、范围大小

8. 疏风清热法不适于:()

- A、药疹 B、接触性皮炎
C、脓疱疮 D、荨麻疹(瘾疹)
E、玫瑰糠疹(风热疹)

9. 硬化注射法主要作用机理是:()

- A、畅通痔血流 B、阻断痔血供
C、痔坏死脱落 D、痔硬化萎缩
E、痔核湿性坏死

10. 舌菌病名首见于:()

- A、《外科真论》 B、《沈氏尊生》
C、《疡科心得集》 D、《刘涓子鬼遗方》
E、《外科精义》

11. 流注的含义是指:()

- A、发无定处,此起彼伏
B、发于肌肉深部的多发性脓肿
C、发于全身各处的脓肿
D、发于骨关节的脓肿
E、一切深部脓肿

12. 痈成脓时的临床表现下列哪项最有意义:()

- A、肿势高突 B、疼痛剧烈
C、按之中软应指 D、发热持续不退
E、苔黄腻或脉数

13. 丹毒皮损特点是:()

A、鲜红成片,稍高出皮面,边界清楚,中间深四周浅。

B、鲜红成片,稍高出皮面,边界清楚,中间浅四周深。

C、鲜红成片,高出皮面,边界不清,中间深四周浅。

D、鲜红成片,高出皮面,边界不清,中间浅四周深。

E、鲜红成片，平塌漫肿，边界清楚，中间深四周浅。

14. 肛裂的主要症状是：()

A、便血疼痛

B、便血周期性疼痛，脱垂

C、便血周期性疼痛，便秘

D、便后肛门疼痛，便血，分泌物

E、疼痛，脓液稠厚，便秘

15 痔疮经久不愈，易于复发的主要原因是：()

A、湿热下注 B、气虚下陷

C、并发患肢湿疹 D、继发感染

E、患处气血运行不畅

16. 外科疾病内治总则三大法为：()

A、温、通、下 B、清、消、通

C、消、托、补 D、消、通、补

E、宣、清、温

17. 外科疾病的分类最早在《内经》中概括为：()

A、疮疡 B、痈疽 C、阴阳

D、虚实 E、寒热

18. 不能归于五脏的肿瘤有：()

A、气瘤 B、血瘤 C、肉瘤

D、脂瘤 E、骨瘤

19. 下列各项中除……之外，为肛门直肠疾病的好发部位：()

A、截石位：内痔 3、7、11 点处

B、截石位：赘皮外痔 6、12 点处

C、截石位：血栓外痔 6、12 点处

D、截石位：肛裂 6、12 点处

E、截石位：混合痔 3、7、11 点处

B 型题：

A、提脓祛腐 B、消肿散毒

C、腐蚀平胬 D、生肌收口

E、定痛止血

20. 如意金黄散的效用是：()

21. 白降丹的效用是：()

22. 九一丹的效用是：()

23. 五五丹的效用是：()

A、皮损边缘由小红丘疹或有小水疱排列呈环状，明显瘙痒，多为单侧分布。

B、皮损为圆形或椭圆形的红斑，边缘淡红，中央暗红，有时中央出现水疱。

C、皮损为红斑、丘疹、水疱、糜烂、渗液、融

合成小片、明显瘙痒。

D、皮损为水疱或大疱，周围绕以红晕，有痒感，抓破后渗出大量黄色液体发于暴露部位。

E、皮损为炎性小丘疹或丘疱疹，对称分布于指缝、前臂屈侧、腰、外阴等处，明显瘙痒。

24. 圆癣的临床表现：()

25. 脓疱疮的临床表现：()

26. 固定药疹的临床表现：()

27. 疥疮的临床表现：()

A、气血充足 B、气火有余

C、气血虚 D、血络受伤

E、余毒日久，损伤筋骨

28. 脓液黄白稠厚者为：()

29. 脓液黄浊臭秽者为：()

30. 脓液绿黑稀薄者为：()

C 型题：

A、肿痛 B、便血

C、两者均有 D、两者均无

31. 锁肛痔与息肉痔的共有症状：()

32. 内痔嵌顿与炎性外痔的共有症状：()

A、好发于面部 B、好发于躯干

C、二者均有 D、二者均无

33. 扁平疣好发部位：()

34. 传染性软疣好发部位：()

A、癌 B、蛇头疔

C、两者均是 D、两者均不是

35. 以症状命名的外科疾病：()

36. 以形态命名的外科疾病：()

K 型题：

37. 疮疡初期证属半阴半阳证，治疗宜选用何方：()

① 金黄散 ② 回阳玉龙散

③ 玉露散 ④ 冲和散

38. 前列腺增生症的临床表现可有：()

① 尿频、排尿困难 ② 尿潴留

③ 假性尿失禁 ④ 泌尿系感染

39. 皮肤病的自觉症状有：()

① 麻木 ② 疼痛

③ 瘙痒 ④ 抓痕

40. 下列哪些现象符合阴证特点。()

① 肿热局限，根脚收束

② 脓水稀薄

③ 软硬适度，溃后渐消

④ 皮色紫暗或皮色不变

二、名词解释题(每小题2分,共10分)

- 1、脊核
- 2、失荣
- 3、瘰癧
- 4、内陷
- 5、脓疮

三、问答题(共30分)

1、哪些是皮肤病的他觉症状?(5分)

2、内痔分几期?分期的主要依据是什么?(5分)

3、烧伤面积中国九分法如何计算?(5分)

4、如何鉴别乳癌与乳癖?(15分)

四、论述题(20分)

试述脱疽诊断要点。临床分几型?各型内治代表方剂。

中医药治愈血管炎肾病综合征一例

北京中医学院第一附属医院 江杨清 张 军* 方承康*

患者赵××,男,49岁,干部。住院号49338,1988年8月12日入院。患者以舌面口腔溃疡、全身大量出血点伴四肢浮肿2年就诊。曾经西医医院诊治。肾活检病理报告为:“IgG、IgA、IgM在基底膜颗粒状沉积,病变符合系膜增殖性肾炎伴部分灶性硬化。”两次血管造影均提示:“左侧桡动脉不显影,右侧桡动脉显影延迟。”结合其他检查诊断为:1.紫癜性肾炎、肾病综合征;2.血管炎。强的松曾用至每日60mg,尿蛋白及浮肿未见好转,于是加用环磷酰胺,总量用至3600mg,并用雷公藤、潘生丁等治疗,前后半年,因疗效不显而出院。

刻诊,患者精神萎靡,全身倦怠,柯兴氏貌明显,颜面虚浮皓白,口唇青紫明显,全身可见多处大片状紫暗色出血斑点,大小不等,轻度瘙痒,口腔粘膜和舌面有数个血泡和溃疡,颊唇粘膜紫暗肿胀,四肢浮肿,按之凹陷如泥,尿少而黄有泡沫,24小时800~900ml,便溏日2次,便意频有坠感,舌质红绛,苔黄腻,脉按之着骨始得,小弱不清。实验室检查:血小板 $13.5 \times 10^9/\text{mm}^3$,尿蛋白(++++) ,24小时尿蛋白5.4克,胆固醇294mg%,甘油三酯201mg, β -脂蛋白751mg%,血浆总蛋白4.2克%,白蛋白2.7克%,球蛋白1.5克%,肝肾功能未见异常。辨证为久病肝肾阴分已亏,营热迫血妄行,瘀血阻络,气分湿热内蕴。拟当滋补肝肾,凉血散瘀、活血止血、清热利湿。方用:生熟地各30克,山萸肉10克,山药、茯苓、丹皮、泽泻、车前草、枸杞子、旱莲草、牛膝炭各15克,大小蓟各10克,仙鹤草、白茅根各30克,黑豆12克。为了防止激素骤停导致的反应,暂沿用强的松40mg/日(系出院时口服量)。服上方两周后患者四肢浮肿基本消失,紫癜明显减少,皮疹红肿瘙痒已去,日尿量1500ml左右,大便稀溏,日行四次,舌质暗红,苔薄白腻,脉沉细无力。复查尿蛋白(-),24

小时尿蛋白总量3克。每日加服一剂健脾益气剂:黄芪、炒薏仁各30克,红枣5枚,菟丝子12克,党参15克,炮姜炭5克。一月后全身紫癜、口腔溃疡、溃疡及四肢浮肿基本消退,但紫癜仍偶有反复,口唇青紫基本消除,大便成形1~2次/日,尿量为1200~1500ml/日,精神、体力等明显改善。复查尿蛋白多次为(++),24小时尿蛋白总量为2.55克。强的松减至15mg/日,舌质淡暗,苔薄白,脉沉细。转用益肾填精、健脾益气、凉血止血法:生熟地各30克,山药15克,山萸肉、茯苓、丹皮、白莲须、益智仁、菟丝子、白术各10克,生黄芪、白茅根各30克,紫珠草、益母草各15克,炒薏仁20克。并用四妙勇安汤意:生黄芪30克,银花炭、玄参各15克,当归10克,上二方日各一剂,并经递减而完全撤除了强的松。药后皮疹未再反复,陈旧性出血斑片逐渐隐退,尿蛋白(++),24小时尿蛋白1.75克,血浆总蛋白升至6.0克%,血清胆固醇368mg%,甘油三酯115mg%, β -脂蛋白707mg%。

整个疗程中加服人参粉3克,日2次;云南白药2粒,日三次。

体会:免疫复合物对血管壁的伤害,加之动脉炎症导致的皮损和无脉症,西医颇感棘手。本例入院初期,用大剂凉营散瘀、清化湿热、养阴扶正之品,以纠正激素造成的阴阳失调。由于长期使用激素加之久病,脾胃已虚,故参入甘平、甘温健脾之品,如用人参粉益气扶脾,以防脾胃一败,药石难施。结果,脾虚得复,大便成形,浮肿、蛋白尿逐渐改善。在皮疹逐渐好转,仅紫癜偶有反复的情况下,反而加用四妙勇安汤旨在凉血散瘀、益气和络,使皮疹得以彻底控制,不致死灰复燃。