

血瘀证治验四例

湖北省宜昌地区卫生学校 孙会文

一、血府逐瘀汤治疗体感异常

陈某,女,52岁。患者自觉胸腔内有蠕虫爬行,部位不固定,时时以手指按压胸壁,整日怵惕恐惧,病逾十天。曾作多项检查,未见器质性病变。神经、精神科诊断为体感异常,服用西药罔效。1987年5月13日转中医治疗,脉象弦实,舌见瘀点。体感异常,中医书籍类似症情的描述颇多。在《医林改错》中,王清任列举的食自胸后下、灯笼病、夜间体内发热等医案均属体感异常。王氏认为系瘀血为害,施予血府逐瘀汤获验。本案有血瘀凭据,故投血府逐瘀汤。处方:桃仁、红花、当归、赤芍、川芎、生地、柴胡、枳壳、桔梗、牛膝各6克,甘草3克。水煎,日服1剂,分3次服。守方10剂,患者异感症消失,胸部舒适。

二、通窍活血汤治疗舌尖麻木

汤某,女,63岁。9个月前,患者用煤炉烤火,遂致重度一氧化碳中毒,救治21天康复。近一月来,患者舌尖麻木,每以牙咬或针刺,待局部疼痛则麻木始减。西医诊断为一氧化碳中毒后遗症,治后未效。1984年10月5日邀余诊治,脉涩,舌有瘀点。此案舌尖麻木系血瘀引起,正如《证治汇补》所说:“麻木,因营卫行涩、经络凝滞所致。”方用通窍活血汤。处方:桃仁、红花、川芎、赤芍各10克,生姜3片,葱白3根,大枣6枚。水煎,日服1剂,分3次温服。每次服药时,先服麝香0.1克。迭进10剂,瘀血得去,舌麻随之告愈。

三、膈下逐瘀汤治疗胃脘灼热

贾某,男,58岁。病程一月。患者胃脘有烧灼感,烦躁,口渴而喜温饮,每日进水量至少10磅。前医见热治热,投白虎汤12剂无效

(生石膏每剂30~60克)。1986年11月3日患者转诊于我处。查其体温正常,胃脘区域并不作热,脉弦涩,舌质淡红、有瘀点、苔薄白。患者胃脘发热、烦躁及口渴,似有热象,但体温不高、脉不洪数、苔不黄燥、不喜冷饮。由此可知,患者不是阳明经证,白虎汤焉能奏效。参照脉舌,审其病变为瘀血作祟,恰合《金匱要略》所言:“病者如热状,烦满,口干燥而渴,其脉反无热,此为阴伏,是瘀血也。”治当逐瘀,因胃脘位居膈下,故取膈下逐瘀汤。处方:桃仁、红花、当归、赤芍、丹皮、元胡、五灵脂、川芎、香附、枳壳、乌药各6克,甘草3克。水煎,日服1剂,分3次服。患者服药6剂,症状减轻。继服3剂,诸恙悉除。

四、会厌逐瘀汤治疗声带小结

李某,女,33岁。患者曾多次罹患咽喉炎,近四个月来,喉部有胀痛、灼热感,声音嘶哑。喉科检查,声带呈暗红色充血,边缘增厚,闭合不全,前三分之二的中点有绿豆大的结节。诊断慢性喉炎(声带小结形成),拟行手术。患者畏惧,于1987年5月6日要求中药治疗。查患者体格壮实,脉弦,舌腹静脉如曲团状、色紫晦。根据患者脉舌象及间接喉镜所见,血瘀是声带小结形成的病理基础。方用会厌逐瘀汤,配伍软坚消结之品。处方:桃仁、红花、赤芍、生地、玄参、柴胡、枳壳、桔梗各6克,僵蚕、海浮石、土贝母各15克,甘草3克。水煎,日服1剂,分4次服。并嘱患者避免高声言语,月经期间停用中药。历3个月治疗,累计进药45剂,患者喉部已无不适,音响恢复正常。同年8月7日喉科复查,声带游离缘稍增厚,结节消失。