

高等中医自学考试及中医晋升考试辅导

辽宁省1988年上半年高等中医自学考试

《中医外科学》试题

一、多选题：(50分)

A型题：(将正确答案写在题干后的括号内，每题1分)

- 我国现存最早的外科专著是()
A.《五十二病方》 B.《外科精义》 C.《刘涓子鬼遗方》 D.《外科宝鉴》 E.《疮疡经验全书》
- 最早对麻醉药的组成、适应证、剂量进行具体说明的著作是()
A.陈自明的《外科精要》 B.危亦林的《世医得效方》 C.窦汉卿的《疮疡经验全书》 D.薛己的《外科发挥》 E.陈实功的《外科正宗》
- 外科疾病的分类，早在内经中概括为()
A.疮疡 B.阴阳 C.虚实 D.寒热 E.痈疽
- 在外科疮疡中，最常见的发病原因是()
A.风温、风热 B.火毒、热毒 C.气郁、火郁 D.外感毒邪 E.湿热之邪
- 下列除……之外，均为外科疾病的致病因素()
A.外感六淫邪毒 B.感受特殊之毒 C.气血瘀滞、经络阻塞 D.饮食不节、情志内伤 E.房室损伤、外来伤害
- 热胜作痒的主要症状是()
A.浸润四窜、黄水淋漓 B.走窜四注、遍体作痒 C.皮肤瘾疹、掀红作痒、常不传染 D.搔痒剧烈、最易传染 E.脱屑作痒、皮肤干燥
- 下列除……之外，均为辨别阴症、阳症的要害点()
A.患部皮肤的颜色红活与否 B.肿胀的形势高起还是下陷 C.局部温度的灼热与否 D.发病于皮肉还是筋骨 E.脓液的有无
- 外科内治三大法则是()
A.温、通、下 B.清、消、通 C.消、托、补 D.消、通、补 E.宣、清、温
- 外科内治法的具体治法哪项不正确()

- 解表、清热、通里 B.温通、祛痰、理湿 C.行气、和营、内托 D.消肿、提脓、生肌 E.补益、养胃
- 适用于疮疡半阴半阳症的外用药是()
A.金黄散 B.玉露散 C.太乙膏 D.冲和膏 E.回阳玉龙膏
- 三陷症是指()
A.内陷、火陷、虚陷 B.火陷、干陷、虚陷 C.内陷、火陷、干陷 D.内陷、干陷、虚陷 E.以上都不对
- 痈的含义是()
A.发生在颈部两侧的急性化脓性疾病 B.发生在颜面部的急性化脓性疾病 C.气血为毒邪壅塞而不通的意思 D.局部红肿热痛，易向深部及周围扩散 E.气血为毒邪阻滞而不通的意思
- 有头疽最典型的症状特征是()
A.发病急，多见于有消渴病的患者 B.范围超过3~4寸，甚至大逾盈尺 C.易致内陷变证 D.初起即有粟粒样脓头，溃后状如蜂窝 E.难于愈合
- 蛇头疔发生损骨时，其症状特征是()
A.肿势不消，指甲变黑 B.疼痛剧烈，彻夜不眠 C.肿势连指，甲下积脓 D.溃烂肿胀，久不收口 E.红线走窜，壮热烦躁
- 发生“走黄”的原因是()
A.正虚 B.邪盛 C.伤津 D.腑实 E.表虚
- 内治疔疮走黄的原则是()
A.凉血清热解毒 B.宣肺泄热解毒 C.两清气营解毒 D.滋阴、清热解毒 E.疏风清热解毒
- 附骨疽的发病部位多见于()
A.四肢长骨 B.小关节处 C.肌肉深处 D.骨与关节处 E.脊柱
- 流痰除由风寒痰浊凝聚而成外，还与哪脏亏损有关()
A.心 B.肝 C.脾 D.肺 E.肾

19. 检查乳房部的方法, 哪一项不正确()
 A. 端坐, 暴露乳房, 观察其形态 B. 四指平按, 轻柔触摸有否肿块 C. 捏住乳房肿块, 定其性质大小 D. 按摩乳晕, 观察有无乳头溢液 E. 按摩腋窝, 锁骨上下窝有无肿块
20. 乳痛的发病原因, 哪一项是错误的()
 A. 产后冲任失调 B. 产后饮食不节, 胃中积热 C. 产后乳头破碎 D. 情志内伤, 肝气郁结 E. 乳汁瘀滞
21. 乳癖多发于()
 A. 少女 B. 青年妇女 C. 未育妇女 D. 老年妇女 E. 青壮年男性
22. “乳房结核, 初如梅子, 数月不疗, 渐大如鸡子, 串延胸胁, 破流稀脓白汁……”。这段经文指的是()
 A. 乳癖 B. 慢性乳痛 C. 乳疔 D. 乳疽 E. 乳痈
23. 五指并拢时手掌的面积占全身体表面积的()
 A. 1% B. 5% C. 9% D. 0.5% E. 0.1%
24. 浅 II 度烧伤的症状表现是()
 A. 红肿热痛、干燥 B. 剧痛、肿、水疱、红、潮湿 C. 痛轻、水疱、出血点 D. 无痛、蜡白、焦黄、干燥 E. 红肿、糜烂、流脓
25. 破伤风最先出现的症状是()
 A. 苦笑面容 B. 颈项强直 C. 张口困难 D. 手足抽搐 E. 角弓反张
26. 某患者, 会阴、小腹、睾丸坠胀隐痛不适, 伴有腰痠乏力, 血精, 舌质正常, 苔薄白, 脉沉涩。本证为前列腺炎的()
 A. 气血瘀滞证 B. 湿热壅阻证 C. 肾阳不足证 D. 阴虚火动证 E. 以上都不是
27. 内痔的主要症状是()
 A. 便血、脱出、周期性疼痛 B. 便血、脱出 C. 便后肛门疼痛、脱垂、血栓形成 D. 肛门肿胀、疼痛、流脓 E. 便血、便秘
28. 内痔主要根据什么进行分期()
 A. 便血 B. 疼痛 C. 脱出 D. 患病时间 E. 出血的颜色
29. 一患者男性, 诉肛门剧痛, 肛门可触及一肿物, 表面色紫, 触痛明显, 走路、排便时尤甚。应初步诊断为()
 A. 肛裂 B. 肛旁皮下脓肿 C. 血栓性外痔

- D. 肛管癌 E. 内痔嵌顿
30. 荨麻疹的皮疹形态特征主要是()
 A. 斑疹、丘疹 B. 水疱 C. 脓疱 D. 风团 E. 结节
31. 湿疹有以下除……之外的主要特点()
 A. 自觉瘙痒 B. 多形性损害 C. 不对称发生 D. 反复发作 E. 易演变成慢性
32. 皮疹糜烂, 渗液较多的宜选用()
 A. 洗剂 B. 粉剂 C. 软膏 D. 溶液 E. 油剂
- B 型题:** (将正确答案写在题干后的括号内, 每题 1 分)
- A. 风温、风热 B. 风寒、风湿 C. 湿热、寒湿 D. 气滞、血瘀 E. 气郁、火郁
33. 发于人体上部的疮疡, 其病因多为()
 34. 发于人体中部的疮疡, 其病因多为()
 35. 发于人体下部的疮疡, 其病因多为()
- A. 肿势平坦、根盘散漫
 B. 肿势高突、根盘收束
 C. 肿而木硬、皮色不泽、不红不热
 D. 肿而色红、皮薄光亮、焮热疼痛
 E. 肿势宣浮、不红微热、轻微疼痛
36. 火肿的特点是()
 37. 寒肿的特点是()
 38. 风肿的特点是()
- A. 气血充足 B. 气火有余 C. 气血虚 D. 血络受伤 E. 余毒日久损伤筋骨
39. 脓液黄白质稀, 色泽洁净者为()
 40. 脓液黄白质稠, 色泽鲜明者为()
 41. 脓色绿黑稀薄者为()
- A. 热疮 B. 脓疱疮 C. 蛇串疮 D. 疥疮 E. 湿疮
42. 唇缘部有绿豆大小水疱, 成簇簇状, 有瘙痒及灼热感, 此为()
 43. 下肢皮肤散在性水疱, 其边缘有轻度红晕, 疱内为黄水, 此为()
 44. 腰部出现成簇水疱, 呈带状排列, 痛如火燎, 此为()
- C 型题:** (将正确答案写在题干后面的括号内, 每题 1 分)
- A. 非哺乳期妇女 B. 哺乳期妇女
 C. 两者均有 D. 两者均无
45. 乳晕部乳漏多发生于()
 46. 乳房部乳漏多发生于()

(下转第32页)

见, 中药对早期性早熟患儿的疗效较好。12例停用中药汤剂后平均随访6个月, 仅1例复发, 疗效较巩固。身高随访, 其年平均增长速度略高于正常儿平均增长值。对中药是否能阻止骨骼迅速生长尚需进一步观察。

二、女童性早熟病儿多有怕热、面部升火、急躁易怒、五心烦热、口渴、舌质红、脉弦等肝肾阴虚，相火偏旺的症状。因此应用滋阴泻火中药最为适合。方中生地、炙龟板能滋阴益肾；知母、元参、黄柏滋阴泻火；龙胆草泻肝降火，清热利湿；夏枯草清肝散结；赤芍、三棱活血软坚；生麦芽有舒肝回乳作用。方中的龙胆草应从小剂量开始，逐渐加量，因人而异，以免引起克伐胃气之弊。本文有 2 例应用龙胆草 3~4.5 克，疗效不显，后在其他药物不变的基础上逐渐将龙胆草加至 12 克，乳房迅速缩小。另 1 例龙胆草仅用 3 克，因纳呆未予加量，性早熟症候仅获好转，可见龙胆草可能是治疗性早熟的主要药物之一。

特发性性早熟的发病机理尚不完全清楚,可能为下丘脑—垂体—性腺轴的提前活动。国内有实验证实生地、知母等滋阴泻火中药是通过调节下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴的作用而起到治疗效果的⁽⁶⁾,本文病例治疗后血FSH有明显下降,故推测滋阴泻火中药的作用点可能在下丘脑—垂体部位,该药通过调节下丘脑—垂体—性腺轴的不平衡状态而达到治疗目的。以上作用机理尚需今后继续深入研究。

参考文献

- (1) 时毓民, 等. 滋阴泻火法治疗女童性早熟症. 辽宁中医杂志 1981; (1):31.
- (2) Brook C.G. Clinical Paediatrics endocrinology, 1ed. London, Blackwell scientific publication 1981:193.
- (3) Richaman RA, et al. Adverse effects of large doses of medroxyprogesterone (MPA) in idiopathic isosexual precocity. J Pediatrics 1971; 79(6):963.
- (4) 钱大龙, 等. LHRH-A 与真性性早熟的治疗. 国外医学儿科学分册 1986; (4):176.
- (5) 姜春华, 等. 肾的研究. 第 2 版. 上海:上海科学技术出版社, 1981:268.

(上接第64页)

A. 肝 B. 胃 C. 两者均有

D. 两者均不是

47. 男子乳房属()

48. 女子乳房属()

A·多见于儿童，在颈部两侧，初起时局部白肿、热痛、肿块边界清楚，具有明显风温外感症状

B. 在颈部起较小的结核，推之活动，很少化脓

C. 两者均是 D. 两者均不是

49. 暑核症狀是()

50. 颈痛症状是()

二、填空 (每空 0.5 分, 共 16 分)

1. “营气不从_____乃生痈肿”。

2. 发颐，一名_____；疫疔，古称_____疔。

3. 薛立斋云“筋骨呈露曰筋瘰，_____曰血瘰，_____曰肉瘰，_____曰气瘰，_____曰石瘰，此瘰之五名也。”

4. 皮肤病的自觉症状主要是_____、
_____, _____, _____、
_____等感觉。

5. 皮肤科的外用软膏具有

去痂的作用。适用于一切_____皮肤痂具
有结痂、_____、_____等皮
损。

6. 肛门括约肌分为_____和_____。
外括约肌分为_____, _____、
_____三部分。

7. 以截石位表示, 内痔好发于肛门齿线以上_____点处; 赘皮性外痔多发于_____点处; 血栓痔好发于肛缘_____点处; 肛裂好发于_____点处。

8. 仙方活命饮(《医宗金鉴》)的药物组成是:穿山甲、当归尾、甘草、____、____、____、____、____、乳香、没药、陈皮、天花粉、防风、白芷。

三、问答题(第 1、2 小题各 7 分,第 3、4 小题各 10 分,共 34 分)

1. 什么是外科疾病总的发病机理？为什么？

2. 试以图表形式列出疮疡发病后的转化过程。

3. 何谓走黄与内陷？二者有何异同？

4. 试述脱疽寒湿型的辨证、内治原则及代表方。