

- 31 陆仁康. 中药大黄所致过敏 1 例报告. 新医学杂志, 1975, (2): 39.
- 32 曾永红. 中药冰片所致过敏 1 例报告. 新医学杂志, 1975, (11): 18.
- 33 周超凡, 吴炳银. 中药乳香、没药过敏 1 例报告. 中医杂志, 1979, (1): 48.
- 34 张有义. 没药炮制不过性引起呕吐反应. 新医学杂志, 1976, (4): 33.
- 35 刘庆才. 中药红花过敏 1 例报告. 中医杂志, 1980, 21(6): 27.
- 36 李锦祥. 柴胡注射液引起过敏反应 3 例报告. 中医杂志, 1980, 21(6): 31.
- 37 吴树忠. 中药马勃过敏反应 1 例报告. 中医杂志, 1980, 21(8): 39.
- 38 张志英. “六应丸”引起过敏性皮炎 1 例报道. 中医杂志, 1982, 23(12): 7.
- 39 杜生敏. 葶苈子致过敏性休克 1 例报道. 中医杂志, 1983, 24(12): 12.
- 40 张会川. 土鳖虫煎剂引起过敏反应 1 例报告. 中医杂志, 1987, 28(10): 40.
- 41 邵维增, 刘表球. 天南星中毒引致神经智力发育障碍 1 例. 新医学杂志, 1973, (9): 9.
- 42 孙溪宾, 陈明. 姜汁治愈南星中毒 4 例报告. 中医杂志, 1962, (11): 38.
- 43 何大延. 草药雪上一枝蒿中毒致严重心律失常 1 例报告. 新医学杂志, 1977, (11): 15.
- 44 罗亮丞. 雪上一枝蒿对心脏毒性的临床探讨. 中医杂志, 1980, 21(9): 37.
- 45 刘天梯. 黄药子中毒引起肝损害 1 例报告. 中医杂志, 1982, 23(4): 32.
- 46 史庆敦. 从吞服大量肉桂发生毒性反应来看肉桂的药性. 中医杂志, 1962, (2): 32.
- 47 李青. 木通中毒 1 例报告. 中医杂志, 1997, 38(7): 421.
- 48 孙佛全, 张树一. 白花丹引产导致严重反应报道. 中医杂志, 1981, 22(6): 66.
- 49 杨越川. 山豆根易致呕吐. 中医杂志, 1983, 24(9): 79.
- 50 江一平, 王天如. 服食茛菪子粉发生中毒报导. 中医杂志, 1964, (3): 15.
- 51 孙方成. 牵牛子及其所致的副作用. 中医杂志, 1964, (5): 29.
- 52 张国振. 杏树皮治疗苦杏仁中毒有效. 中医杂志, 1965, (2): 20.
- 53 田金德, 李一清. 应用杏树皮治疗苦杏仁中毒有效. 中医杂志, 1965, (9): 封三.
- 54 畅达, 谢天和. 服食大茴香籽中毒 2 例报告. 新医学杂志, 1976, (8): 38-39.
- 55 严国维. 槟榔煎剂驱钩虫引起严重反应 1 例. 中医杂志, 1980, 21(9): 46.
- 56 张占元. 食黑枣引起胃植物球病例报告. 中医杂志, 1964, (2): 20.
- 57 粟秀初, 吴保仁. 中药轻粉口服避孕引起中毒性末梢神经炎报告. 中医杂志, 1981, 22(6): 32.
- 58 沈同戊, 肖协五. 升药(三仙丹)外用所引起之汞中毒. 中医杂志, 1964, (11): 33.
- 59 刁爱章. 口服黄丹中毒 1 例报导. 中医杂志, 1963, (5): 37.
- 60 宝国章. 牛黄解毒片引起血小板减少 1 例. 中医杂志, 1983, 24(3): 56.
- 61 樊建. 服参苓白术散致低血糖反应 1 例. 中医杂志, 1998, 39(4): 243.

佛手散加味治疗深静脉血栓形成 2 例

刘 程* 刘 铭*

1 病例介绍

例 1: 范某, 男, 42 岁, 1996 年 8 月 9 日诊。左下肢肿痛 2 年, 伴左脚内侧溃疡 3 月。肿痛每于午后或行路多时加重。溃疡则时轻时重, 反复发作。舌质红、苔薄黄, 脉沉细。查: 左下肢轻度水肿, 左脚内侧溃疡面积约铜钱大小, 双足背动脉搏动如常。实验室检查: 空腹血糖: 5.4mmol/L。血常规: 白细胞 $9.8 \times 10^9/L$, 中性 0.78, 淋巴 0.22。诊断: 深静脉血栓形成伴溃疡。证属水肿, 气血亏虚, 血瘀同病, 湿热久羁, 痹阻脉络。治宜益气养血, 血瘀同治, 清热利湿, 散结通络。佛手散加味: 当归 60g, 川芎 20g, 茯苓 20g, 羌活 20g, 赤芍、白芍各 20g, 黄芪 45g, 三棱 9g, 莪术 9g, 甘草 9g, 黄柏 12g, 金银花 15g, 连翘 15g, 川贝母 12g。服药 6 剂后, 肿痛减轻; 12 剂后肿消痛止, 溃疡处生出肉芽; 继服 30 余剂, 溃疡亦愈。

例 2: 王某, 女, 38 岁, 1997 年 3 月 2 日诊。半年前骑自行车摔伤左腿。经 X 线片检查无异常发现。约半月后, 左下肢肿胀,

行走亦疼痛, 左腹股沟处可触及一肿块, 某院诊为“左股静脉血栓形成”。中西药物久治不效。刻诊: 左下肢可凹性水肿, 左腹股沟处可及一核桃大肿物, 质硬, 压痛明显。双股动脉、足背动脉搏动如常。舌淡暗、苔薄白, 脉弦细。诊断: 左股静脉血栓形成。证属水肿, 气血亏虚, 血脉瘀阻。治宜益气养血, 化瘀通络, 温阳利水。佛手散加味: 当归 60g, 川芎 20g, 茯苓 20g, 羌活 20g, 赤芍、白芍各 20g, 黄芪 45g, 三棱 9g, 莪术 9g, 甘草 9g, 苍术 12g, 桂枝 12g, 蜈蚣 2 条。服药 6 剂后, 肿胀减轻; 20 剂后, 肿胀消失, 行走已不痛, 肿块缩小至枣核大小; 继服药 20 剂, 肿块消失, 病愈。

2 讨论

佛手散源于《普济本事方》, 由当归、川芎组成, 具益气养血、和血化瘀、通络之功效。加三棱、莪术行气破血、消积止痛, 佐以赤芍、白芍加强养血行瘀之力。重用黄芪, 取其甘温益气生血。茯苓利水渗湿, 配羌活发散风寒湿邪。偏于风寒者, 加苍术、桂枝、蜈蚣以温通血脉; 偏于湿热者, 加川贝母、金银花、连翘、黄柏以清化。诸药合用, 从而促进炎症的吸收, 改善微循环, 消除水肿, 缓解疼痛。

* 山东省鱼台县医院(272300)

收稿日期: 2000-09-30