

误治匡正取效病例 3 则

程 广 里*

主题词 治疗失误

笔者在临床中缘于成见而致误治不效,经详细辨证后改弦易辙方才取效,特整理 3 则如下作为教训。

1 遗尿

刘某某,女,12岁,1979年10月19日来诊。主诉:近3年来,每于夜间尿床,几乎天天如此。近1年来,白天亦觉尿频,甚以为苦。余初诊以为该证乃系少年肾气未充,统摄失职以致水液泛滥,遂用补肾固摄法治之,然服9剂罔效。细查患者,见其面红气促,咳嗽气急,舌质稍红、舌苔黄白相兼,脉象浮洪稍数。余恍然醒悟,此乃邪热壅肺,肺气不利,以致三焦气化失司,膀胱开阖失职。遂改弦易辙,用麻杏石甘汤加味治疗。药用:炙麻黄 10g,杏仁 10g,生石膏 12g,炙甘草 6g,炙苏子 6g,龙齿 9g,石菖蒲 9g,每日1剂。10剂后,3年疾苦竟告痊愈。追访半年,未再复发。

体会:麻杏石甘汤一方,原用于邪热壅肺作喘证,临床用于治疗急性肺炎及急性气管炎等属于肺热者有良好效果,为什么用其加味可以治疗遗尿证呢?笔者认为,人体水液的代谢主要依赖肺、脾、肾、三焦的联合作用,《金匱翼》云:“水虽主于肾,而肾上连肺,若肺气无权,则肾水终不能摄。”如果邪热壅肺,肺失肃降,影响到肾与膀胱的气化功能,导致膀胱开阖失常。若开之太过,则出现遗尿、小便失禁、尿频;若阖之太过,则出现小便不利、尿闭之症。因此用麻杏石甘汤加味,不仅可以治疗邪热壅肺所致的遗尿症,也可以用它治疗邪热壅肺而致小便不利引起的浮肿诸症,笔者在临床上就曾应用麻杏石甘汤加味治疗肾炎水肿而获良效。治虽相反,其理则一。因此临床务求精细,以防误诊。

2 尿闭

张某,女,27岁,1984年8月6日会诊。患者剖腹产后25天,一直不能自主排尿,曾用中西药及封闭治疗均无效,故长期保留导尿管,特请中医会诊。见患者面色苍白,形瘦神疲,腰背酸痛,浑身乏力,舌质淡红、舌苔薄白,脉象沉弱。诊为肾气不足,气化无能,然给予补肾利尿之品6剂,却丝毫不见动静。细问病人,总感

心慌气短上下气难以接续,惟以长吸为快。余恍然有所悟,此乃剖腹产后,损伤气血,以致胸中大气下陷,肺气失养,肺为水之上源,肺虚开阖不利而致尿闭,治当求其所属,宜升阳举陷法,用张锡纯升陷汤加味。处方:黄芪 40g,知母 12g,桔梗 12g,升麻 10g,柴胡 12g,白术 20g,苏叶 10g,通草 2g,每日1剂。服药6剂后,小便即通,守方再进6剂,诸证皆失,痊愈出院。

体会:产后癃闭证,乃产后常见病之一。其病因多系产后劳伤气血,肺脾气虚,或因肾虚,亦有因肝郁者。然产后25天仍不能自主排尿者较为少见。余先按肾虚不能化气施治不效,此乃辨证之误也。因患者短气不得以息,乃大气下陷之明证也。用张氏升陷汤加味,方为药证合拍,于是一举奏效。临床并非见闭用通,治病宜求其本也。

3 瘰癧

李某,女,11岁,1976年4月8日初诊。主诉:1月前因感受风寒而四肢疼痛,经用西药治疗,疼痛虽然好转,但又出现手足瘰癧,开始每日1~2次,以后逐渐加重,每日达4~5次之多,每次持续数分钟,历时1月有余,易数医而不效。经问诊得知,瘰癧仅局限于手足,发作时神志清楚,口不吐白沫,无癫痫发作史。实验室检查:血钙、磷正常,舌质淡红、舌苔白腻,脉象滑数。遂以养血熄风之品治之,然三诊仍不见效。观前医方亦皆为养血熄风镇痉之品,余细思患者病情,虽为瘰癧,然非癫痫。而舌质淡红、舌苔白腻,始悟此非血虚,乃患者久病,以致痰浊内阻,气机不运,清阳不布,津液不敷,而致筋脉失养,瘰癧作矣。遂拟二陈汤加味治之。药用:陈皮、茯苓、炙甘草、枳实各9g,制南星、清半夏、川贝母各6g,钩藤 12g,酸枣仁 15g,远志、葛根各10g,每日1剂。服3剂而瘰癧止,头重头沉头痛减其大半,又进9剂,诸症皆失。

体会:瘰,筋脉拘急而缩;癧,筋脉缓弛而伸;手足伸缩交替,抽动不已,称为瘰癧。其病因病机主要是邪壅经络,热盛伤津,气血亏损而致筋脉失养,而从痰论治者较少见。此例患者初用养血熄风治之罔效,后见患者舌苔白腻,少食欲呕,头重肢沉等,始悟其病机乃素有痰湿,加之寒湿内侵,致脾运失职,痰浊中阻,清阳不布,津液不敷,筋脉失之温养,故瘰癧作矣。用二陈汤燥湿化痰,再佐以镇痉熄风之品,收效甚捷。

* 河北省唐山市开滦赵各庄矿业有限公司医院中医科,唐山市古冶区赵各庄(063101)

收稿日期:2000-06-08;修回日期:2000-10-08