

某医院拟诊肺炎,即用青、链霉素治疗 5 天,发热 39℃ 以上不退,咳嗽加重,遂转至某医院就诊,诊断为肺炎、肺脓疡。用抗生素治疗 1 周,右胸肋又发脓胸,做插管作闭塞引流,每日引流排出脓性分泌物约 150ml 左右,10 天后,患儿仍发热、咳吐脓血,动则气喘,精神萎靡,消瘦。因家庭经济困难,即自动出院回家,用鲜马鞭草梗约 150g,捣烂加冷开水约 60ml 再拌捣片刻,用纱布包裹取汁,每次以少许给患者频频饮咽,分 2 日服完。连服 1 周,患儿发热全退,咳嗽气喘明显减轻,咳吐与引流管脓血消失,饮食增进。于是拔除引流管,给予饮食调养,1 月后身体恢复正常,随访 30 年病未复发。

马鞭草为主治疗乳糜尿

山东省邹城市叔和中医院(273500)

潘述平

近年来,笔者在临床实践中,应用大剂量马鞭草为主药治疗乳糜尿 38 例,疗效颇佳,现介绍如下。

38 例患者中,男性 30 例,女性 8 例,年龄 32~61 岁;病程 11 个月~8 年,38 例患者均有不同程度的乳糜尿,时轻时重,或有乳糜凝块,偶尔伴有血凝块,所有病人乳糜尿试验均为阳性。伴有蛋白尿者 21 例,红细胞者 9 例,白细胞者 8 例。38 例患者全部以马鞭草为主药,配以滋肾填精、健脾渗湿之剂加减,每日 1 剂,14 天为 1 个疗程。结果治愈 21 例,好转 15 例,无效 2 例,总有效率为 94.7%。

如李某某,男,37 岁,干部。患者于 1996 年 8 月 4 日初诊。3 个月小便经常出现乳白色,有时呈白色油脂状凝块,小便时尿道无疼痛之感,进荤食后症状加重。经服西药治疗乏效而来我院就诊。乳糜试验呈阳性,并伴有头晕目眩,神疲乏力,腰部酸痛;脉沉细,尺部尤甚,舌苔薄白。证属脾肾虚损,以致气化不行,不能制约脂液而下注。治以滋补脾肾,分清降浊为主。处方:马鞭草 30g,金樱子 15g,芡实 30g,玉米须 30g,益智仁 12g,连须 10g,黄柏 10g,黄芪 20g,白术 10g。服药 18 剂,尿中凝块消失,但小便有时仍混浊,坚持上方加减,半个月后,小便转清,为巩固疗效,再加服单味马鞭草,以善其后。半年随访,小便正常,随访 3 年多未发。

乳糜尿属中医学“便浊”范畴,其发病机理,则是本在于肾,制在于脾,因脾虚气化无力,肾虚不能摄纳,故脂液随小便而下注。因此,治疗应以补肾健脾治其本,分清降浊治其标,随症加减,方能药到效应。马鞭草性味苦凉,苦能燥湿,凉能清热,但凉而不寒,无伤脾留邪之虑;归肝脾二经,故有健脾利湿之功,再配以滋肾填精之品,对治疗乳糜尿确有实效。

马鞭草治疗前列腺增生症

湖南省株洲市第一医院(412008)

曹志明

前列腺增生症为老年男性常见病,以尿频、尿短、点滴不畅、夜尿多等为主要症状。近几年来,笔者以马鞭草为主治疗前列腺增生症效果甚佳,现举例如下。

李某某,男,67 岁,患前列腺增生症。5 年来曾用前列康片、酚苄明片、金尼通片及抗菌类药物;也曾服用过中药八正散(汤)和金匱肾气丸、抵当汤、少腹逐瘀汤等。症状时有改善,但夜尿仍在 5 次左右,排尿不爽、尿线短少。笔者接诊时,患者恰逢感冒后,前列腺增生症状加剧,夜尿 8~9 次,尿线细散,余沥不尽,大便秘结,少腹急满,烦躁不安,直肠指诊触及前列腺体约乒乓球大小,表面光滑,边缘清楚,质地中等,有弹性,中央沟浅平,诊断为前列腺增生症,膀胱湿热瘀阻型。处方:马鞭草 15g,桃仁 10g,酒大黄 10g,萆薢 15g,车前子 10g,夏枯草 15g,王不留行 12g,甘草 10g,龙葵 10g。水煎服,日服 2 次,进服 10 剂后复诊,尿线增粗增长,夜尿约 2~3 次,大便日行 1 次。原方去桃仁、大黄,加党参 15g,白术 15g,固其正气,再进服 15 剂。三诊时,夜尿偶见 1 次,直肠指诊前列腺较前缩小约鸽蛋大小。质中等偏软,光滑,弹性好,中央沟摸及,继前方加补骨脂 10g、菟丝子 15g,兼理脾肾,以资巩固。

马鞭草入肝脾经,有活血、通经、利尿作用。伍大黄、桃仁、王不留行、龙葵增强活血化瘀作用,伍夏枯草、龙葵清热解聚散结,与萆薢、车前子增强利湿通淋。对于前列腺增生症,不论属何种类型,加入马鞭草均可收到较好疗效。

马鞭草治疗血尿

湖南省中医药学校(412002)

刘百祥 谭李红

马鞭草性微寒,味苦酸,具有祛风清热,活血消积之功效,常用于风热感冒、湿热痢疾、腹泻、黄疸、闭经等,也有用于血淋的文献记载。笔者用马鞭草治小儿急性肾小球肾炎(水肿)镜下血尿久不消者,取得一定疗效,现介绍如下。

36 例均为门诊病人,其中男 22 例,女 14 例,年龄 6~14 岁,病程 2~6 个月,均经实验室检查诊断为急性肾小球肾炎。用马鞭草加导赤散,或加知柏地黄丸,或加五味消毒饮治疗。疗程 3~14 天,平均 7 天左右。镜下血尿消失,连续观察 3 次均为阴性为有效。结果 36 例全部有效,追踪复查 2~6 个月未见复发者。现将