

临

床

报

道

哈士蟆油为主治疗顽固性剥苔 30 例

浙江省桐乡市洲泉中心医院(314513)

朱 昇

顽固性剥苔为临床多种疾病所常见,有缠绵难愈、反复发作的特点,疗效欠佳。笔者曾用单味哈士蟆油治疗,收到较好疗效。后视不同证型,分别加味治疗 30 例,取得了更为满意的效果,现分析报道如下。

1 临床资料

本组 30 例,其中男性 12 例,女性 18 例;年龄 6~75 岁,平均 40.8 岁;病史 14 个月~20 年;花剥苔 14 例,光剥苔 16 例。临床分型:阴虚型:舌质赤、口燥咽干、易饥而食少、大便干、脉细数为主症(10 例);阳虚型:舌质淡白、畏寒、四肢清冷、脉小无力为主症(6 例);气阴两虚型:舌质淡白或红、口燥咽干、口渴不欲饮、头晕目眩、神倦乏力、脉细或小而无力为主症(8 例);阴损及阳型:舌质淡白或红、口燥咽干、腰脊酸楚、畏寒、脉小无力为主症(6 例)。西医分类:器质性疾病 22 例(其中肺结核 8 例,骨结核 4 例,前列腺增生 4 例,萎缩性胃炎 6 例);功能性疾病 8 例(其中胃肠植物神经紊乱 5 例,神经官能症 3 例)。

2 治疗及观察方法

取哈士蟆油 250g,以水浸透后滤干,喷洒少许黄酒以去腥味,加入等量冰糖于同一容器内,隔水文火炖至膏状。每日早晚各 1 次,每次服 5~8g。天热需置放在冰箱内或隔日炖 1 次以防变质。加味:阴虚型用 石斛 6g,天花粉 10g;阳虚型用菟丝子、肉苁蓉各 10g;气阴两虚型用太子参、玄参各 10g;阴损及阳型用知母、巴戟天各 10g。每日 1 剂,分早晚两次煎汤至 100ml~150ml,送服哈士蟆油膏。1 月为 1 个疗程,最多治疗 3 个疗程。

3 治疗结果

疗效标准:治愈:剥苔全部消失;显效:剥苔存全舌面 $<1/9$;有效:剥苔存全舌面 $>1/9$ 、 $<1/4$;无效:剥苔缩小不显或仍占全舌面 $1/4$ 以上。结果治愈 20 例,占 66.7%;显效 5 例,占 16.7%;有效 2 例,占 6.6%;无效 3 例,占 10%。总显效率 83.2%,总有效率 90%。

4 讨论

哈士蟆油治疗顽固性剥苔为吾师所传,从师侍诊时亲睹此类患者,辗转求医不愈,而师用此药治疗,大多获得意想不到的疗效。笔者独立临诊后,为了进一步提高疗效,视不同证候,分别加味验证 30 例,效果满意。

哈士蟆油为雌性两栖纲无尾目蛙科动物中国林蛙或黑龙江林蛙的两条干燥输卵管。有关文献记载,林蛙生于阴湿处,善能养阴生津、阴阳双补。性甘平,主治身体虚弱,滋阴养肺。按临

床验证,该物为血肉有情之品,为阴中之阳物,有滋阴不损阳、补阳不耗阴之优。据现代药理分析,内含人体必需的氨基酸、蛋白质、脂肪、维生素 A、类胡萝卜素、多种无机物等,营养物质比例较高,是一种不可多得的良好药。为治疗顽固性剥苔不可替代的药物。从 30 例的疗效分析看,12 例结核病患者均治愈或显效。病史 10 年以上,有家族史者效果较差。阴损及阳型较其他 3 型效果稍差,与此型患者病史较长有关,与性别及年龄关系不大。

愈囊消胶囊治疗多囊肾 31 例

江苏省淮阴经济开发区钵池医院(223005)

吴洪龄 吴 霞

多囊肾为疑难病症之一,主要特征为腹胀、腹痛、腰痛、活动时加剧,平卧后渐缓,腹部肿块,高血压,血尿,贫血,少数患者有红细胞增多症。自 1982 年 4 月~1999 年 4 月,笔者根据其病理,应用自拟愈囊消胶囊治疗本病 31 例,取得较为满意的疗效。现报告如下。

1 临床资料

本组 31 例中,男性 14 例,女性 17 例;年龄:38~45 岁者 18 例,46~50 岁 9 例,51 岁以上者 4 例。其中并发症:腹胀者 14 例,腹痛者 9 例,腰酸痛者 26 例,高血压者 19 例,血尿者 21 例,肝囊肿者 16 例,肾单侧或双侧结石者 28 例,胆结石者 12 例,晚期出现肾功能衰竭者 2 例,死亡者 1 例。本组病例均有家族史。以上病例均经 B 超、X 线拍片、造影或 CT 等检查证实。

2 治疗及观察方法

由鬼箭羽、炮山甲、大皂荚、夏枯草、猫爪草等药组成。先将夏枯草、鬼箭羽、猫爪草等药洗净,水煎,浓缩。再将炮山甲、大皂荚研为细末,与上药搅拌均匀,装 0.3g 空心胶囊,每服 4~6 粒,每日 3 次。6 个月为 1 个疗程。如见血尿,或肾结石及其它症状,需另服药调理治疗。

3 治疗结果

本组 31 例,治愈 15 例(临床症状及体征消失,B 超提示未见囊性暗区者);显效 13 例(临床症状及体征消失,B 超提示囊性暗区明显缩小者);无效 3 例(临床症状体征略有改善,B 超提示囊性暗区未见缩小者)。总有效率为 90.3%。疗程最短的 6 个月,最长的 33 个月,平均治疗 9 个半月。本组治愈 15 例,1~2 年后随访,情况均良好,未见复发。

4 典型病例

例 1:曾某某,男,54 岁,干部,1993 年 7 月 20 日诊。诉腰部酸楚疼痛反复发作,间歇性血尿 1 年余,未能重视。后腰腹痛加重,血尿较重,有时涓滴不畅,双下肢轻度水肿,面色苍白,神疲