

2. 胎位异常: 据统计⁽²³⁾, 国内 5302 人, 经治疗胎转成头位者为 80.8%, 其中中药 88.5%, 针灸 77.3%。中药转天汤、加减四物汤、减味保产无忧散、当归芍药散都有不同程度的兴奋子宫作用。针灸及激光照射至阴穴疗效可靠, 无副作用, 符合围产保健的要求。一般认为, 30 孕周前有自然转正的可能, 治疗最适宜之孕周为 31 至 35 周。

(四) 围产儿疾病:

1. 硬肿症: 本病为阴寒内盛, 局部敷硬肿膏(肉桂、丁香、川乌、红花等), 同时静注复方丹参注射液 2 毫升, 一日 2 次, 疗效明显优于单纯西药对照组 ($P<0.05$)⁽²⁷⁾。

2. 梗阻性黄疸: 用复方白茅根汤(白茅根、木贼草、板蓝根、金钱草等)随证加减, 配合服用或后期服用硝矾散, 总有效率为 84%⁽²⁸⁾。对新生儿黄疸用消黄利胆汤(茵陈、熟军、栀子、金钱草等)配合西药对症治疗, 疗效明显优于单纯西药组 ($P<0.05$)。

3. 感染后呼吸暂停: 在治疗原发病的基础上, 发现患儿呼吸停止 20 秒以上, 立即进行人工呼吸或静注洛贝林等, 待恢复自主呼吸后, 马上肌注或静注牛黄醒脑注射液, 能有效防止呼吸暂停再次发作⁽²⁹⁾。红参煎汁能抗呼吸衰竭和心力衰竭, 与西药合用能使新生儿危象迅速得到改善⁽³⁰⁾。

三、围产期疾病中医研究前景

随着现代自然科学的交叉渗透和妇产科技术的不断改进, 如何发挥中医特长, 降低诸如妊娠中毒症、新生儿溶血病的发病率和提高其治愈率, 开展中医对围产儿生长发育障碍的防治, 加强病证相关的综合研究, 加强对高效、安全的验方筛选整理和剂型改革,

大幅度地增进药物与围产期母婴生理系统相互作用的知识, 长期随访以考察某些药物对人类诸如智能和体格发育的影响等, 相信这些对中医在围产期防病治病方面将具有重要作用。

参 考 文 献

- (1) 黄云亮. 中医杂志 1982; (12):4.
- (2) 高晓山. 浙江中医杂志 1980; (11, 12):564.
- (3) 王秀敏, 等. 孕产妇用药. 北京科学技术出版社, 第 1 版, 1987:203.
- (4) 刘为民. 南京中医学院学报 1984; (1):35.
- (5) 吉怡芳, 等. 吉林医学 1983; (1):32.
- (6) 苟楨桃. 浙江中医杂志 1987; (1):36.
- (7) 赵松泉, 等. 中医杂志 1984; (5):40.
- (8) 徐敏华. 上海中医药杂志 1985; (2):25.
- (9) 朱文新, 等. 上海中医药杂志 1988; (3):5.
- (10) 李玉玲. 中西医结合杂志 1988; (10):611.
- (11) 李恩棠, 等. 中西医结合杂志 1984; (3):137.
- (12) 陈蕙英. 中医杂志 1985; (9):25.
- (13) 王淑雯, 等. 天津中医药 1986; (3):168.
- (14) 高晓哲. 中医杂志 1984; (11):25.
- (15) 徐敏华, 等. 上海中医药杂志 1984; (3):14.
- (16) 郭天玲, 等. 中西医结合杂志 1986; (12):714.
- (17) 张雅洁, 等. 中医杂志 1984; (5):38.
- (18) 黄莉萍, 等. 中医杂志 1983; (3):37.
- (19) 湖北中医学院附属医院. 中西医结合杂志 1984; (8):472.
- (20) 施文峰. 江西中医药 1988; (2):25.
- (21) 张炉高. 浙江中医杂志 1985; (11, 12):494.
- (22) 袁今奇. 上海中医药杂志 1983; (12):32.
- (23) 马乃珏. 上海中医药杂志 1986; (12):12.
- (24) 高伯正, 等. 中成药 1988; (5):37.
- (25) 陈芳, 等. 江苏中医杂志 1984; (2):26.
- (26) 赵荣胜. 中医药信息 1988; (5):32.
- (27) 傅淑琴. 陕西中医 1988; (6):254.
- (28) 曹旭, 等. 上海中医药杂志 1987; (3):26.
- (29) 曹辅发. 福建中医药 1989; (1):27.
- (30) 王赤梅, 等. 中成药研究 1987; (7):24.

皮炎油膏治疗眼睑隐翅虫性皮炎 50 例

安徽中医学院附属医院 赵 经 梅

眼睑隐翅虫性皮炎为本地区夏秋季节多发病, 且易与麦粒肿、过敏性皮炎等相混淆。笔者应用皮炎油膏治疗本病 50 例, 收效满意, 特总结报道如下。

一、诊断要点: 眼睑部见条状皮损, 并伴见极小之细泡, 皮损处触痛, 周围皮肤亦肿胀。部分病例伴见面部、颈部类似皮损。

二、一般资料: 本组病例男性 19 例, 女性 31 例, 年龄最大 51 岁, 最小 17 岁。40 例发病后直接来本院就诊, 10 例曾在外院误诊为麦粒肿、过敏性皮炎等, 治疗不效转来我科。

三、方药组成: 生黄柏 10 克, 白芷 10 克, 生南

星 10 克, 雄黄 5 克, 明矾 5 克。共研极细末贮瓶备用。

四、用法: 取上药适量加麻油调成糊状, 外涂患处, 每日 2~3 次, 勿入眼内。

五、疗效: 50 例患者全部治愈, 平均治愈时间为 2.5 天。

按: 隐翅虫性皮炎是一种毒力极强的隐翅虫爬触皮肤所致。本方中之雄黄能解毒杀虫, 明矾燥湿止痒, 黄柏、白芷、南星解毒疗疮, 故本方可用于各种毒虫咬伤, 对蜈蚣伤、蛇咬伤亦有疗效。我们还试用于带状疱疹, 亦收满意疗效。