

牛黄冲剂治疗寻常型银屑病 59 例临床观察

何 玲¹ 吴 淞²

摘要 目的:观察中药浓缩颗粒复方制剂牛黄冲剂治疗寻常型银屑病(血热证)的临床疗效。方法:设立牛黄冲剂治疗组(治疗组)59 例和迪银片对照组(对照组)51 例,以严重程度指数(PASI)积分的改善情况为指标进行临床疗效观察。结果:治疗组与对照组总有效率分别为 87.9%、70.6%,治疗组疗效明显优于对照组($P<0.05$)。结论:牛黄冲剂治疗寻常型银屑病(血热证)有较好的疗效。

主题词 银屑病/中医药疗法 @ 牛黄冲剂

我们于 1999 年 11 月~2001 年 2 月对牛黄冲剂治疗寻常型银屑病进行临床观察,并与迪银片作比较,现报道如下。

1 临床资料

病例选择参照《中药新药治疗白疮的临床研究指导原则》^[1]。入选标准:确诊为寻常型银屑病进行期,中医辨证属血热证,男女不限,年龄 10~65 岁。排除标准:妊娠或哺乳期妇女;过敏体质;合并有心血管、脑血管、肝、肾和造血系统等严重原发性疾病、精神病患者;关节型、脓疱型、红皮病型银屑病。剔除标准:对本药过敏;未按规定用药,无法判断疗效;治疗期间使用激素或其它治疗银屑病药物。

109 例银屑病患者随机分为两组。治疗组 58 例,男 39 例,女 19 例;平均年龄 32.7 岁;病程 3 个月~8 年,平均 3.2 年。对照组 51 例,男 33 例,女 18 例;平均年龄 33.2 岁;病程 2.5 个月~8 年,平均 3.1 年。两组间年龄、性别、病程等比较差异均无显著性($P>0.05$),具可比性。

2 治疗及观察方法

治疗组予牛黄冲剂(由水牛角、生大黄、土茯苓、牡丹皮、生地黄、白花蛇舌草、赤芍、全当归、苦参、白鲜皮、山豆根、生甘草、金银花、菊花组成,制成浓缩颗粒),每日 1 剂,分早、晚各服 1 次,开水冲服。

对照组予迪银片(由重庆华邦制药有限公司生产),每日 10 片,分 1~2 次口服。在治疗期间,两组均不采用外用药,并且每周做临床观察和记录 1 次,30

天为 1 个疗程,连续观察 2 个疗程,60 天后进行疗效统计。

疗效统计采用 Ridit 分析。

3 疗效标准及结果

按瘙痒、红斑、浸润、鳞屑及面积作银屑病面积和严重程度指数(PASI)评分。临床痊愈为 PASI 下降 95%以上;显效为 PASI 下降 60%~94%;有效为 PASI 下降 30%~59%;无效为 PASI 下降 30%以下。以临床痊愈、显效、有效合计计算总有效率。

结果治疗组临床痊愈 11 例,显效 26 例,有效 14 例,无效 7 例,总有效率 87.9%,对照组临床痊愈 6 例,显效 17 例,有效 13 例,无效 15 例,总有效率 70.6%,两组总有效率比较差异有显著性($P<0.05$)。

不良反应:治疗组治疗观察期间有 8 例患者(占 13.8%)轻度腹泻,其余患者未见不良反应。对照组 42 例患者(占 82.4%)出现口干、唇干、皮肤干燥、脱屑,32 例患者(占 62.7%),出现皮肤瘙痒。两组治疗前后血、尿常规及肝肾功能均未见异常。

4 讨论

中医认为,血热是银屑病发生的主要内在因素。血热形成与多种因素有关。七情内伤,气机壅滞,郁而化火,以至心火亢盛,热伏营血而引起血热;饮食不节,过食腥荤动风食物可引起脾胃失和,气机不畅,郁久化热引起血热;邪热入血;煎熬津液,故血热同时又可伴发血瘀。方中水牛角、生大黄、金银花、菊花、土茯苓、白花蛇舌草、山豆根、白鲜皮、生甘草清热解毒;水牛角、生大黄、牡丹皮、赤芍、生地黄、当归清热凉血、活血散瘀;白鲜皮、苦参祛风止痒。诸药合用,共奏清热解毒、凉血散瘀、祛风止痒作用。现代医学认为,银屑病的病理主要由于角朊细胞增生、血管增生和炎症发生。免疫异常可导致角朊细胞膜的异常,随后引起环磷酸腺苷(cAMP)和前列腺素失去平衡,使表皮增生而发病^[2]。临床实验结果表明^[3],生地黄、当归、赤芍有显著抑制细胞增殖效应,白花蛇舌草、牡丹皮抑制作用也很突出。苦参中含有抑制角朊细胞生长的有效成分,大黄中大黄素能抑制角朊细胞、白细胞介素 6、肿瘤坏死因子的产生,从而抑制这两种细胞因子对角朊细胞活性增殖的自分泌作用。组成牛黄冲剂的各味药均具有不同

1 安徽省淮南市中医院皮肤科,淮南市田家庵区人民路香港街(232007)

2 江苏省中医院

收稿日期:2001-03-29;修回日期:2001-06-27

程度的抗炎、调节免疫功能作用^[4]。

迪银片是目前临床上应用比较广泛的治疗寻常型银屑病有效药物。我们在临床观察中发现,迪银片总有效率为 70.6%,牛黄冲剂总有效率为 87.9%,服药 60 天后,经 Ridit 分析,两组疗效差异有显著性。迪银片在服药 2 周左右时,82.4%患者有口干、唇干、皮肤干燥、脱屑,62.7%患者皮肤瘙痒较剧,显示迪银片有一定的副作用,而服用牛黄冲剂患者仅有 13.8%轻度腹泻,每日 2~3 次,不影响治疗。我们对治疗结束已半年的 11 例临床痊愈者进行随访,其中服迪银片 4 例,有 2 例在停药 2 个月左右复发,1 例在停药 4 个月左右复发,复发率为 75.0%,而 7 例服牛黄冲剂者,仅有 1 例在停药 3 个月左右复发,复发率为 14.3%。由此可见,

牛黄冲剂具有疗效好、副作用小、复发率低的特点。剂型采用中药无糖颗粒剂,冲服方便、作用迅速、成分完全、疗效确切。综上所述,牛黄冲剂作为治疗寻常型银屑病血热证新型药物之一,值得进一步研究探讨。

参考文献

- 1 中华人民共和国卫生部制定发布. 中药新药临床研究指导原则. 第 3 辑, 1997: 101-102.
- 2 杨国亮, 王侠生. 现代皮肤病学. 上海: 上海医科大学出版社, 1998: 513.
- 3 张洪儒, 瞿幸. 中医药治疗银屑病的实验研究进展. 中医杂志, 2000, 41(4): 246-247.
- 4 骆和生, 罗鼎辉, 王培训, 等. 免疫中药学——中药免疫药理与临床. 北京: 中国协和医科大学北京医科大学联合出版社, 1999: 50, 69, 90, 157, 160, 162, 182, 199, 208, 213, 216, 218, 315.

复方鳄油冻疮膏治疗冻疮 136 例

李扬臻¹ 汪 桐²

我院于 1996 年 11 月~1998 年 4 月用复方鳄油冻疮膏(简称鳄油膏)治疗冻疮 136 例, 现报告如下。

1 临床资料

136 例中, 男 61 例, 女 75 例; 年龄 7~77 岁; 职业为学生、工人、农民、教师、护士、医生、会计等; 病程 ≤ 1 年 9 例, 2~5 年 89 例, 6~10 年 34 例, 10 年以上者 4 例。冻疮分级: I 级(红斑型)110 例, II 级(水泡溃疡型)26 例, III 级(坏死型)0 例。生于手者 84 例, 足 17 例, 耳 3 例, 手足并存者 29 例, 足耳并存者 3 例。

2 治疗及观察方法

2.1 药物来源与组成: 鳄油由安徽省扬子鳄繁殖研究中心提供, 配以冰片、樟脑等中药组成, 经加工精制而成软膏。

2.2 使用方法: 先用温水洗净患处, 未溃处稍加按揉, 揩干后涂擦鳄油膏, 每日 2~3 次, 每次均匀涂薄薄一层为度, 稍加搓揉, 以使药膏渗入皮下。破溃处以周边为重点涂药, 10 天为 1 个疗程。

3 治疗结果

3.1 疗效评定标准: 参考国家中医药管理局 1994 年颁布的《中医病证诊断疗效标准》评定。治愈: 全身症状消失, 红肿消退, 麻木疼痛消失, 创面愈合。好转: 全身症状基本消失, 麻木疼痛均明显减轻, 创面愈合。未愈: 全身及局部症状无改善。

3.2 治疗结果: 鳄油膏组: 136 例中, 治愈 102 例, 占 75%, 好转 34 例, 占 25%, 总有效率 100%。

本疗效与国内有关报道比较, 有明显优势, 例如涂膜剂组 131 例中治愈 78 例, 占 59.5%, 好转 38 例, 占 29%, 无效 15 例, 占 11.45%, 总有效率为 88.5%, 经统计学处理, 两组差异有显著性($P < 0.01$)。

4 病案举例

王某, 女, 26 岁, 本院医生, 1996 年 11 月 26 日初诊, 双手足冻疮史 10 年。入冬后手足散在红肿, 痒痛难忍, 继之红肿成片, 出现散在性溃疡, 常延续至春暖后才逐渐好转, 曾用多种冻疮药水、药膏, 但疗效欠佳。现双手足红肿、痒痛、溃疡点、腐烂、渗出面积为 0.5cm × 0.6cm 左右, 分泌物较多。诊断: II 级冻疮。经病者予以鳄油膏治疗, 5 天后红肿逐渐消退, 痒痒停止, 溃疡逐渐缩小、结痂, 10 天后溃疡已愈合。1997 年 12 月 10 日双手足冻疮复发, 但症状较前减轻, 经再次用鳄油膏治疗后, 8 天即基本痊愈。

5 讨论

《本草纲目》记载, 鳄油主治摩风及恶疮。复方鳄油膏由鳄油、冰片、樟脑等组成。我们曾用单味的鳄油制成软膏, 但疗效较为缓慢。而冰片辛苦微寒, 入肺经, 外用有防腐散热、止痛止痒的效果, 对金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌有抑制作用。樟脑辛热, 有燥湿温经、化瘀消肿止痛之功, 具有轻微局麻作用, 两者古代均用于治疗疮疡疥癣, 现代医学认为, 对皮肤有渗透作用。与鳄油合用相须相使, 便于鳄油有效成分渗入皮肤, 增强了消肿、止痛、止痒、敛疮的作用, 且缩短了疗程, 故疗效可靠。

冻疮是冬春寒冷季节易发疾病, 寒湿是本病的诱发外因, 人体气血虚弱, 阳气不足, 难以通达四肢, 免疫功能低下, 遇上寒湿之邪侵犯, 使肌肤局部气血凝滞, 经络瘀阻, 血运不畅而发病。鳄油膏温阳通络, 燥湿散寒, 活血消肿, 止痛止痒, 无论对 I 级或 II 级冻疮均能改善局部血液循环, 促进溃疡修复, 从而使冻疮迅速愈合。治疗组总有效率 100%, 优于涂膜剂等其他冻疮制剂。治疗组涂擦药膏后, 一般在 24 小时内痒痒及破溃处疼痛减轻, 3~5 天后冻疮局部皮肤颜色变深, 肿块逐渐消散, 破溃面逐渐收敛缩小。其中 10 例患者第 1 年冬季用药后效佳, 第 2 年有 3 例未复发, 6 例复发而症状减轻, 1 例复发如故。

1 皖南医学院附属第二医院, 安徽省芜湖市康复路(241000)

2 皖南医学院老年医学研究所

收稿日期: 2000-05-30