

笔者还在治疗胃癌肝转移、胆囊癌、甲状腺癌时加入大剂穿山甲,都能起到很好的止痛作用。张锡纯论之较详,“穿山甲,味淡性平,气腥而窜,其走窜之性无微不至,故能宣通脏腑,贯彻经络,透达关窍,凡血凝血聚为病,皆能开之”。正是穿山甲这种破血逐瘀,消肿溃痛的功能,方能止顽固性之癌痛。

穿山甲治疗骨髓炎

湖北中医学院(430061)

王 绪 前

穿山甲具有很好的消肿溃痛作用,其善于走窜,性专行散,活血化瘀之力强,能通行经络而直达病所,尤对于疮痈肿毒效果好,其能使痈肿未成脓者消肿,已成脓者速溃,为疡科要药,用其治疗骨髓炎,与皂角刺同用,可增强其作用,能促使炎症消退,加速病变愈合。

如治陈某某,男,10岁。因左下颌关节强直,功能紊乱,不能张口,乃手术矫正,但术后感染,1个半月后伤口仍不能收口,诊断为骨髓炎,曾2次切排引流,用大量抗生素无效,改以中医治疗。查左下颌部明显肿胀,触痛,但皮色无异常,伤口处仍有清稀脓液,舌质淡、苔薄白,脉细数,乃气血不足,瘀血阻滞。拟补益气血,活血生肌排脓。处方:黄芪20g,炮穿山甲珠10g,皂角刺10g,白芷10g,当归15g,川芎10g,赤芍12g,制乳香、制没药各10g,延胡索12g,鸡血藤30g,白及10g,柴胡10g,金银花15g,夏枯草15g,甘草10g。上方连服10剂后,疮面收口,局部无肿痛,无脓液,唯食纳较差,乃去方中柴胡改用炒三仙各10g而愈。

穿山甲历来作为治疗疮疡痈疽要药,如古方仙方活命饮、透脓散中均应用本品,尤其是与皂角刺合用后消散透脓溃坚作用增强,腐去新生。

炮穿山甲为主治疗小儿厌食症

第一军医大学中医系(510515)

孙 升 云

笔者以炮山甲为主配合其它药物治疗脾失健运、乳食内停型小儿厌食症,疗效显著。病例按照《中医儿科病证诊断疗效标准》小儿厌食症规定选择。治疗组157例,男85例,女72例;对照组52例,男27例,女25例;年龄1~12岁。治疗组病程1~40个月;对照组病程1~36个月。

治疗组全部服用山甲颗粒剂(由炮穿山甲、鸡内金、太子参、陈皮、枳实、砂仁、独脚金组成),用法与用量为1~3岁每日1~3g;3~6岁每日3~5g;6~9岁每日5~10g;9~12岁每日10~15g。分3~4次温

开水冲服。2周为1个疗程。对照组用三甲散,每包0.9g,按药物说明服。

疗效评定参照《中医儿科病证诊断疗效标准》制定,以食欲改善为主要评定标准。痊愈:服药2周,食欲明显增进,食量显著增加达正常健康儿,原有症状基本消失,各项实验指标基本恢复正常。显效:服药2周,食欲好转,食量增加,各项实验指标均有改善。有效:服药2周,食欲好转,食量增加,各项实验指标稍有改善或变化不大。无效:厌食主证及各项实验指标无改善。

结果,治疗组157例患儿中,痊愈128例(81.53%),显效15例(9.55%),有效8例(5.10%),无效6例(3.82%),总有效率96.18%。对照组52例,痊愈9例(17.31%),显效17例(32.69%),有效19例(36.54%),无效7例(13.46%),总有效率86.54%。

治疗前后体重的变化:治疗组治疗前体重平均为 $14.72 \pm 5.25\text{kg}$,治疗后为 $16.29 \pm 4.8\text{kg}$;对照组治疗前体重为 $14.15 \pm 5.7\text{kg}$,治疗后为 $14.65 \pm 4.95\text{kg}$ 。两组体重增加方面差异有显著性($P < 0.05$)。

穿山甲古今多用于治疗疮毒癰肿,乳汁不通等证。《医学衷中参西录》说:“味淡气平,气腥而窜,其走窜之性,无微不至,故能宣通脏腑,贯彻经络,透达关窍”,并认为:“……用药不效者,皆可加山甲做向导。”小儿厌食症多由乳食内停、脾失健运所致,多有滞而不通之嫌,因取炮山甲做为引导,组方治之,取得良效。我们同时进行的临床实验研究表明,山甲颗粒剂能够提高厌食患儿唾液淀粉酶的含量及D-木糖排泄率,证明其确有促进消化吸收功能。并且制剂富含锌、铁等必需微量元素,因而也能补充和调节人体对微量元素的需求。

穿山甲治疗儿童生长痛

安徽省蒙城县中医院(233500)

马 建 海

笔者临床中用穿山甲治愈程度不同的儿童生长痛,疗效甚为满意,一般服用1~2次,疼痛即可缓解。

例1:梁某,男,6岁。近半年来常下肢疼痛难忍,经某医院诊断为儿童生长痛。用药不详,疗效不显,请余治疗。药取穿山甲、怀牛膝、炒白术各15g,研末冲服,每次2g,每日2次,连服1周,症状消除。

例2:谭某某,女,学生。膝关节及小腿腓肠肌阵发性疼痛,痛时活动受限2年余,经多方治疗未见显著效果。刻诊:膝关节无红肿,无明显压痛。经血、尿常规,血沉,抗“O”及X线摄片等检查,均无异常,诊为儿童生长痛。处方:炮穿山甲、怀牛膝、炒白术各30g,研末冲服,连用10天,症状消除,半年后随访,未见复发。