DOI:10.13288/j.11-2166/r.2002.03.010

方:太子参、炒白芍、炒白术、当归、神曲、川贝母各 6g,前胡、炒莱菔子各 5g,每日 1 剂,服 5 剂后,未见明显疗效。余思久,证属肺脾两虚,生化乏源,宗气不足,卫外不固,病邪久羁,药症相符。遂予原方加炮穿山甲片 3g,再服 5 剂,症状明显减轻,食欲增加。继用炮穿山甲片、防风、炒白术、川贝母、红参、炒白芍、当归、砂仁、炒鸡内金、炒莱菔子各 12g,研末冲服。每次 2g,每日 3 次,连服 20 天,症状全除,随访 3 个月未见复发。

穿山甲既能破血消肿,通络散风,又能提高身体免疫力,增强抗病功能,在治疗小儿反复呼吸道感染的过程中,能提壶揭盖,使毒祛正增。

重用穿山甲治疗卵泡膜未破症效果好

河南省商丘市第一人民医院中医科(476100)

谢 珍

笔者在临床实践中,对曾施用促排卵药物克罗米酚及绒毛膜促性腺激素(HCG)而形成囊肿的患者,采用自拟化瘀汤重用穿山甲进行治疗,疗效颇佳。现介绍 2 例如下。

例 1:岳某,女,24 岁。1996 年 3 月行人工流产后,2 年未避孕(男方正常)而不孕。月经周期 31 天左右、经量中等,经色暗红,伴有血块。经检查诊断为卵泡发育不良。在月经周期第 5 天,口服克罗米酚 50mg,每日 1 次,连服 5 天;月经周期第 13 天,B 超监测:左侧卵巢内可见 1.8cm×1.9cm 优势卵泡,随即肌注 HCG4000U;在月经周期第 21 天,B 超查示:左侧卵巢内见 4.1cm×4.0cm 卵泡。于 1998 年 5 月 8 日来诊。症见:少腹部胀痛,双乳发胀,舌质暗、舌边有瘀点,脉沉弦涩。辨证:肝郁气滞、血瘀阻络。治宜:疏肝理气,活血化瘀通络。方用自拟化瘀汤。处方:当归 12g,赤芍、白芍各 12g,川芎 12g,陈皮 12g,枳壳 12g,党参 15g,炮穿山甲 20g,黄芪 20g,丹参 20g,甘草 6g,每日 1 剂,水煎 500ml,分早晚 2 次服,连服 3 剂。再次 B 超监测卵泡消失。

例 2:李某,女,26 岁。婚后 1 年余未孕(男方正常),经检查诊断为无排卵性不孕,曾服用克罗米酚半年,并于最后 2 次月经周期中,口服克罗米酚 100mg,在 B 超监测下卵泡长至成熟时,肌注 HCG 连用 3 天,分别为 1000U、2000U、5000U。在第 2 个月经周期第 14 天,B 超监测左侧卵巢内有 2.0cm×2.2cm 优势卵泡,用上述同样方法连续 3 天肌注 HCG,第 23 天时 B 超查示:左侧卵巢内见 4.5cm×4.6cm 卵泡。经期过后 3 天,再次 B 超检查示:卵巢增大、囊肿形成。于 1998 年 10 月 6 日来诊。症见:月经周期 28 天左右,经量少、色暗,经期腹痛,小腹胀满,触诊少腹压痛拒按,能触及一包块,固定不移,舌紫、舌边有瘀点,脉沉涩。辨证:肝郁气滞,瘀血积聚所致。治宜:行气散滞、活血消瘀。方用自拟化瘀汤于上方中加荆芥穗,重用炮穿山甲。并配合服丸剂桂枝茯苓丸(《金匮要略》)。连服 12 天后 B 超监测囊肿消失。

穿山甲治疗小儿夜啼

宁夏平罗县中医院(753400)

梅 明 郭 丽

夜啼多见于初生婴儿,主要因脾寒、心热、惊恐所致,寒则痛而啼,热则烦而啼,惊则神不安而啼。笔者在长期临床实践中采用炮穿山甲研末冲服治疗小儿夜啼,服用方便,疗效可靠。具体方法:炮穿山甲研极细末,每次 0.25g,每日临睡前开水冲服。

穿山甲,咸,微寒,归肝、胃经,可活血通经,下乳,消肿排脓,多用来治疗血滞经闭,风湿痹痛,乳汁不通,症瘕痞块等证。《名医别录》云:"主五邪惊啼悲伤……",《日华子本草》亦云:"治小儿惊邪……"。笔者临床体会,穿山甲味咸属介类药物,可潜阳、镇心,对于因惊恐所致心神不宁,神志不安,睡眠中发生的惊啼,疗效较为突出。穿山甲性味平和,对于脾寒、心热、惊恐所致小儿夜啼皆可应用,临床使用安全可靠,无明显毒副作用,惟其开水冲后有稍许腥味,可酌加冰糖同服。

穿山甲治疗小儿厌食症

山东省淄博市临淄区军干所门诊部(255400)

李 方 兰

穿山甲为鲮鲤科动物鲮鲤的鳞甲,经炮制后研细粉入药。其味咸,性微寒,入肝、胃经。穿山甲具有通经活络,祛瘀生新,健脾助运,消积杀虫,宁神益智,强筋壮骨等功效。穿山甲虽无毒副作用,但易耗气动血,临床应用必须精心辨证,从小剂量开始,视患儿体质恢复情况,稳步递增。笔者几十年来用穿山甲合鸡内金治疗小儿厌食症,以及由厌食症所引起的贫血、营养不良、抗病能力差、易患感冒等症状均有效;对囟门闭合迟缓,语言不清的患儿亦有良效。

用法:将炮穿山甲片、鸡内金按 1∶2 的比例混合制成细粉,加入面粉中做成小饼烙干(注意不要烙糊),根据患儿情况也可加少量的盐或糖以调味,按患儿食量食用。

用量:以 10 天为 1 个疗程。炮穿山甲用量,1~3 岁患儿 10~15g,4~7 岁用 20~30g。一般需服 1~3 个疗程即愈。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net