

叶 10g, 当归 10g, 白芍 15g, 牡丹皮 10g, 夏枯草 12g, 香附 10g, 瓜蒌 12g, 炒酸枣仁 10g, 熟地黄 15g, 路路通 10g, 迭进 20 余剂, 经期停药。于 1994 年 11 月起月经应时而行, 量中色红, 诸症消失, 自行停药。1995 年 2 月月经停闭, 查妊娠试验阳性, 年末育一女, 体健。

用穿山甲组方治疗子宫肌瘤

湖北民族学院医学院附属医院(445000)

赵晓琴

穿山甲, 咸、微寒。归肝、胃经。且有通经下乳, 消肿排脓等功效。临床多用于血瘀经闭, 乳脉不通, 痈疽肿毒, 风湿痹痛, 肢体拘挛或强直等症。笔者临床以穿山甲为主治疗子宫肌瘤, 疗效较好, 现介绍如下。

方药组成及用法: 穿山甲 100g, 三七粉 100g, 三棱 100g, 莪术 100g, 当归 100g, 桂枝 100g, 共研细末炼蜜为丸, 每日 3 次, 每次服 9g, 15 天为 1 个疗程。

如治龙某, 29 岁, 1998 年 8 月 18 日初诊。2 年来月经量较以往增多, 色暗红夹瘀块, 月经周期 25 天。经期 15 天, 伴头昏头痛, 小腹疼痛, 月经期加剧, 白带增多, 色黄, 舌质紫暗边尖瘀斑、苔黄腻, 脉细弦。妇检: 外阴已婚未产, 阴道畅通, 宫颈光滑, 子宫后位增大如孕 45 天、质硬、双侧附件(一)。B 型彩超提示: 7.2cm×6.3cm×5.5cm 肌瘤, 宫内回声不均, 子宫后壁探见约 3.2cm×2.5cm 低回声区, 有光团。双侧附件(一)。属肌壁间肌瘤。服上方治疗 3 个疗程, 症状大减; 嘱再服 1 个疗程, 症状全部消失, 复查 B 型彩超宫内未见占位性病变。1 年后随访, 已怀胎 8 个月。

又治毛某, 35 岁。1994 年 8 月 5 日初诊。自述近半年来每次月经量增多, 淋漓不尽, 伴小腹疼痛, 经色黑有块, 白带增多, 舌红、边尖有瘀点、苔少, 脉弦。妇检: 子宫增大如妊娠 60 天左右, B 型彩超检查提示: 子宫粘膜下肌瘤 6.6cm×7.8cm, 院方建议手术治疗, 患者不愿手术而求治于笔者。服前方 3 个月, 经期加用抗生素抗炎治疗, 患者自述上述症状基本消失, 复查子宫肌瘤基本消失, 子宫偏大; 嘱再服前方 1 个月, 病告痊愈。随访 1 年, 未见复发。

体会: 子宫肌瘤是女性生殖器官最常见的良性肿瘤, 属中医学“症瘕”范畴, 其病位在血分。病因为气滞血瘀, 病机为经期、产后正虚体弱, 饮食起居不慎, 淫邪乘虚客于胞宫, 与血搏结凝聚, 瘀久而成症瘕。现代医学主要采取手术治疗。中医学根据“结者散之”“留者攻之”的治疗方法, 与辨证施治的原则, 采用内服活血破瘀, 行气散结, 以穿山甲为主的药物治疗子宫肌瘤, 效果较为理想。

穿山甲治疗妇产科术后静脉血栓形成

黑龙江中医药大学(150040)

范东明

哈尔滨市红十字中心医院

程俊鸥

静脉血栓形成是静脉的一种急性非化脓性炎症, 并伴有继发性血管腔内血栓形成的疾病。其临床特点为患肢局部肿痛, 皮下可扪及有压痛的条索状物或伴有病变远端浅表静脉曲张等静脉回流受阻现象。笔者临床采用以炮穿山甲配伍金银花、玄参、川牛膝、生甘草, 治疗妇产科术后静脉血栓形成, 获良好效果。

如治患者马某, 女, 62 岁。1998 年 6 月在某妇产医院行子宫全切术后, 左下肢股骨内侧出现红、肿、热、痛体征。体温在 38.5~39.8℃之间, 用大量抗生素, 并静脉点滴丹参注射液等药 1 周, 仍持续不退, 故而来诊。望其患处红肿, 自觉灼热疼痛难忍, 舌质深红、苔少而干, 脉数而有力。证属热毒内蕴, 瘀血阻滞。处方: 炮穿山甲 15g, 金银花 50g, 玄参 25g, 川牛膝 15g, 生甘草 20g。每日 1 剂水煎, 早晚空腹, 以温水加酒 5ml 送下。二诊: 服上方 4 剂, 发热已退, 红肿渐消, 疼痛亦缓, 舌质红已减, 脉仍略数。上方加三七粉 6g(冲服)。又进 6 剂, 诸症皆愈。随访 1 年, 未见复发。

《医学衷中参西录》载: “穿山甲, 味淡性平, 气腥而窜, 其走窜之性, 无微不至, 故能宣通脏腑, 贯彻经络, 透达关窍, 凡血凝血聚为病, 皆能开之”。由是可见, 穿山甲之活血通经消肿之力甚佳, 加之配伍疮家圣药清热解毒之金银花, 降火养阴之玄参, 活血通经之川牛膝, 解毒和药之生甘草, 二诊又辅以活血定痛之三七, 全方用药合理, 组方严谨, 共成活血通经, 清热解毒, 消肿止痛之效, 故而取效。

穿山甲治疗小儿反复呼吸道感染

安徽省蒙城县中医院(233500)

马建海

大凡认为穿山甲走窜善行, 功在通泻, 能消肿排脓, 通经下乳, 活络散风。常用于癰疽结核, 肿疡初起或脓成不溃, 以及妇女瘀血闭经, 乳汁不下等症。笔者临床中用于治疗小儿反复呼吸道感染疗效颇佳。

如治万某, 女, 4 岁。1998 年 10 月 10 日初诊。反复咳嗽 2 个月, 晨起尤甚, 痰色白, 平素感冒, 纳差、面色不华, 肢体疲乏, 舌质淡、舌尖有瘀点、苔白腻, 脉濡细。X 线胸片示: 两肺纹理增多增粗; 血常规: 血红蛋白 104g/L, 白细胞 $4.7 \times 10^9/L$, 中性 0.52, 淋巴 0.48。处

方:太子参、炒白芍、炒白术、当归、神曲、川贝母各 6g,前胡、炒莱菔子各 5g,每日 1 剂,服 5 剂后,未见明显疗效。余思久,证属肺脾两虚,生化乏源,宗气不足,卫外不固,病邪久羁,药症相符。遂予原方加炮穿山甲片 3g,再服 5 剂,症状明显减轻,食欲增加。继用炮穿山甲片、防风、炒白术、川贝母、红参、炒白芍、当归、砂仁、炒鸡内金、炒莱菔子各 12g,研末冲服。每次 2g,每日 3 次,连服 20 天,症状全除,随访 3 个月未见复发。

穿山甲既能破血消肿,通络散风,又能提高身体免疫力,增强抗病功能,在治疗小儿反复呼吸道感染的过程中,能提壶揭盖,使毒祛正增。

重用穿山甲治疗卵泡膜未破症效果好

河南省商丘市第一人民医院中医科(476100)

谢 珍

笔者在临床实践中,对曾施用促排卵药物克罗米酚及绒毛膜促性腺激素(HCG)而形成囊肿的患者,采用自拟化瘀汤重用穿山甲进行治疗,疗效颇佳。现介绍 2 例如下。

例 1:岳某,女,24 岁。1996 年 3 月行人工流产后,2 年未避孕(男方正常)而不孕。月经周期 31 天左右,经量中等,经色暗红,伴有血块。经检查诊断为卵泡发育不良。在月经周期第 5 天,口服克罗米酚 50mg,每日 1 次,连服 5 天;月经周期第 13 天,B 超监测:左侧卵巢内可见 1.8cm×1.9cm 优势卵泡,随即肌注 HCG4000U;在月经周期第 21 天,B 超查示:左侧卵巢内见 4.1cm×4.0cm 卵泡。于 1998 年 5 月 8 日来诊。症见:少腹部胀痛,双乳发胀,舌质暗,舌边有瘀点,脉沉弦涩。辨证:肝郁气滞、血瘀阻络。治宜:疏肝理气,活血化瘀通络。方用自拟化瘀汤。处方:当归 12g,赤芍、白芍各 12g,川芎 12g,陈皮 12g,枳壳 12g,党参 15g,炮穿山甲 20g,黄芪 20g,丹参 20g,甘草 6g,每日 1 剂,水煎 500ml,分早晚 2 次服,连服 3 剂。再次 B 超监测卵泡消失。

例 2:李某,女,26 岁。婚后 1 年余未孕(男方正常),经检查诊断为无排卵性不孕,曾服用克罗米酚半年,并于最后 2 次月经周期中,口服克罗米酚 100mg,在 B 超监测下卵泡长至成熟时,肌注 HCG 连用 3 天,分别为 1000U、2000U、5000U。在第 2 个月经周期第 14 天,B 超监测左侧卵巢内有 2.0cm×2.2cm 优势卵泡,用上述同样方法连续 3 天肌注 HCG,第 23 天时 B 超查示:左侧卵巢内见 4.5cm×4.6cm 卵泡。经期过后 3 天,再次 B 超检查示:卵巢增大、囊肿形成。于 1998 年 10 月 6 日来诊。症见:月经周期 28 天左右,经量少、

色暗,经期腹痛,小腹胀满,触诊少腹压痛拒按,能触及一包块,固定不移,舌紫、舌边有瘀点,脉沉涩。辨证:肝郁气滞,瘀血积聚所致。治宜:行气散滞、活血消瘀。方用自拟化瘀汤于上方中加荆芥穗,重用炮穿山甲。并配合服丸剂桂枝茯苓丸(《金匱要略》)。连服 12 天后 B 超监测囊肿消失。

穿山甲治疗小儿夜啼

宁夏平罗县中医院(753400)

梅 明 郭 丽

夜啼多见于初生婴儿,主要因脾寒、心热、惊恐所致,寒则痛而啼,热则烦而啼,惊则神不安而啼。笔者在长期临床实践中采用炮穿山甲研末冲服治疗小儿夜啼,服用方便,疗效可靠。具体方法:炮穿山甲研极细末,每次 0.25g,每日临睡前开水冲服。

穿山甲,咸,微寒,归肝、胃经,可活血通经,下乳,消肿排脓,多用来治疗血滞经闭,风湿痹痛,乳汁不通,症瘕痞块等证。《名医别录》云:“主五邪惊啼悲伤……”,《日华子本草》亦云:“治小儿惊邪……”。笔者临床体会,穿山甲味咸属介类药物,可潜阳、镇心,对于因惊恐所致心神不宁,神志不安,睡眠中发生的惊啼,疗效较为突出。穿山甲性味平和,对于脾寒、心热、惊恐所致小儿夜啼皆可应用,临床使用安全可靠,无明显毒副作用,惟其开水冲后有稍许腥味,可酌加冰糖同服。

穿山甲治疗小儿厌食症

山东省淄博市临淄区军干所门诊部(255400)

李 方 兰

穿山甲为鲛鲤科动物鲛鲤的鳞甲,经炮制后研细粉入药。其味咸,性微寒,入肝、胃经。穿山甲具有通经活络,祛瘀生新,健脾助运,消积杀虫,宁神益智,强筋壮骨等功效。穿山甲虽无毒副作用,但易耗气动血,临床应用必须精心辨证,从小剂量开始,视患儿体质恢复情况,稳步递增。笔者几十年来用穿山甲合鸡内金治疗小儿厌食症,以及由厌食症所引起的贫血、营养不良、抗病能力差、易患感冒等症状均有效;对囟门闭合迟缓,语言不清的患儿亦有良效。

用法:将炮穿山甲片、鸡内金按 1:2 的比例混合制成细粉,加入面粉中做成小饼烙干(注意不要烙糊),根据患儿情况也可加少量的盐或糖以调味,按患儿食量食用。

用量:以 10 天为 1 个疗程。炮穿山甲用量,1~3 岁患儿 10~15g,4~7 岁用 20~30g。一般需服 1~3 个疗程即愈。