DOI:10.13288/j.11-2166/r.2002.04.004

专题笔谈

穿山甲粉吞服治疗震颤麻痹

浙江省德清县人民医院中医科(303216)
金德全

笔者在临床上用穿山甲粉吞服治疗震颤麻痹，取得一定的疗效，现举例如下。

毛某，男，75岁。1986年开始出现步履不稳，肢体略有抖动，活动欠利，头晕乏力，神经内科诊断为"帕金森病"，一直服西药治疗，但病情不稳定。至1990年2月，病情发展较快，逐渐出现上下嘴唇抖动不停、吞咽困难，虽经住院治疗病情有所好转，但上下嘴唇抖动一直没有停止，饮食比较困难，消瘦乏力，舌质紫，脉细涩。改服中药治疗，采用炙穿山甲片研粉吞服，每日2次，每次6g，黄酒送服，连服1个月后，上下嘴唇、面部抖动缓解、间歇时间延长，继续服上药3个月后，上下嘴唇抖动停止，饮食自理，随访2年未见复发。

本病病机为筋脉失养、肝风内动。《本草从新》对穿山甲功能概括为善窜、专能行散、通经络、达病所。根据治风先治血、血行风自灭的理论，采用活血通络的方法，用炙穿山甲片研粉黄酒送服治疗震颤麻痹，取其通经透络之效，达到满意的治疗效果。

穿山甲治疗白细胞减少症

福建省连江县医院(350500)
郑敏

笔者20世纪70年代初曾师从福建省名老中医孙宜尧老先生，先生以黄芪浓煎送服穿山甲粉治疗白细胞减少症，疗效甚佳。其后笔者每遇白细胞减少症患者辄用之。如治刘某某，男，26岁，于1992年8月2日就诊。自诉近3年来常感头晕，疲乏，稍作轻微活动即心悸、汗出、眼花目眩，且日常极易感冒。检查：白细胞2.2×10^9/L，虽经中西医治疗，疗效欠佳。望其面色㿠白少神，印堂晦暗。纳呆便溏，脉细弱无力，舌淡苔薄白。显系气虚血少，气血瘀滞，脾胃虚弱。处方：炮穿山甲研粉4.5g，另以黄芪20g、当归6g、熟地黄10g、茯苓10g、怀山药10g、砂仁6g、炙甘草3g，浓煎，送服穿山甲粉，1周后，白细胞升至4.1×10^9/L。效不更方，加减继服1个月，白细胞升至4.9×10^9/L。自感神清气朗，诸症均减。嘱其每日以黄芪30g浓煎，送服炮穿山甲粉4.5g，常服不辍。1年后复诊，自云服药后白细胞一直保持在正常范围，且年内虽有流感流行，亦未见感冒。

现代医学认为，黄芪具有增强免疫功能的功效。而气血虚弱往往可致血流凝涩。穿山甲"性专行散，能通经络，有活血之功。"用之益气活血而生血，有补气而不留邪，行瘀而不伤正之功，可收相得益彰之妙。唯穿山甲须以细沙炒透发泡，研细末送服为佳，若入煎剂，其效大逊。且不宜油炸穿山甲片入药，其效亦差。

穿山甲治胸痹、降血脂

河北省保定市第一中医院(071000)
范新发

穿山甲具有抗栓、降血脂的作用。古人用以活血通经、下乳、消肿治疗经闭、乳汁不下等。笔者临床上治疗冠心病心绞痛、高脂血症取得了较好的效果。

穿山甲既有促进血凝的作用，又有溶栓功能。笔者用单味穿山甲粉冲服治疗冠心病心肌缺血、心绞痛，心电图改善率为68.6%。对体外血栓检测，血栓长度、湿重、干重3项指标均超过正常值者60例进行治疗。穿山甲治疗组30例用炙穿山甲粉，每次1g，日服2次；西药对照组30例用肠溶阿司匹林片，每日25mg，均服30天。穿山甲治疗组3项指标均降至正常者22例，1～2项指标降至正常5例，无效3例。西药对照组3项指标均降至正常14例，1～2项指标降至正常10例，无效6例。两组差异有显著性($P<0.05$)。

用穿山甲粉治疗高脂血症，每次1g，每天3次，温开水冲服(可加用食醋10ml，有胃病者除外)。共观察高脂血症患者62例，服药2个月后，复查血脂，作自身对照，结果，降胆固醇有效率为74%；降甘油三酯有效率为56.5%；升高密度脂蛋白有效率为50.8%。

穿山甲善治咽喉肿痛

北京市房山区中医院(102400)
张新荣

笔者近几年在辨证论治的基础上，加用穿山甲治疗咽喉肿痛，每每获效。现举例介绍如下。

患者赵某某，女，34岁。于1995年6月21日来

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net