

专

题

笔

谈

穿山甲粉吞服治疗震颤麻痹

浙江省德清县人民医院中医科(303216)

金 德 全

笔者在临床上用穿山甲粉吞服治疗震颤麻痹,取得一定的疗效,现举例如下。

毛某,男,75岁。1986年开始出现步履不稳,肢体略有抖动,活动欠利,头晕乏力,神经内科诊断为“帕金森病”,一直服西药治疗,但病情不稳定。至1990年2月,病情发展较快,逐渐出现上下嘴唇抖动不停、吞咽困难,虽经住院治疗病情有所好转,但上下嘴唇抖动一直没有停止,饮食比较困难,消瘦乏力,舌质紫,脉细涩。改服中药治疗,采用炙穿山甲片研粉吞服,每日2次,每次6g,黄酒送服,连服1个月,上下嘴唇、面部抖动缓解、间歇时间延长,继续服上药3个月,上下嘴唇抖动停止,饮食自理,随访2年未见复发。

本病病机为筋脉失养、肝风内动。《本草从新》对穿山甲功能概括为善窜、专能行散、通经络、达病所。根据治风先治血、血行风自灭的理论,采用活血通络的方法,用炙穿山甲片研粉黄酒送服治疗震颤麻痹,取其通经透络之效,达到满意的治疗效果。

穿山甲治疗白细胞减少症

福建省连江县医院(350500)

郑 敏

笔者20世纪70年代初曾师从福建省名老中医孙宜尧老先生,先生以黄芪浓煎送服穿山甲粉治疗白细胞减少症,疗效甚佳。其后笔者每遇白细胞减少症患者辄用之。如治刘某,男,26岁,于1992年8月2日就诊。自诉近3年来常感头晕,疲乏,稍作轻微活动即心悸、汗出、眼花目眩,且日常极易感冒。检查:白细胞 $2.2 \times 10^9/L$,虽经中西医治疗,疗效欠佳。望其面色晄白少神,印堂晦暗。纳呆便溏,脉细弱无力,舌淡苔薄白。显系气虚血少,气血瘀滞,脾胃虚弱。处方:炮穿山甲研粉4.5g,另以黄芪20g、当归6g、熟地黄10g、茯苓10g、怀山药10g、砂仁6g、炙甘草3g,浓煎,送服穿山甲粉,1周后,白细胞升至 $4.1 \times 10^9/L$ 。效不更方,加减续服1个月,白细胞升至 $4.9 \times 10^9/L$ 。自感神清气朗,

诸症均减。嘱其每日以黄芪30g浓煎,送服炮穿山甲粉4.5g,常服不辍。1年后复诊,自云服药后白细胞一直保持在正常范围,且年内虽有流感流行,亦未见感冒。

现代医学认为,黄芪具有增强免疫功能的功效。而气血虚弱往往可致血流凝滞。穿山甲“性专行散,能通经络,有活血之功。”用之益气活血而生血,有补气而不留邪,行瘀而不伤正之功,可收相得益彰之妙。唯穿山甲须以细沙炒透发泡,研细末送服为佳,若入煎剂,其效大逊。且不宜油炸穿山甲片入药,其效亦差。

穿山甲治胸痹、降血脂

河北省保定市第一中医院(071000)

范 新 发

穿山甲具有抗栓、降血脂的作用。古人用以活血通经、下乳、消肿治疗经闭、乳汁不下等。笔者临床上治疗冠心病心绞痛、高脂血症取得了较好的效果。

穿山甲既有促进血凝的作用,又有溶栓功能。笔者用单味穿山甲粉冲服治疗冠心病心肌缺血、心绞痛,心电图改善率为68.6%。对体外血栓检测,血栓长度、湿重、干重3项指标均超过正常值者60例进行治疗。穿山甲治疗组30例用炙穿山甲粉,每次1g,口服2次;西药对照组30例用肠溶阿司匹林片,每日25mg,均服30天。穿山甲治疗组3项指标均降至正常者22例,1~2项指标降至正常5例,无效3例。西药对照组3项指标均降至正常14例,1~2项指标降至正常10例,无效6例。两组差异有显著性($P < 0.05$)。

用穿山甲粉治疗高脂血症,每次1g,每天3次,温开水冲服(可加用食醋10ml,有胃病者除外)。共观察高脂血症患者62例,服药2个月后,复查血脂,作自身对照,结果,降胆固醇有效率为74%;降甘油三酯有效率为56.5%;升高密度脂蛋白有效率为50.8%。

穿山甲善治咽喉肿痛

北京市房山区中医院(102400)

张 新 荣

笔者近几年在辨证论治的基础上,加用穿山甲治疗咽喉肿痛,每每获效。现举例介绍如下。

患者赵某某,女,34岁。于1995年6月21日来