

易消散。采用本法局部导入,无长期服药之苦,患部药物离子浓度较高、作用时间长,故能取效。

穿山甲治疗尿血

河北省邯郸市中心医院(056001)

田 霄 燕

河北省邯郸市丛台区田氏中医门诊

田 树 新

先父田成庆教授遇尿血患者时,喜用穿山甲治之,每获良效。用法是将炮穿山甲研极细末,每次服1.5~1.8g,白开水送服,日1~2次。穿山甲活血消瘀、通经下乳、消肿排脓,常用于症瘕积聚、乳汁不下、痈疽疮肿等症,何能止血?遂问之。答曰:前人称尿血痛者为淋,不痛者为尿血。然究其病因多由下焦热盛、热伤血络、涩滞不通所致。穿山甲《本草再新》谓之能解热败毒,《本草纲目》谓之能排脓血,味咸入肾,性寒去热,热解毒消、瘀血尽出,小便畅通,则尿血不止而止也。然尿血亦有脾肾虚者,则加服补脾固肾之药,不可不知耳。

我们曾用先父之法愈尿血者数十例。如治一张姓患者,男,42岁。1997年因尿血经某医院检查,诊为肾小球肾炎,尿检红细胞(+++),用西医消炎止血效果不显,前来求诊。临床症见,小便不利,色如浓茶,伴有血块。舌质红苔黄腻,脉弦数,遂嘱其服炮穿山甲粉。服2次后,小便血块大减,尿色亦呈浅黄,又服4次后,诸症全消,尿检正常。

穿山甲治疗前列腺肥大、肾盂结石

山东省新泰市中医医院(271200)

王 长 海

自1996年以来,笔者在应证方药中加入穿山甲治疗前列腺肥大、石淋,收效颇佳,兹举例介绍如下。

例1:刘某某,男,62岁。排尿困难2年余,加重半月就诊。患者2年前始感排尿困难,以夜间为重,尿频、无尿痛,当时就诊于某医院,诊为前列腺肥大,服用己烯雌酚、氟哌酸后症状减轻,因惧怕产生副作用,遂自行停药,改用中药治疗,初服效佳,后来症状如故,于1996年8月27日来诊。刻下病人排尿困难,伴心烦失眠,腰酸乏力,头晕耳鸣等症,舌质淡红、苔薄黄,脉沉细数,属肾阴不足之证。纵观前医用药,六味地黄丸加利尿之剂也,可谓药证相符,细思之,早年随师进修时,见其善用穿山甲治疗本病,处方如下:熟地黄15g,山药12g,泽泻10g,茯苓10g,山茱萸12g,牡丹皮10g,车前子(包)15g,炮穿山甲10g,皂角刺10g,木通10g,

栀子10g,水煎服,每日1剂,分2次早晚服。服完3剂后,小便已能成流,头不晕,心不烦,它症减轻。效不更方,共服用46剂,排尿已正常。1年后随访未复发。

例2:陈某,女。自述左肾结石1年半,曾多方治疗,共服用中药百余剂未效。现患者时常感腰部酸痛,小便急频,多在劳累时发作,纳食正常,舌淡红、苔薄白,脉弦缓,B超示左肾肾盂结石约0.6cm×0.5cm,中医诊为石淋。患者要求给予简便之方,长期服用,以图缓治。于是给予炮穿山甲10g,王不留行20g,水煎代茶饮,每日1剂,并嘱其每天做跳跃运动20次,同时自我叩击左肾区。服用5天后感腰腹阵痛,遂来诊,B超复查:左肾回声正常,膀胱有一活动之强回声团,于第2天排出体外。

穿山甲性味咸、微寒,入肝、胃经,性善走窜,能活血散瘀,消症积利九窍。《本草纲目》云其能“通经脉、下乳汁、消痈肿、排脓血、通窍杀虫。”临床上治疗前列腺肥大用穿山甲取其可直达病所,具有通窍、消症、散瘀之功用,以达通利水道之目的。若与皂角刺同用则效更著。用穿山甲治石淋者,取其性善走窜之特性,以起“顽石”之根蒂,若能同时配用王不留行以通利滑窍,则取效更速。

穿山甲疗痔疮有良效

锦州石油化工公司医院(121000)

马 骏

穿山甲,味咸,性微寒、善走窜,入肝、胃经。《别录》云:“主五邪惊啼悲伤……疗蚁瘰”。《药性论》:“治山瘡、恶疮。治小儿惊邪,……痔漏恶疮疥癣。”笔者应用以穿山甲为主药的散剂口服(穿山甲、黄连、大黄各等份,每次3g,温开水送服),治疗痔疮取得了良好的疗效。现举例如下。

徐某,男,33岁。患痔疮15年,遇冷及劳累即发或症状加重。症见:肛门有物脱出,疼痛,甚则流脓、流血,平素亦时有便鲜血,影响坐立及行走。经口服上述散剂4~5日后,疼痛及流脓、流血症状明显缓解,服药2周后症状基本消失,肛门外无脱出物。继续巩固治疗2周,随访1年未复发。

痔疮病位在大肠经,多因湿热蕴结或寒湿凝滞或气虚血滞而致局部络脉瘀阻。胃与大肠相表里,且穿山甲入胃经,故用穿山甲取其善走窜、达病所及祛瘀止痛之功。实证佐以解毒利湿化瘀之品,虚证佐以补气活血之品均可获良效。内服散剂较外用药物疗法(如熏洗、肛门塞药、涂药)具有方便、疗效好、方法可靠等优点。