DOI:10.13288/j.11-2166/r.2002.04.035



500g，香油 2500g。制法：先将香油煮沸，搅入马钱子、乳香、没药细末，熬至滴水成珠状，油凉后再搅入章丹，微火熬至黑色膏状，再搅入接骨散即可。然后用白布 10cm² 左右，抹上膏药，每张 10g 备用。本药为外用膏剂，将膏药加温贴髋关节患处，隔 7～10 日换药 1 次，痊愈为止。用药后出现皮疹可暂停用药，待皮疹消失后再用。

3　**治疗结果**

本组 24 例儿童股骨头坏死患者，均采用内服接骨散，外贴伤科活血膏治愈。痊愈标准是症状消失，行走正常，双下肢长度相称，髋外展、内旋试验阴性。本组病例治愈平均时间 3 个月～1 年。1 年后家访未见复发，儿童发育正常。

4　**体会**

接骨散方中以马钱子为主，其通经络，治痈疽肿毒、瘰疬恶疮；麻黄通九窍，调血脉，发汗解肌；骨碎补治筋骨损伤，破瘀血；乳香活血理气，生肌止痛；没药伤科要药，破血通用；三七参、琥珀止血行瘀，消肿定痛，安神定志；牛膝、川续断、杜仲补肝肾、强筋骨，活血通经，接骨续筋，治关节酸痛；土鳖虫、自然铜接骨续筋、散瘀止痛、行血通经；酒通利血脉。伤科活血膏方中马钱子、乳香、没药、接骨散，诸药功能与其在接骨散方中相同。章丹、香油解热拔毒、祛瘀长肉，并为制膏药的主要原料。

本文采用内服接骨散，外贴伤科活血膏治疗儿童股骨头无菌性坏死或缺血性坏死，确有消肿止痛、舒经通络、活血理气、调经脉、祛瘀生新、强筋健骨，使死骨吸收，新骨生长的作用。

## 乳没膏外敷治疗脓疱疮 102 例

山东省嘉祥县妇幼保健院(272400)

任　仰　成

脓疱疮(黄水疮)是由葡萄球菌或链球菌感染引起的一种化脓性皮肤病，夏秋季节常发，儿童中多见，传染性强。自 1995～1999 年笔者自拟乳没膏外敷治疗脓疱疮 102 例，疗效显著，现报告如下。

1　**临床资料**

102 例均为门诊治疗的脓疱疮病例。男 60 例，女 42 例；年龄 1～5 岁 37 例，6～15 岁 50 例，15 岁以上 15 例；病程 1～15 天，平均 8 天。发病部位以面部、四肢多见，皮损数目多达 10 处，少则 1～3 处。疮面周围充血，溢出稀薄淡黄色分泌物及薄厚不等淡黄色结痂。

2　**治疗方法**

药物配制：乳没膏是由乳香、没药、猪油(熬熟去渣)按 1∶1∶4 的比例熬制而成。将 3 药按比例称好，先将猪油熬沸，将乳香、没药轧碎慢慢放入沸油中，使二药完全融化，然后自然冷却，乳没膏即制成。涂药前可先用 3%双氧水清洗疮面，以除去脓痂为度，然后将配制药物涂于疮面上一层，无需包扎，每日早晚各 1 次，渗液多者可用 4 次，3 天为 1 个疗程。在治疗期间无需配合其它疗法。

3　**治疗结果**

疗效标准：治愈：脓痂消失，皮损恢复常态；好转：脓痂及渗液减轻 50%以上；无效：脓痂及渗液存在。结果 1～3 天治愈 14 例，占 13.73%；4～6 天治愈 50 例，占 49.02%；7～9 天治愈 35 例，占 34.31%；未治愈 3 例，占 2.94%；总有效率为 97.06%。

4　**病案举例**

王某某，女，18 岁，学生。头面潮红，出现丘疹水疱、脓疱，逐渐糜烂、结黄色痂，并逐渐增多。已病休 1 周，患者要求在本门诊治疗，经外敷乳没膏 5 天，症状完全消失，返校学习。

5　**讨论**

本法采用 3%的双氧水，清创局部，清除脓液，有利于药物发挥作用。《药性歌括四百味》中指出："乳香辛苦，疗诸恶疮，生肌止痛，心腹尤良"。"没药苦平，治疮止痛，跌打损伤，破血通用"。现代药理研究证实，乳香、没药主要含树脂、树胶、挥发油，有灭菌消炎、防腐消肿、止痛收敛的作用，使已溃破的表面不再受炎性渗出物的侵袭和腐蚀。猪油有软化痂皮、解毒生肌的功效。乳没膏外敷治疗脓疱疮可抗菌消炎，减轻局部瘙痒，促进疮面的吸收而治愈，且愈合不留疤痕，复发病例再次用药仍有效。本疗法药源充足，药费低廉，无副作用，值得推荐给同行在临床上使用。

## 温阳法治愈咽部溃疡 1 例

山东省淄博市淄川区中医院(255100)

韩　军

王某某，男，30 岁，2000 年 3 月 8 日初诊。患者 1 周前突发咽部溃疡，吞咽食物时疼痛，曾服维生素 C、维生素 $B_2$、华素片等，疗效不显，再服栀子清火丸、知柏地黄丸亦无效，且疼痛加重。症见：咽痛，吞咽不利，口干喜热饮，纳可，大便不爽稀薄，每日 1～2 次，小便正常，舌质淡胖边有齿痕、苔薄白，脉濡缓。查：左侧咽后壁见一花生粒大小溃疡，其周围不红，扁桃体不大。患者素体脾弱，每以立春后大便即薄，立夏后自愈。综观脉证，四诊合参，为脾肾阳虚，阴寒格阳，浮阳上越，痹于咽喉。治以温阳健脾，引火归原。处方：熟附子 6g，肉桂 6g，党参 10g，生黄芪 15g，白术 12g，陈皮 10g，生甘草 6g，金银花 10g，连翘 10g，射干 6g，僵蚕 10g，半夏 10g，薄荷(后下)6g，3 剂，水煎服。3 月 11 日复诊：自述咽痛消失，仅觉吞咽不利，大便成形，每日 1 次。查：咽后壁溃疡面明显缩小，如绿豆大小，其周围充血明显。原方继服 2 剂，溃疡愈合。

按：咽痛之疾，临床常见火热实证及肝肾阴虚、虚火上炎之证，但也有虚寒证存在，正如晚清孟河医家马培之在《医略存真·咽喉篇》中所云："又有虚寒下伏，隔阳于上，咽痛微肿，色淡不红，痰涎壅塞，舌白滑润，肢冷脉沉或寸浮尺弱，为阴毒喉痹，非姜、附、二陈不能开其寒痹，若用凉药，入口即毙。"本例患者虽年轻，然素体脾胃虚弱，时逢木旺克土之候，又妄用栀子、黄柏等苦寒重剂，损伤脾阳，殃及于肾，脾肾阳虚，阴寒内盛，格阳于外，致浮阳上越，故以熟附子、肉桂为君，温阳散寒、引火归原，以党参、黄芪、白术、陈皮、甘草为臣，益气健脾，其中黄芪生用，取其益气托毒收敛，甘草生用以解阴毒。咽喉之疾病位在上焦，吴鞠通云：治上焦如羽，非轻不举，故配以金银花、连翘、薄荷轻清宣散之药直达病所，以射干、僵蚕、半夏疏解利咽，全方共奏温阳健脾、宣散利咽之功。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net