

诊。主诉咽喉肿痛 2 周。患者于 2 周前因外感而发热恶寒,体温 38.7℃,伴见咽喉肿痛,咳嗽痰少。于他处诊为“急性化脓性扁桃体炎”给予静脉滴注青霉素及外用西瓜霜喷咽治疗。就诊时发热退,但仍咽喉肿痛不解,饮食下咽不利,偶有干咳无痰,舌边尖红苔白厚,脉滑数。查咽部充血,扁桃体Ⅲ度肿大,无脓性分泌物附着。辨证为:痰热蕴结,搏于咽喉。治以清热解毒,化痰利咽。药用:金银花 15g,连翘 15g,牛蒡子 10g,甘草 5g,桔梗 6g,射干 8g,马勃 10g,黄芩 10g,薄荷 5g(后下),杏仁 6g。并停用其它药品。4 剂后,咳嗽略减,但咽部肿痛如前,询其有平素常感咽部不利。遂于前方加入穿山甲 9g,再服 3 剂,咽痛明显好转,查扁桃体Ⅰ度肿大。继服 4 剂,诸症消失。

《医学衷中参西录》云:“穿山甲,味淡性平,气腥而窜,其走窜之性,无微不至,故能宣通脏腑,贯彻经络,透达关窍,凡血凝血聚为病,皆能开之,以治疗疽,放胆用之,立见功效……疼痛麻痹,二便闭塞诸证,用药治不效者,皆可加山甲作向导。”咽喉肿痛一证多为外邪所致,邪热蕴于咽喉,气血壅滞,故而肿痛,又挟病久入络,驱邪不易,故单用清热解毒之品不易取效,故加用穿山甲取其走窜之性而能达活血散结、解毒败毒之功。药证相合,疗效显著。

穿山甲可消痈散肿

江苏省仪征市中医院(211400)

孙 浩

穿山甲为鲛鲤科动物鲛鲤的鳞甲。味咸,性凉,经炒、炮加工后,性平。功能“除痰涎,通经脉,下乳汁,消痈肿,排脓血……”。笔者常用本品治疗妇女急性乳腺炎、附件囊肿,其效甚著。现举例如下。

1 急性乳腺炎

王某,26 岁。产后半月,左乳泌汁不畅,婴儿吮吸困难,哭闹不安,乃易右乳哺之,久之左乳结块,红肿热痛,全身不适。证属乳汁蓄结,与血相搏,蕴积生热,而成乳痈。亟当清热散结,活血消痈,以免穿溃之虞。药用:炮穿山甲片(先煎)15g,王不留行 10g,蒲公英 10g,金银花 10g,连翘 10g,牡丹皮 10g,赤芍 10g,甘草节 5g,3 剂。并嘱用吸奶器频频吸奶,促其下乳。药后左乳红肿已消大半,结块明显缩小,挤压之有乳汁渗出。原方再服 3 剂,红肿全消,泌乳正常。穿山甲与王不留行,既能活血消痈,又可通经行乳,用于初产妇乳汁郁滞,血热互结之乳痈,最为对症。

2 附件囊肿

李某,38 岁。主诉:近半年多来,月事不调,或迟或

速,行则 7~10 天始净,量时多时少,色深红,伴有豆大血块。经期少腹两侧胀痛,经后即已。曾在某医院检查,诊为附件囊肿。经抗炎治疗 1 月后复查,囊肿未见缩小。B 超检查附件区:左侧 56mm×53mm×59mm 囊状液性暗区,内见增强小光点;左侧见 40mm×30mm×33mm 囊状液性暗区,壁光滑,提示双附件囊性包块。附件囊肿,按其临床表现结合 B 超检查所示,当属月经不调及“癥瘕”之证。盖癥者,腹中癥块也;瘕者,水停不散,遇寒积聚而成也(《外台秘要》),治当活血行水,勿谓经期长而畏用通法。药用:炮穿山甲 15g,三棱 10g,莪术 10g,全当归 9g,川芎 5g,赤芍 10g,益母草 10g,青皮 5g,生黄芪皮 10g。本方连服 1 周无不适,乃陆续守方服至 30 剂,经 B 超复查附件区双侧囊肿明显缩小,左侧缩小较多。中途去生黄芪皮加党参、黄芪各 15g,以益气行瘀。前后共服药 63 剂,B 超再查附件,两侧囊状液性暗区全部消失,月经亦趋正常。

穿山甲治蛲虫有效验

山西省沁水县人民医院(048200)

殷 全 中

笔者用穿山甲治蛲虫方法为病友所授。即用炮穿山甲、槟榔、五加皮各 9g,焙干研末,晚上一次吞服。笔者用该方视患者年龄和体质,各用 6~10g 不等,治疗 14 例蛲虫病皆获佳效。后经易方验证,方中若去穿山甲则不效,若穿山甲单味研末冲服,疗效亦佳。

今治蛲虫病,功在其性味与归经。肝胃热郁则疏泄不利,瘀滞阻络,使肠道成为蛲虫生衍的适地。穿山甲通经活络,清泻肝胃之热,咸或直接作用于虫体,化痞积驱虫,使蛲虫失去生存之宜,不得繁殖而愈。

穿山甲外治顽固性甲状腺肿大、结节

山西省浑源县计划生育服务站(037400)

李 春 有

山西省浑源县中医院

李 春 贵

近年来,笔者以穿山甲外用治疗单纯性甲状腺肿大、结节,疗效显著。

方法:穿山甲研末,每次 10g,米酒为糊,采用药物离子导入治疗机局部导入,每日 1 次,每次 50 分钟,20 天为 1 个疗程。疗程间休息 20~30 天,平均 2~3 个疗程即可治愈。

穿山甲,咸,微寒,性善走窜,“凡血凝血聚为病皆可开之”,故长于散结软坚,消症化痞。单纯性甲状腺肿大,内服药物常易出现并发症,尤其发展为结节,更不