

专

题

笔

谈

穿山甲粉吞服治疗震颤麻痹

浙江省德清县人民医院中医科(303216)

全 德 全

笔者在临床上用穿山甲粉吞服治疗震颤麻痹,取得一定的疗效,现举例如下。

毛某,男,75岁。1986年开始出现步履不稳,肢体略有抖动,活动欠利,头晕乏力,神经内科诊断为“帕金森病”,一直服西药治疗,但病情不稳定。至1990年2月,病情发展较快,逐渐出现上下嘴唇抖动不停、吞咽困难,虽经住院治疗病情有所好转,但上下嘴唇抖动一直没有停止,饮食比较困难,消瘦乏力,舌质紫,脉细涩。改服中药治疗,采用炙穿山甲片研粉吞服,每日2次,每次6g,黄酒送服,连服1个月后,上下嘴唇、面部抖动缓解、间歇时间延长,继续服上药3个月后,上下嘴唇抖动停止,饮食自理,随访2年未见复发。

本病病机为筋脉失养、肝风内动。《本草从新》对穿山甲功能概括为善窜、专能行散、通经络、达病所。根据治风先治血、血行风自灭的理论,采用活血通络的方法,用炙穿山甲片研粉黄酒送服治疗震颤麻痹,取其通经透络之效,达到满意的治疗效果。

穿山甲治疗白细胞减少症

福建省连江县医院(350500)

郑 敏

笔者20世纪70年代初曾师从福建省名老中医孙宜尧老先生,先生以黄芪浓煎送服穿山甲粉治疗白细胞减少症,疗效甚佳。其后笔者每遇白细胞减少症患者辄用之。如治刘某某,男,26岁,于1992年8月2日就诊。自诉近3年来常感头晕,疲乏,稍作轻微活动即心悸、汗出、眼花目眩,且日常极易感冒。检查:白细胞 $2.2 \times 10^9/L$,虽经中西医治疗,疗效欠佳。望其面色晄白少神,印堂晦暗。纳呆便溏,脉细弱无力,舌淡苔薄白。显系气虚血少,气血瘀滞,脾胃虚弱。处方:炮穿山甲研粉4.5g,另以黄芪20g、当归6g、熟地黄10g、茯苓10g、怀山药10g、砂仁6g、炙甘草3g,浓煎,送服穿山甲粉,1周后,白细胞升至 $4.1 \times 10^9/L$ 。效不更方,加减续服1个月,白细胞升至 $4.9 \times 10^9/L$ 。自感神清气朗,

诸症均减。嘱其每日以黄芪30g浓煎,送服炮穿山甲粉4.5g,常服不辍。1年后复诊,自云服药后白细胞一直保持在正常范围,且年内虽有流感流行,亦未见感冒。

现代医学认为,黄芪具有增强免疫功能的功效。而气血虚弱往往可致血流凝涩。穿山甲“性专行散,能通经络,有活血之功。”用之益气活血而生血,有补气而不留邪,行瘀而不伤正之功,可收相得益彰之妙。唯穿山甲须以细沙炒透发泡,研细末送服为佳,若入煎剂,其效大逊。且不宜油炸穿山甲片入药,其效亦差。

穿山甲治胸痹、降血脂

河北省保定市第一中医院(071000)

范 新 发

穿山甲具有抗栓、降血脂的作用。古人用以活血通经、下乳、消肿治疗经闭、乳汁不下等。笔者临床上治疗冠心病心绞痛、高脂血症取得了较好的效果。

穿山甲既有促进血凝的作用,又有溶栓功能。笔者用单味穿山甲粉冲服治疗冠心病心肌缺血、心绞痛,心电图改善率为68.6%。对体外血栓检测,血栓长度、湿重、干重3项指标均超过正常值者60例进行治疗。穿山甲治疗组30例用炙穿山甲粉,每次1g,日服2次;西药对照组30例用肠溶阿司匹林片,每日25mg,均服30天。穿山甲治疗组3项指标均降至正常者22例,1~2项指标降至正常5例,无效3例。西药对照组3项指标均降至正常14例,1~2项指标降至正常10例,无效6例。两组差异有显著性($P < 0.05$)。

用穿山甲粉治疗高脂血症,每次1g,每天3次,温开水冲服(可加用食醋10ml,有胃病者除外)。共观察高脂血症患者62例,服药2个月后,复查血脂,作自身对照,结果,降胆固醇有效率为74%;降甘油三酯有效率为56.5%;升高密度脂蛋白有效率为50.8%。

穿山甲善治咽喉肿痛

北京市房山区中医院(102400)

张 新 荣

笔者近几年在辨证论治的基础上,加用穿山甲治疗咽喉肿痛,每每获效。现举例介绍如下。

患者赵某某,女,34岁。于1995年6月21日来

诊。主诉咽喉肿痛 2 周。患者于 2 周前因外感而发热恶寒,体温 38.7℃,伴见咽喉肿痛,咳嗽痰少。于他处诊为“急性化脓性扁桃体炎”给予静脉滴注青霉素及外用西瓜霜喷咽治疗。就诊时发热退,但仍咽喉肿痛不解,饮食下咽不利,偶有干咳无痰,舌边尖红苔白厚,脉滑数。查咽部充血,扁桃体Ⅲ度肿大,无脓性分泌物附着。辨证为:痰热蕴结,搏于咽喉。治以清热解毒,化痰利咽。药用:金银花 15g,连翘 15g,牛蒡子 10g,甘草 5g,桔梗 6g,射干 8g,马勃 10g,黄芩 10g,薄荷 5g(后下),杏仁 6g。并停用其它药品。4 剂后,咳嗽略减,但咽部肿痛如前,询其有平素常感咽部不利。遂于前方加入穿山甲 9g,再服 3 剂,咽痛明显好转,查扁桃体Ⅰ度肿大。继服 4 剂,诸症消失。

《医学衷中参西录》云:“穿山甲,味淡性平,气腥而窜,其走窜之性,无微不至,故能宣通脏腑,贯彻经络,透达关窍,凡血凝血聚为病,皆能开之,以治疗疽,放胆用之,立见功效……疼痛麻痹,二便闭塞诸证,用药治不效者,皆可加山甲作向导。”咽喉肿痛一证多为外邪所致,邪热蕴于咽喉,气血壅滞,故而肿痛,又挟病久入络,驱邪不易,故单用清热解毒之品不易取效,故加用穿山甲取其走窜之性而能达活血散结、解毒败毒之功。药证相合,疗效显著。

穿山甲可消痛散肿

江苏省仪征市中医院(211400)

孙 浩

穿山甲为鲛鲤科动物鲛鲤的鳞甲。味咸,性凉,经炒、炮加工后,性平。功能“除痰涎,通经脉,下乳汁,消痈肿,排脓血……”。笔者常用本品治疗妇女急性乳腺炎、附件囊肿,其效甚著。现举例如下。

1 急性乳腺炎

王某,26 岁。产后半月,左乳泌汁不畅,婴儿吮吸困难,哭闹不安,乃易右乳哺之,久之左乳结块,红肿热痛,全身不适。证属乳汁蓄结,与血相搏,蕴积生热,而成乳痈。亟当清热散结,活血消痈,以免穿溃之虞。药用:炮穿山甲片(先煎)15g,王不留行 10g,蒲公英 10g,金银花 10g,连翘 10g,牡丹皮 10g,赤芍 10g,甘草节 5g,3 剂。并嘱用吸奶器频频吸奶,促其下乳。药后左乳红肿已消大半,结块明显缩小,挤压之有乳汁渗出。原方再服 3 剂,红肿全消,泌乳正常。穿山甲与王不留行,既能活血消痈,又可通经行乳,用于初产妇乳汁郁滞,血热互结之乳痈,最为对症。

2 附件囊肿

李某,38 岁。主诉:近半年多来,月事不调,或迟或

速,行则 7~10 天始净,量时多时少,色深红,伴有豆大血块。经期少腹两侧胀痛,经后即已。曾在某医院检查,诊为附件囊肿。经抗炎治疗 1 月后复查,囊肿未见缩小。B 超检查附件区:左侧 56mm×53mm×59mm 囊状液性暗区,内见增强小光点;左侧见 40mm×30mm×33mm 囊状液性暗区,壁光滑,提示双附件囊性包块。附件囊肿,按其临床表现结合 B 超检查所示,当属月经不调及“癥瘕”之证。盖癥者,腹中癥块也;瘕者,水停不散,遇寒积聚而成也(《外台秘要》),治当活血行水,勿谓经期长而畏用通法。药用:炮穿山甲 15g,三棱 10g,莪术 10g,全当归 9g,川芎 5g,赤芍 10g,益母草 10g,青皮 5g,生黄芪皮 10g。本方连服 1 周无不适,乃陆续守方服至 30 剂,经 B 超复查附件区双侧囊肿明显缩小,左侧缩小较多。中途去生黄芪皮加党参、黄芪各 15g,以益气行瘀。前后共服药 63 剂,B 超再查附件,两侧囊状液性暗区全部消失,月经亦趋正常。

穿山甲治蛲虫有效验

山西省沁水县人民医院(048200)

殷 全 中

笔者用穿山甲治蛲虫方法为病友所授。即用炮穿山甲、槟榔、五加皮各 9g,焙干研末,晚上一次吞服。笔者用该方视患者年龄和体质,各用 6~10g 不等,治疗 14 例蛲虫病皆获佳效。后经易方验证,方中若去穿山甲则不效,若穿山甲单味研末冲服,疗效亦佳。

今治蛲虫病,功在其性味与归经。肝胃热郁则疏泄不利,瘀滞阻络,使肠道成为蛲虫生衍的适地。穿山甲通经活络,清泻肝胃之热,咸或直接作用于虫体,化痞积驱虫,使蛲虫失去生存之宜,不得繁殖而愈。

穿山甲外治顽固性甲状腺肿大、结节

山西省浑源县计划生育服务站(037400)

李 春 有

山西省浑源县中医院

李 春 贵

近年来,笔者以穿山甲外用治疗单纯性甲状腺肿大、结节,疗效显著。

方法:穿山甲研末,每次 10g,米酒为糊,采用药物离子导入治疗机局部导入,每日 1 次,每次 50 分钟,20 天为 1 个疗程。疗程间休息 20~30 天,平均 2~3 个疗程即可治愈。

穿山甲,咸,微寒,性善走窜,“凡血凝血聚为病皆可开之”,故长于散结软坚,消症化痞。单纯性甲状腺肿大,内服药物常易出现并发症,尤其发展为结节,更不