

诊。主诉咽喉肿痛 2 周。患者于 2 周前因外感而发热恶寒,体温 38.7℃,伴见咽喉肿痛,咳嗽痰少。于他处诊为“急性化脓性扁桃体炎”给予静脉滴注青霉素及外用西瓜霜喷咽治疗。就诊时发热退,但仍咽喉肿痛不解,饮食下咽不利,偶有干咳无痰,舌边尖红苔白厚,脉滑数。查咽部充血,扁桃体Ⅲ度肿大,无脓性分泌物附着。辨证为:痰热蕴结,搏于咽喉。治以清热解毒,化痰利咽。药用:金银花 15g,连翘 15g,牛蒡子 10g,甘草 5g,桔梗 6g,射干 8g,马勃 10g,黄芩 10g,薄荷 5g(后下),杏仁 6g。并停用其它药品。4 剂后,咳嗽略减,但咽部肿痛如前,询其有平素常感咽部不利。遂于前方加入穿山甲 9g,再服 3 剂,咽痛明显好转,查扁桃体Ⅰ度肿大。继服 4 剂,诸症消失。

《医学衷中参西录》云:“穿山甲,味淡性平,气腥而窜,其走窜之性,无微不至,故能宣通脏腑,贯彻经络,透达关窍,凡血凝血聚为病,皆能开之,以治疗疽,放胆用之,立见功效……疼痛麻痹,二便闭塞诸证,用药治不效者,皆可加山甲作向导。”咽喉肿痛一证多为外邪所致,邪热蕴于咽喉,气血壅滞,故而肿痛,又挟病久入络,驱邪不易,故单用清热解毒之品不易取效,故加用穿山甲取其走窜之性而能达活血散结、解毒败毒之功。药证相合,疗效显著。

穿山甲可消痛散肿

江苏省仪征市中医院(211400)

孙 浩

穿山甲为鲛鲤科动物鲛鲤的鳞甲。味咸,性凉,经炒、炮加工后,性平。功能“除痰涎,通经脉,下乳汁,消痈肿,排脓血……”。笔者常用本品治疗妇女急性乳腺炎、附件囊肿,其效甚著。现举例如下。

1 急性乳腺炎

王某,26 岁。产后半月,左乳泌汁不畅,婴儿吮吸困难,哭闹不安,乃易右乳哺之,久之左乳结块,红肿热痛,全身不适。证属乳汁蓄结,与血相搏,蕴积生热,而成乳痈。亟当清热散结,活血消痈,以免穿溃之虞。药用:炮穿山甲片(先煎)15g,王不留行 10g,蒲公英 10g,金银花 10g,连翘 10g,牡丹皮 10g,赤芍 10g,甘草节 5g,3 剂。并嘱用吸奶器频频吸奶,促其下乳。药后左乳红肿已消大半,结块明显缩小,挤压之有乳汁渗出。原方再服 3 剂,红肿全消,泌乳正常。穿山甲与王不留行,既能活血消痈,又可通经行乳,用于初产妇乳汁郁滞,血热互结之乳痈,最为对症。

2 附件囊肿

陈某,38 岁。主诉:近半年多来,月事不调,或迟或

速,行则 7~10 天始净,量时多时少,色深红,伴有豆大血块。经期少腹两侧胀痛,经后即已。曾在某医院检查,诊为附件囊肿。经抗炎治疗 1 月后复查,囊肿未见缩小。B 超检查附件区:左侧 56mm×53mm×59mm 囊状液性暗区,内见增强小光点;左侧见 40mm×30mm×33mm 囊状液性暗区,壁光滑,提示双附件囊性包块。附件囊肿,按其临床表现结合 B 超检查所示,当属月经不调及“癥瘕”之证。盖癥者,腹中癥块也;瘕者,水停不散,遇寒积聚而成也(《外台秘要》),治当活血行水,勿谓经期长而畏用通法。药用:炮穿山甲 15g,三棱 10g,莪术 10g,全当归 9g,川芎 5g,赤芍 10g,益母草 10g,青皮 5g,生黄芪皮 10g。本方连服 1 周无不适,乃陆续守方服至 30 剂,经 B 超复查附件区双侧囊肿明显缩小,左侧缩小较多。中途去生黄芪皮加党参、黄芪各 15g,以益气行瘀。前后共服药 63 剂,B 超再查附件,两侧囊状液性暗区全部消失,月经亦趋正常。

穿山甲治蛲虫有效验

山西省沁水县人民医院(048200)

殷 全 中

笔者用穿山甲治蛲虫方法为病友所授。即用炮穿山甲、槟榔、五加皮各 9g,焙干研末,晚上一次吞服。笔者用该方视患者年龄和体质,各用 6~10g 不等,治疗 14 例蛲虫病皆获佳效。后经易方验证,方中若去穿山甲则不效,若穿山甲单味研末冲服,疗效亦佳。

今治蛲虫病,功在其性味与归经。肝胃热郁则疏泄不利,瘀滞阻络,使肠道成为蛲虫生衍的适地。穿山甲通经活络,清泻肝胃之热,咸或直接作用于虫体,化疳积驱虫,使蛲虫失去生存之宜,不得繁殖而愈。

穿山甲外治顽固性甲状腺肿大、结节

山西省浑源县计划生育服务站(037400)

李 春 有

山西省浑源县中医院

李 春 贵

近年来,笔者以穿山甲外用治疗单纯性甲状腺肿大、结节,疗效显著。

方法:穿山甲研末,每次 10g,米酒为糊,采用药物离子导入治疗机局部导入,每日 1 次,每次 50 分钟,20 天为 1 个疗程。疗程间休息 20~30 天,平均 2~3 个疗程即可治愈。

穿山甲,咸,微寒,性善走窜,“凡血凝血聚为病皆可开之”,故长于散结软坚,消症化痞。单纯性甲状腺肿大,内服药物常易出现并发症,尤其发展为结节,更不

易消散。采用本法局部导入,无长期服药之苦,患部药物离子浓度较高、作用时间长,故能取效。

穿山甲治疗尿血

河北省邯郸市中心医院(056001)

田 霄 燕

河北省邯郸市丛台区田氏中医门诊

田 树 新

先父田成庆教授遇尿血患者时,喜用穿山甲治之,每获良效。用法是将炮穿山甲研极细末,每次服1.5~1.8g,白开水送服,日1~2次。穿山甲活血消瘀、通经下乳、消肿排脓,常用于症瘕积聚、乳汁不下、痈疽疮肿等症,何能止血?遂问之。答曰:前人称尿血痛者为淋,不痛者为尿血。然究其病因多由下焦热盛、热伤血络、涩滞不通所致。穿山甲《本草再新》谓之能解热败毒,《本草纲目》谓之能排脓血,味咸入肾,性寒去热,热解毒消、瘀血尽出,小便畅通,则尿血不止而止也。然尿血亦有脾肾虚者,则加服补脾固肾之药,不可不知耳。

我们曾用先父之法愈尿血者数十例。如治一张姓患者,男,42岁。1997年因尿血经某医院检查,诊为肾小球肾炎,尿检红细胞(+++),用西医消炎止血效果不显,前来求诊。临床症见,小便不利,色如浓茶,伴有血块。舌质红苔黄腻,脉弦数,遂嘱其服炮穿山甲粉。服2次后,小便血块大减,尿色亦呈浅黄,又服4次后,诸症全消,尿检正常。

穿山甲治疗前列腺肥大、肾盂结石

山东省新泰市中医医院(271200)

王 长 海

自1996年以来,笔者在应证方药中加入穿山甲治疗前列腺肥大、石淋,收效颇佳,兹举例介绍如下。

例1:刘某某,男,62岁。排尿困难2年余,加重半月就诊。患者2年前始感排尿困难,以夜间为重,尿频、无尿痛,当时就诊于某医院,诊为前列腺肥大,服用己烯雌酚、氟哌酸后症状减轻,因惧怕产生副作用,遂自行停药,改用中药治疗,初服效佳,后来症状如故,于1996年8月27日来诊。刻下病人排尿困难,伴心烦失眠,腰酸乏力,头晕耳鸣等症,舌质淡红、苔薄黄,脉沉细数,属肾阴不足之证。纵观前医用药,六味地黄丸加利尿之剂也,可谓药证相符,细思之,早年随师进修时,见其善用穿山甲治疗本病,处方如下:熟地黄15g,山药12g,泽泻10g,茯苓10g,山茱萸12g,牡丹皮10g,车前子(包)15g,炮穿山甲10g,皂角刺10g,木通10g,

栀子10g,水煎服,每日1剂,分2次早晚服。服完3剂后,小便已能成流,头不晕,心不烦,它症减轻。效不更方,共服用46剂,排尿已正常。1年后随访未复发。

例2:陈某,女。自述左肾结石1年半,曾多方治疗,共服用中药百余剂未效。现患者时常感腰部酸痛,小便急频,多在劳累时发作,纳食正常,舌淡红、苔薄白,脉弦缓,B超示左肾肾盂结石约0.6cm×0.5cm,中医诊为石淋。患者要求给予简便之方,长期服用,以图缓治。于是给予炮穿山甲10g,王不留行20g,水煎代茶饮,每日1剂,并嘱其每天做跳跃运动20次,同时自我叩击左肾区。服用5天后感腰腹阵痛,遂来诊,B超复查:左肾回声正常,膀胱有一活动之强回声团,于第2天排出体外。

穿山甲性味咸、微寒,入肝、胃经,性善走窜,能活血散瘀,消症积利九窍。《本草纲目》云其能“通经脉、下乳汁、消痈肿、排脓血、通窍杀虫。”临床上治疗前列腺肥大用穿山甲取其可直达病所,具有通窍、消症、散瘀之功用,以达通利水道之目的。若与皂角刺同用则效更著。用穿山甲治石淋者,取其性善走窜之特性,以起“顽石”之根蒂,若能同时配用王不留行以通利滑窍,则取效更速。

穿山甲疗痔疮有良效

锦州石油化工公司医院(121000)

马 骏

穿山甲,味咸,性微寒、善走窜,入肝、胃经。《别录》云:“主五邪惊啼悲伤……疗蚁瘻”。《药性论》:“治山瘡、恶疮。治小儿惊邪,……痔漏恶疮疥癬。”笔者应用以穿山甲为主药的散剂口服(穿山甲、黄连、大黄各等份,每次3g,温开水送服),治疗痔疮取得了良好的疗效。现举例如下。

徐某,男,33岁。患痔疮15年,遇冷及劳累即发或症状加重。症见:肛门有物脱出,疼痛,甚则流脓、流血,平素亦时有便鲜血,影响坐立及行走。经口服上述散剂4~5日后,疼痛及流脓、流血症状明显缓解,服药2周后症状基本消失,肛门外无脱出物。继续巩固治疗2周,随访1年未复发。

痔疮病位在大肠经,多因湿热蕴结或寒湿凝滞或气虚血滞而致局部络脉瘀阻。胃与大肠相表里,且穿山甲入胃经,故用穿山甲取其善走窜、达病所及祛瘀止痛之功。实证佐以解毒利湿化瘀之品,虚证佐以补气活血之品均可获良效。内服散剂较外用药物疗法(如熏洗、肛门塞药、涂药)具有方便、疗效好、方法可靠等优点。