

500g,香油2500g。制法:先将香油煮沸,搅入马钱子、乳香、没药细末,熬至滴水成珠状,油凉后再搅入章丹,微火熬至黑色膏状,再搅入接骨散即可。然后用白布10cm²左右,抹上膏药,每张10g备用。本药为外用膏剂,将膏药加温贴髌关节患处,隔7~10日换药1次,痊愈为止。用药后出现皮疹可暂停用药,待皮疹消失后再用。

3 治疗结果

本组24例儿童股骨头坏死患者,均采用内服接骨散,外贴伤科活血膏治愈。痊愈标准是症状消失,行走正常,双下肢长度相称,髌外展、内旋试验阴性。本组病例治愈平均时间3个月~1年。1年后家访未见复发,儿童发育正常。

4 体会

接骨散方中以马钱子为主,其通经络,治痈疽肿毒、瘰癧恶疮;麻黄通九窍,调血脉,发汗解肌;骨碎补治筋骨损伤,破瘀血;乳香活血理气,生肌止痛;没药伤科要药,破血通经;三七参、琥珀止血行瘀,消肿定痛,安神定志;牛膝、川续断、杜仲补肝肾,强筋骨,活血通经,接骨续筋,治关节酸痛;土鳖虫、自然铜接骨续筋、散瘀止痛、行血通经;酒通利血脉。伤科活血膏方中马钱子、乳香、没药、接骨散,诸药功能与其在接骨散方中相同。章丹、香油解热拔毒、祛瘀生新,并为制膏药的主要原料。

本文采用内服接骨散,外贴伤科活血膏治疗儿童股骨头无菌性坏死或缺血性坏死,确有消肿止痛、舒经通络、活血理气、调经脉、祛瘀生新、强筋健骨,使死骨吸收,新骨生长的作用。

乳没膏外敷治疗脓疮疮 102 例

山东省嘉祥县妇幼保健院(272400)

任 仰 成

脓疮疮(黄水疮)是由葡萄球菌或链球菌感染引起的一种化脓性皮肤病,夏秋季节常发,儿童中多见,传染性强。自1995~1999年笔者自拟乳没膏外敷治疗脓疮疮102例,疗效显著,现报告如下。

1 临床资料

102例均为门诊治疗的脓疮疮病例。男60例,女42例;年龄1~5岁37例,6~15岁50例,15岁以上15例;病程1~15天,平均8天。发病部位以面部、四肢多见,皮损数目多达10处,少则1~3处。疮面周围充血,溢出稀薄淡黄色分泌物及薄厚不等淡黄色结痂。

2 治疗方法

药物配制:乳没膏是由乳香、没药、猪油(熬熟去渣)按1:1:4的比例熬制而成。将3药按比例称好,先将猪油熬沸,将乳香、没药轧碎慢慢放入沸油中,使二药完全融化,然后自然冷却,乳没膏即制成。涂药前可先用3%双氧水清洗疮面,以除去脓痂为度,然后将配制药物涂于疮面上一层,无需包扎,每日早晚各1次,渗液多者可用4次,3天为1个疗程。在治疗期间无需配合其它疗法。

3 治疗结果

疗效标准:治愈:脓痂消失,皮损恢复常态;好转:脓痂及渗液减轻50%以上;无效:脓痂及渗液存在。结果1~3天治愈14

例,占13.73%;4~6天治愈50例,占49.02%;7~9天治愈35例,占34.31%;未治愈3例,占2.94%;总有效率为97.06%。

4 病案举例

王某某,女,18岁,学生。头面潮红,出现丘疹水疱、脓疱,逐渐糜烂、结黄色痂,并逐渐增多。已病休1周,患者要求在本门诊治疗,经外敷乳没膏5天,症状完全消失,返校学习。

5 讨论

本法采用3%的双氧水,清创局部,清除脓液,有利于药物发挥作用。《药性歌括四百味》中指出:“乳香辛苦,疗诸恶疮,生肌止痛,心腹尤良”。“没药苦平,治疮止痛,跌打损伤,破血通用”。现代药理研究证实,乳香、没药主要含树脂、树胶、挥发油,有灭菌消炎、防腐消肿、止痛收敛的作用,使已溃破的表面不再受炎性渗出物的侵袭和腐蚀。猪油有软化痂皮、解毒生肌的功效。乳没膏外敷治疗脓疮疮可抗菌消炎,减轻局部瘙痒,促进疮面的吸收而治愈,且愈合不留疤痕,复发病例再次用药仍有效。本疗法药源充足,药费低廉,无副作用,值得推荐给同行在临床上使用。

温阳法治愈咽部溃疡 1 例

山东省淄博市淄川区中医院(255100)

韩 军

王某某,男,30岁,2000年3月8日初诊。患者1周前突发咽部溃疡,吞咽食物时疼痛,曾服维生素C、维生素B₂、华素片等,疗效不显,再服栀子清火丸、知柏地黄丸亦无效,且疼痛加重。症见:咽痛,吞咽不利,口干喜热饮,纳可,大便不爽稀薄,每日1~2次,小便正常,舌质淡胖边有齿痕、苔薄白,脉濡缓。查:左侧咽后壁见一花生粒大小溃疡,其周围不红,扁桃体不大。患者素体脾弱,每以立春后大便即薄,立夏后自愈。综观脉证,四诊合参,为脾肾阳虚,阴寒格阳,浮阳上越,痹于咽喉。治以温阳健脾,引火归原。处方:熟附子6g,肉桂6g,党参10g,生黄芪15g,白术12g,陈皮10g,生甘草6g,金银花10g,连翘10g,射干6g,僵蚕10g,半夏10g,薄荷(后下)6g,3剂,水煎服。3月11日复诊:自述咽痛消失,仅觉吞咽不利,大便成形,每日1次。查:咽后壁溃疡面明显缩小,如绿豆大小,其周围充血明显。原方继服2剂,溃疡愈合。

按:咽痛之疾,临床常见火热实证及肝肾阴虚、虚火上炎之证,但也有虚寒证存在,正如晚清孟河医家马培之在《医略存真·咽喉篇》中所云:“又有虚寒下伏,隔阳于上,咽痛微肿,色淡不红,痰涎壅塞,舌白滑润,肢冷脉沉或寸浮尺弱,为阴毒喉痹,非姜、附、二陈不能开其寒痹,若用凉药,入口即毙。”本例患者虽年轻,然素体脾胃虚弱,时逢木旺克土之候,又妄用栀子、黄柏等苦寒重剂,损伤脾阳,殃及于肾,脾肾阳虚,阴寒内盛,格阳于外,致浮阳上越,故以熟附子、肉桂为君,温阳散寒、引火归原,以党参、黄芪、白术、陈皮、甘草为臣,益气健脾,其中黄芪生用,取其益气托毒收敛,甘草生用以解解毒。咽喉之疾病位在上焦,吴鞠通云:治上焦如羽,非轻不举,故配以金银花、连翘、薄荷轻清宣散之药直达病所,以射干、僵蚕、半夏疏解利咽,全方共奏温阳健脾、宣散利咽之功。