

产 后 病 治 验 三 则

第二军医大学长海医院 刘 福 春

笔者以清热化瘀之剂，治疗产后某些痼疾顽症，收效颇丰，兹举三案如下：

一、胎盘残留，血不归经

李××，28岁，病例号273848。于1983年10月4日行人工流产，术后三天发烧，经急诊处理热退，但腹痛、阴道出血不止，经妇产科用抗生素、催产素、止血剂等治疗无效，于11月26日转中医门诊治疗。现出血已52天，血色污暗、有块，少腹左侧刺痛，屈腹时尤甚，伴畏冷、纳差、消瘦，头昏乏力，腰膝痠软，舌苔薄白，脉沉细无力。此前亦曾用过中药，阅其方药不外参、芪、炭类、三七粉等。此乃产后(小产)败血停瘀，血不归经，瘀久化热，耗伤阴津，阴阳俱伤。瘀为其本，虚由瘀致，故仍以祛瘀为主。处方：当归25克，炮姜6克，白芍15克，川芎6克，红藤30克，益母草15克，玫瑰花9克，月季花9克，生地10克，炒黄柏4克。五剂。

二诊(12月3日)：服药后自觉腹痛加重，出血量减少，脉象转滑。此瘀血欲动之兆，续进前方去玫瑰花、炒黄柏，加川连6克，鸡血藤15克，蜈蚣3克，四剂。

三诊(12月8日)：服药后阴道排出坚硬血块2~3个(其中一个粉白色，约核桃大小，后经病理检查为残存胎盘组织)，腹痛减轻，出血锐减，但觉少腹偶有隐痛，予上方减量续服，五剂。

四诊：出血停止，腹痛消失，改为温补脾肾方药善后。

二、宫内死血，瘀久发热

张××，30岁，住院号189731。患者系双胎妊娠，妊娠中毒症行剖腹产手术。产后20天持续发热，高热三天，少腹隐痛，恶露突然增多如崩，于1982年9月28日急诊收入本院

妇产科。妇检“宫底脐下三指，压痛明显，恶露量多，暗红色”。血白细胞总数8400/立方毫米，中性84%。经静脉滴注青霉素、催产素，于9月30日从阴道排出一个儿头大小之血块(后经病理报告已机化)，症状一度好转，但体温不降，10月3日腹痛又剧，压痛明显，宫底复升至脐下4指，体温39.6℃，急请中医会诊。其高热昼轻夜重，新产后恶露量少，其后突然增多，紫黑有块，少腹硬满拒按，伴纳差、恶心、盗汗、失眠，望之面黄肌瘦，肌肤粗糙，舌紫暗，边有瘀点，舌苔薄白，脉细数无力。此由败血内停，结于胞宫，瘀久化热，一派血瘀内阻之象。治以活血化瘀，清热养阴。处方：当归25克，炮姜6克，赤白芍各15克，生甘草6克，失笑散15克(包)，生地15克，红藤30克，川芎9克，丹参15克，月季花9克，益母草30克，川连6克，蜈蚣2条。停用抗生素、催产素。

服药三剂后又从阴道排出一个拳头大小之血块，宫底降至脐耻之间，腹部压痛消失，体温下降；五剂服完，体温正常，腹痛消失，复查血白细胞总数5200/立方毫米，中性73%。但阴道仍有少量黄色分泌物，改生汤原方续服五剂，痊愈出院。

三、异位妊娠，腹内症瘕

瞿×，25岁，门诊自带卡。1988年初自然流产一胎，1989年9月27日因停经53天、阴道出血5天，去本院妇产科检查，妇检宫体前位，正常大小，血清LH4.8ng/ml，B超示：“子宫6.2×5.0×4.7cm，轮廓清，回声均匀，宫内未见孕囊，右输卵管增粗，内径1.1cm”。10月4日阴道排出肉样物，病理报告为蜕膜组织，妇科诊为宫外孕、流产。10月23日因仍有下腹部疼痛，又B超检查报告“子宫6.3×

4.8×3.7cm大小,轮廓清,回声均匀,右卵巢3.0×2.6×2.4cm大小,内可见卵泡,其右上方可见3.2×2.9×2.8cm大小之低回声团块,与输卵管相连,提示:右输卵管妊娠、流产型”。妇科嘱病人按陈旧性宫外孕请中医治疗。此间服用过妇科自制生化糖浆及七剂中药,未见明显改善。11月29日诊:仍感右下腹胀痛,腰痠口干而臭,一般情况尚好,脉沉弦滑,舌苔薄腻、舌质暗红,口唇红、暗而干。此症系宫外孕,素禀瘀热之质,腹内症瘕乃瘀热交作而痛胀,以清热化瘀之剂。处方:当归25克,炮姜6克,川芎12克,桃仁12克,白芍15克,生地15克,红藤30克,丹参15克,香附15克,三棱、莪术各15克,川怀牛膝各15克,蜈蚣4克,七剂。

二诊(12月16日):前方七剂症减,又按原方七剂,腹痛、口臭等症状明显好转,12月9日B超检查,报告“右输卵管内径0.8cm,右卵巢上方之低回声区较前好转”。二天前感冒,咽痛。前方去炮姜,加鸭跖草30克,(另服感冒清)七剂。

三诊(1990年1月4日)右下腹隐痛、腰痠,白带增多、色黄,脉弦滑,舌苔薄腻、舌

质红,前方加生地15克,车前子15克(包),七剂。

1990年2月12日病人B超检查后喜告:已完全正常,前后用药28剂,未用其他药物。

体会:目前所见之产后腹痛出血,或因双胎妊娠、宫缩乏力,或因手术损伤继发感染,或因刮宫不净而致败血停瘀,瘀久化热,灼伤阴液,且由于反复出血,必致病人血弱气虚,阴阳不调,症状表现为虚实并见,寒热错杂。笔者在治疗时抓住恶露不净,或出血紫暗污浊,腹痛如刺,少腹硬满,或腹内症瘕等特点,采用祛瘀为主,清化并用之法。方中当归、川芎、失笑散等养血活血,祛瘀生新,如第三例则以三棱、莪术等破血之品攻其症瘕,红藤、生地、蜈蚣等清热散结。蜈蚣一味,对宫内瘀血尤有良效。笔者曾有意在方中用或不用蜈蚣一味,观察其对宫内瘀血的作用,结果证明蜈蚣对宫内血块、残留胎盘等“异物”有很好的排出作用,其临床症状依据为少腹硬满而刺痛,出血久而不止,触诊时耻骨上有明显压痛,其剂量一般为3~6克。少数病人有轻微恶心,上腹部不适感,在饭后服可减少或消除这些副作用。

· 新书出版消息 ·

中医思想方法与基本观点 王大鹏著 南开大学出版社出版

全书系统说明了中医学术的基本规律、基本观点、思想方法、研究方法、巧妙正确的临床思路。是指导性、方向性、工具性、启发性、方法性的书籍,是打开中医宝库的钥匙。欲购者可向天津中医学院王大鹏同志联系,邮政编码:300193,定价3.50元,另加邮费0.40元。

针灸临证指南 主编胡熙明 副主编宋祖慈 人民卫生出版社出版

该书汇集了全国近200位针灸专家的660篇诊疗经验,共包括常见病证120余种,涉及临床内外妇儿五官各科。全书约54万字,并附有部分插图。估计定价12.8元。预计于1991年2月出版。欲购者请速与人民卫生出版社图书综合经营部联系(地址:北京

崇文区天坛西里10号,邮政编码:100050)。

古今中药外治真传 张树生主编 中医古籍出版社出版

该书系统、全面、深入地发掘整理了古今各种中药外治方法,计50余法(细分百余法),每法下又按病列方,务求其真。富实践之经验,寓医理于其中,重应用而又启迪科研,重特色而又融会新知,内容极其丰富,有较高的实用价值,也确是一部系统反映中药外治学的专著。

该书精装,估价24元,1991年4月可面世,欲购者请向各地新华书店征订。

中医经络现代研究 胡翔龙 包景珍 马廷芳主编

本书为建国以来我国经络研究工作的总汇。是一部以现代科学技术和方法研究中医基本理论经络部分的好书。全书40余万字,共十六章,图文并茂,并附有1100多篇参考文献,可供中医院校学生、针灸临床、针麻、经络研究人员参阅。