

临

床

报

道

中药内外治疗中晚期肝癌 38 例

山东中医药大学附属医院肿瘤科(250011) 朱海洪

山东省医学科学院血液肿瘤研究室 姜国盛

自 1997 年 11 月以来,我们用中药内服和外敷治疗中晚期肝癌 38 例,疗效满意,现报告如下。

1 临床资料

按《中国常见肿瘤诊治规范——原发性肝癌》标准,71 例患者均经 B 超、CT、甲胎蛋白(AFP)及肝动脉造影确诊为肝癌且不能行手术治疗。随机将 71 例患者分为治疗组和对照组。治疗组 38 例,男性 32 例,女性 6 例;年龄 33~67 岁,平均年龄 46.5 岁;巨块型 20 例,结节型 12 例,弥漫型 6 例;肿瘤生长部位,左叶 11 例,右叶 20 例,双叶 7 例;肿瘤大小,5~10cm 28 例,>10cm 10 例;合并肝硬化者 26 例。对照组 33 例,其中男性 26 例,女性 7 例;年龄 31~60 岁,平均年龄 47.2 岁;巨块型 18 例,结节型 11 例,弥漫型 4 例;肿瘤生长部位,左叶 8 例,右叶 22 例,双叶 3 例;肿瘤大小,5~10cm 29 例,>10cm 4 例;合并肝硬化者 26 例。两组资料无显著差异($P>0.05$),具有可比性。

2 治疗及观察方法

治疗组采用中药内服和外敷的治疗方法同时配合必要的常规化疗(FAM 方案与 Fu+ADM+MMC)。中药内服自拟固肝化瘀汤,药用柴胡 12g,白术 12g,茯苓 20g,穿山甲 12g,水红花子 12g,薏苡仁 30g,半枝莲 30g,黄芪 30g,郁金 9g,砂仁 9g,白芍 15g,沙参 15g,蜂房 12g,连翘 12g,五味子 12g,鸡内金 12g,黄连 9g,干姜 6g,水煎服,每日 1 剂(分 2~3 次服),忌食辛辣、油腻;同时外敷自拟消肿止痛膏。制作方法:取血竭 15g,冰片 10g,红花 10g,乳香 12g,没药 12g,沉香末 15g,雄黄 3g 等共研细末以醋(或香油)调为糊状,外敷在剑突下至右肋下锁骨正中线处,或有肿块疼痛处,每 2 日换 1 次。对照组治疗主要以 FAM 方案为主,同时服用肌苷、维生素 C 及其它护肝药物,3 个月为 1 个疗程,3 个疗程后评定疗效。

观察指标:肝区疼痛,食欲不振和全身乏力等症状的改善情况;治疗前后患者血清白蛋白(ALB)和丙氨酸氨基转氨酶(ALT)的变化(可供统计者:治疗组 30 例,对照组 24 例);治疗后半年和 1 年生存率(可统计者:治疗组 38 例,对照组 31 例)。

3 治疗结果

3.1 两组治疗后主要症状改善比较:治疗组肝区疼痛治疗前 30 例,治疗后 8 例,有效率为 73.3%,对照组分别为 20 例、15 例,有效率为 25%;治疗组腹胀治疗前 29 例,治疗后 12 例,有效率为 58.62%,对照组分别为 19 例、16 例,有效率为 15.78%;治疗组食欲不振治疗前 27 例,治疗后 8 例,有效率为

70.37%,对照组分别为 22 例、18 例,有效率为 18.18%;治疗组全身乏力治疗前 33 例,治疗后 12 例,有效率为 63.64%。 χ^2 比较两组差异有显著性,治疗组明显为优($P<0.01$)。

3.2 两组治疗前后 ALB、ALT 结果比较:治疗组 30 例,治疗前后 ALB 值分别为 $29.05 \pm 5.61\text{g/L}$ 、 $33.59 \pm 5.61\text{g/L}$,对照组 26 例,ALB 值分别为 $29.04 \pm 6.94\text{g/L}$ 、 $30.81 \pm 6.09\text{g/L}$ 。治疗组 30 例,治疗前后 ALT 值分别为 $48.56 \pm 15.14\text{U/L}$ 、 $40.13 \pm 18.56\text{U/L}$;对照组 26 例,治疗前后分别为 $47.75 \pm 25.31\text{U/L}$ 、 $42.40 \pm 21.12\text{U/L}$ 。两项指标治疗组治疗后均有显著改善($P<0.05$),而对照组无明显变化($P>0.05$)。

3.3 两组生存率比较:治疗组 38 例,半年生存率为 60.5% (23/38),1 年生存率为 31.58% (12/38);对照组 31 例,半年生存率为 25.8% (8/31),1 年生存率为 9.7% (3/31)。两组半年、1 年生存率比较差异均有显著性($P<0.01$)。治疗组明显为优。

4 讨论

固肝化瘀汤中柴胡、郁金、砂仁疏肝理气解郁,气行则瘀自消;白芍、五味子、沙参养肝柔肝,固护肝气;黄芪、白术、薏苡仁、鸡内金、茯苓扶正固本,以利生化气血,调和阴阳;穿山甲、半枝莲、蜂房、连翘、红花以化瘀解毒散结;黄连、干姜二药取自《伤寒论》的乌梅丸中,用以清中焦之热,祛下焦之寒。上药共奏疏肝、健脾、解毒化瘀、清热止痛之功效。研究已证实,方中各药多有增强免疫细胞和免疫因子,升高血清白蛋白,降低 ALT,抑制癌细胞生长,减少癌栓的形成与肿瘤转移等作用,服用固肝消瘀汤同时,肝区外敷消肿止痛膏,方中血竭、冰片、芒硝祛邪消肿,细辛、红花、沉香、乳香、没药行气止痛,配以雄黄解毒抗癌,旨在减轻消除中晚期肝癌患者的肝区疼痛及腹胀。

中药外敷治疗小儿皮肤血管瘤 48 例

扬州大学临床医学院(225001)

周海中 钱涯邨 王馨然

孙龙安 陈晓明 吴靖珍

用自拟中草药外敷治疗小儿皮肤血管瘤,取得一定的疗效,现报道如下。

1 临床资料

患者均为门诊病例,女 40 例,男 8 例,年龄 2 个月~5 岁,根据卢佩璋小儿皮肤血管瘤分类划分,其中鲜红斑痣 27 例,蔓状血管瘤 8 例,混合型 6 例,海绵状血管瘤 7 例,部位主要在颜面部。将小儿皮肤血管瘤患者分成 3 组(A、B、C)进行研究。A 组 18 例,其中鲜红斑痣 10 例,蔓状血管瘤 3 例,混合型 3 例,海绵状血管瘤 2 例。B 组 14 例,4 类皮肤血管瘤例数分别为 8、3、2、1 例,C 组 16 例,4 类皮肤血管瘤例数分别为 9、2、1、4 例。