

证在临床上往往相兼并见,表现为肺脾气虚、心脾两虚、脾肾阳虚等。海洛因断用后,往往数瘾齐发,症状表现有虚有实,故许多学者认为五脏瘾的病机为虚实兼见、寒热错杂。但究其根本,则虚为本,实为标,寒为真,热为假。如戒断症状中的刺痛、爪甲青紫等瘀血见证,实由阳气不足,血液运行无力,瘀滞络脉,以及阳失温煦,寒透筋骨所致。治宜温心助阳,当用附桂而非芍药。又如时寒时热,非邪犯少阳,乃卫表空虚,肌腠不密,阳气时至时返,致汗出不止,肌肤湿冷,毫毛竖起如冷火鸡状,海洛因依赖在滥用期和戒断期的表现各有特点。滥用期以五脏气血阴阳亏损为主要表现,戒断初期则以气血两虚和阴阳两虚、兼见虚风风痰的严重紊乱为主要表现,随后又会呈现出五脏俱亏的真面目。

参考文献

- 1 程绍恩,夏洪生主编. 中医证候诊断治疗学. 北京:北京科学技术出版社,1993:31-151.
- 2 赵存娥,李明奎. 中医病因病机学. 北京:科学出版社,2000:105-162.
- 3 戴路明,杨良,李红,等. 海洛因依赖者血清微量元素代谢紊乱. 中国药物依赖性通报,1993,2(2):88.
- 4 陈家旭,杨维益. 中医脾虚证研究的进展. 中国中医基础医学杂志,1998,18(1):4-7.
- 5 赵永平,陶志鹏. 慢性海洛因中毒对男性性腺功能的影响. 中国药物依赖性通报,1997,6(1):6-7.
- 6 刘菊妍,周仲瑛. 肾阳虚损与阿片类药物依赖戒断症状的关系. 中国药物滥用防治杂志,1999,(1):19-20.
- 7 Dantzer R, Kelley KW. Stress and immunity: an integrated view of relationship between the brain and the immune system. Life Sci, 1989, 44(26):1995-2008.
- 8 王芳,郭晓红,杨耘,等. 海洛因与吗啡依赖恒河猴的病理组织学研究. 中国药物依赖性杂志,1999,8(2):98-102.
- 9 杨定夫,张蕾,李月梅. 220例海洛因依赖者甲襞微循环的观察. 中国药物依赖性通报,1994,3(3):170-172.
- 10 范平,郑军. 海洛因依赖者心血管功能微机检测分析. 中国药物依赖性通报,1995,4(2):109-110.
- 11 叶兰仙. 阿片依赖患者的血液流变学变化. 中国药物依赖性杂志,1998,7(4):214-215.

欣力康治疗中晚期癌症 68 例

袁一帆* 翟 范*

欣力康是由龙葵、黄芪等 10 余味中药组成的中成药,具有消热解毒、扶正益气之功能。近两年来,我们以欣力康颗粒剂治疗癌症患者 68 例,收到较好疗效。现报道如下。

1 临床资料

从服用欣力康颗粒剂(由贵阳新天药业公司生产)的门诊患者中,选取 2000 年 11 月 1~31 日 1 个月内的就诊患者 173 例,其中坚持服药两个月以上者 68 例,其中食管癌 8 例、胃癌 15 例、大肠癌 6 例、肝癌 5 例、肺癌 14 例、乳腺癌 12 例、鼻咽癌 3 例、肾癌 2 例、卵巢癌 2 例、甲状腺癌 1 例(其中手术后 45 例,曾作放疗者 8 例,曾作化疗者 5 例。)所有病例除根据已出现的明显的中晚期癌症的临床症状和体征外,皆经纤维胃镜、肠镜、B 超或 CT 并结合病理组织切片等检查确诊。

2 治疗方法

所有病例皆以欣力康颗粒剂治疗,每次 1~2 包,每日 2~3 次,温水冲服,1 个月为 1 个疗程,一般至少服用两个疗程。

3 治疗结果

3.1 用药前后症状变化比较:68 例治疗前吞咽不顺 10 例,治疗后 0 例;治疗前腹胀 26 例,治疗后 5 例;治疗前腹泻 17 例,治疗后 3 例;治疗前咳嗽气喘 18 例,治疗后 7 例;治疗前失眠 20 例,治疗后 4 例;治疗前身倦乏力 62 例,治疗后 0 例;治疗前疼痛 14 例,治疗后 1 例;治疗前发热 6 例,治疗后 2 例。

3.2 用药前后血象、体重、体质变化比较:68 例治疗前白细胞计数异常者 60 例,治疗后 3 例;治疗前红细胞计数异常者 60

例,治疗后 6 例;治疗前血小板异常者 60 例,治疗后 4 例;治疗前体重异常者 64 例,治疗后 5 例;治疗前卡氏评分异常者 68 例,治疗后 3 例。

3.3 用药前后肿瘤相关抗原及其它有关指标变化比较:68 例治疗前 CEA 抗原异常者 36 例,治疗后 1 例;治疗前 CA₅₀ 异常者 36 例,治疗后 4 例;治疗前 CA₁₂₅ 异常者 20 例,治疗后 5 例;治疗前丙氨酸氨基转移酶异常者 1 例,治疗后 0 例。

3.4 有关瘤体的变化:12 例用药后瘤体(包括淋巴结)消失 4 例、缩小 5 例,无变化或略有增大者 3 例。

3.5 毒副反应的观察:在整个用药的过程中,未见有头晕、恶心、呕吐、皮疹等药物不良反应。

4 典型病例

殷某某,男,56 岁,直肠癌术后两个月,因肛门坠胀,常有便意、体瘦、乏力、夜寐不安而来诊治。诊见其面黄体瘦、身倦乏力、下肢酸软、语声低微,自诉一昼夜如厕达 20 余次,夜不成寐,给其以欣力康为主,配合对症的中药汤剂,1 个月后,精神改善,面色转红润,大便次数减为每日不到 10 次,夜寐能安,继续服药至两个月后,体重由 55kg 增加到 58kg,卡氏评分由 55 分增加到 95 分,大便次数减为日行 4~5 次。

5 讨论

从以上病例观察表明,欣力康颗粒能升高血象,增加体重,提高卡氏评分值,增强体质,减少感冒,可见其有明显的扶正作用。欣力康使部分患者瘤体缩小,甚至消失,使 CEA、CA₅₀、CA₁₂₅ 等癌症相关抗原及血沉降低或保持正常,使癌症患者病情稳定,延缓复发或转移,充分显示了其具有较好的抗癌作用,足见欣力康是一种扶正而不助邪、抗癌而不伤正的中成药。

* 江苏省苏北人民医院,江苏省扬州市南通西路 98 号 (225001)

收稿日期:2002-07-26