

文蛤散。运用要点:本方适宜肾之阴阳两虚患者。阴虚患者宜去附子、桂枝,老年男性前列腺增生引起者多兼气滞血瘀湿热,宜合抵当丸及牡蛎泽泻散。

3.5 月经不调:糖尿病自主神经紊乱,可使神经营养障碍,微循环障碍,卵泡供血供氧不足,发育受阻而致月经不调。而月经不调又可负反馈性影响下丘脑垂体功能,导致肾上腺素、去甲肾上腺素、皮质醇、生长激素分泌增多,引起血糖升高。代表方:月经减少类月经不调:小陷胸汤、当归芍药散合下瘀血汤、四逆散。月经增加类月经不调:当归散合百合地黄汤。运用要点,糖尿病引起的月经增加类月经不调常与肥胖引起的气滞血瘀痰阻有关,故予四逆散行气,小陷胸汤化痰,当归芍药

散活血利水,下瘀血汤去胞宫瘀血,则月经复常。糖尿病引起的月经增多类月经不调,常与阴虚热郁有关,故以当归散养血清热,以百合地黄汤养阴清热。

总之,在糖尿病的治疗中灵活运用经方的前提在于对药方的深刻理解和对病机的全面把握。以上只是从临床的角度作了初步的探讨,还需要更深入的研究,但经方在糖尿病的治疗前景是毋庸置疑的。

参考文献

- 1 全小林. 消渴六论. 中医杂志, 2001, 42(4): 252—253.
- 2 周水平, 全小林, 朴信映, 等. 络通对糖尿病大鼠视网膜病变的作用及机理探讨. 中日友好医院学报, 2000, 14(6): 313—316.
- 3 全小林, 杜兆民, 周水平, 等. 辨治血糖难控因素的临证体会. 中国医药学报, 2000, 15(5): 38—40.

雷公散治疗囊虫病 80 例

陈建国*

自 1986 年开始用雷公散治疗囊虫病取得了满意疗效, 现报告如下。

1 临床资料

本组 80 例, 男 51 例, 女 29 例; 年龄 6~65 岁, 平均 36.8 岁; 病程最短 2 个月, 最长 16 年。

诊断标准: 根据 1986 年全国囊虫病专题会议确定的标准。(1)有皮下结节, 经病理诊断为猪囊尾蚴;(2)有癫痫症状并经脑 CT 检查显示有囊虫结节, 或仅有轻度的意识障碍伴有绦虫病者;(3)经血清间接凝法显示囊虫抗体阳性。以上 3 条具备第一或第二条, 且同时具备第三条即可诊断。

按照中医辨证将其分为两型。虫积痰结型: 以皮下结节为主, 四肢、躯干均可发生, 活动度好, 无压痛; 同时可伴有头晕、乏力、少食、纳呆或心悸等, 舌淡苔腻, 脉滑。痰浊上扰型: 症见癫痫发作或不同程度的精神意识障碍, 可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐以及皮下结节, 舌苔多腻, 脉多弦滑。

2 治疗及观察方法

雷公散由全蝎、雷丸、公鸡粉等药物组成。诸药洗净共研细末, 可服散剂, 也可装胶囊, 每服 10g, 每日 3 次(儿童酌减), 1 个月为 1 个疗程。服药期间禁止饮酒。服药前采用中药槟榔、南瓜子、大黄、芒硝常规驱绦虫方法。

3 疗效判定标准及结果

根据 1986 年全国囊虫病会议精神, 结合临床表现和理化检查判定为痊愈、显效、有效和无效。痊愈: 治疗后皮下结节消失, 癫痫控制, 临床伴随症状消失, 头部 CT 显示病灶吸收或钙化, 血清囊虫抗体转阴 2 次以上。显效: 治疗后皮下结节消失或明显减少, 或病理活检显示虫体已死亡, 结节纤维化。癫痫基本控制, 伴随症状显著好转, 头 CT 显示病灶有钙化, 血清囊虫抗

体虽未转阴但倍数有大幅度的下降。有效: 治疗后皮下结节有消失、缩小, 癫痫有所控制, 虽仍有发作但程度显著减轻, 间隔时间延长或由发作性癫痫转为过性意识障碍。其他伴随症状显著好转。头部 CT 显示无新的病灶发生, 血清抗体倍数下降。无效: 治疗后无变化或临床加重。

本组 80 例经治疗, 痊愈 13 例(16.25%), 显效 34 例(42.5%), 有效 30 例(37.5%), 无效 3 例(3.75%)。80 例中服药最少 1 个疗程, 最多 6 个疗程, 平均 2.86 个疗程。

4 典型病例

例 1: 刘某某, 男, 39 岁, 干部, 1986 年 8 月 30 日初诊。主症: 头痛年余, 时发癫痫, 每月发作, 近半年来发作频繁, 数日便有发作, 头痛剧烈, 目眩, 无皮下结节。血清囊虫抗体(+), 脑电图异常。诊断: 囊虫病。证属痰浊上扰, 蒙蔽清窍。给予雷公散口服, 每次 10g, 每日 3 次, 米汤送下。服药 1 个疗程各种症状大减, 至 2 个疗程症状基本消失。继续服药 1 个疗程, 各种症状消失。复查血清囊虫抗体连续 3 次均为(-)。临床判定为痊愈。随访无复发。

例 2: 王某某, 男, 24 岁, 工人, 1989 年 11 月 13 日初诊。主症: 胸、背部发现皮下结节 1 年余, 病现切片诊断为囊虫结节。血清囊虫抗体(+). 查胸、背部可见皮下结节共 10 余个。诊断: 囊虫病。证属虫积痰结, 瘀于肌肤。给予雷公散常规口服, 2 个疗程复诊结节消失, 血清抗体倍数下降, 至 4 个疗程血清抗体转阴而治愈。随访无复发。

5 体会

人体的囊虫病是由猪肉绦虫的幼虫囊尾蚴寄生在人体所引起的疾病, 尤以侵犯脑为严重。本方采用雷丸、全蝎为主药, 其中雷丸苦寒杀虫, 研粉入药, 既杀绦虫又治囊虫。全蝎辛甘平, 熄风镇惊。研究证实全蝎具有显著的杀灭猪囊尾蚴的作用。二药合用共奏杀虫、镇惊之功效。佐以公鸡粉补虚、和中、调药, 防止脾胃不和。

* 哈尔滨铁路中心医院, 哈尔滨市南岗区颐园街 37 号 (150001)

收稿日期: 2002-07-16