

为一制胃酸良药。

泛酸或吐酸为临床常见症状,脾胃病证中或以其为主症,或为胃痛、胁痛、呕吐之兼症。夫酸者,肝木之性也,吐酸多与肝、胃相关,且有寒、热之别,《证治汇补·吞酸》云:“大凡积滞中焦,久郁成热,则本从火化,因而作酸者,酸之热也;若客寒犯胃,顷刻成酸,本无郁热,因寒所化者,酸之寒也。”但吐酸总以热证多见。笔者则无论病之寒热,凡有吐酸症者,皆随方加用败酱草,常用量 15g,效不显者,可用至 20~30g。如治一程姓女患者,苦病有年,饥则胃痛,食后吐酸,手足欠温,大便不畅,舌淡苔白,脉沉。病之性属寒,故以健脾温中,化湿和胃为治。于主方中加乌贼骨、瓦楞子之属,少效;后仍守同一主方加败酱草 20g,仅服 3 剂则胃痛减,吐酸止,续服 10 余剂。随访 3 个月,病未发作。

湿热郁滞于中,随气上逆,则吞酸作矣。败酱草用于湿热之证,此其制酸之理也。

败酱草在临床上的运用

湖北省监利县人民医院(433300)

刘宇富

败酱草味辛苦、微寒,入胃、大肠、肝经。笔者在临床上治疗前列腺炎、盆腔炎、胆囊炎等疾患有佳效。兹举例如下。

1 前列腺炎

例 1:符某某,男,58 岁。1989 年 10 月 5 日初诊。患者 1 月前梦交后,出现血精。翌日到某医院诊断为“膀胱炎”,给予抗炎药服治 1 周乏效。经南京市某医院做泌尿系造影,确诊为前列腺炎;住院治疗仍 2 次梦遗血精。刻诊:面色不华,舌红少苔,眼有红丝攀睛。五心烦闷,口微干,纳差,便秘,尿黄,小腹胀热、隐胀,小腹按之微痛,脉细数。证属肾阴虚乏,下焦郁热。处方:败酱草 50g,生地黄 20g,连翘、红藤各 15g,黄柏、龟甲各 10g,山药 20g,牡丹皮、栀子各 9g,灯心草 3g,白茅根 20g。水煎服,每日 1 剂。药进月余,诸症乃缓,宗方化裁,调治月余而愈。

2 盆腔炎

例 2:陈某某,女,32 岁,1992 年 9 月 2 日初诊。患者 3 月来小腹及少腹隐痛,伴少许黄色分泌物,便秘尿黄,纳少、寐差,口微干不思饮,舌红、苔薄黄,面少华,脉沉弦。妇科检查提示:盆腔炎、宫颈炎(中度糜烂)。证属湿热郁遏下焦之候。处方:败酱草 50g,薏苡仁 30g,黄柏 8g,制香附、荆芥炭、茯苓各 10g,山药、红藤各 20g,苍术、甘草各 8g,白芍、车前子各 12g。水煎服,每日 1 剂。守方增损,迭进 20 余剂而愈。

3 胆囊炎

例 3:张某某,女,42 岁,1988 年 11 月 8 日初诊。B 超提示:胆囊炎伴水肿。症见:恶心欲吐,右上腹不适、隐痛,口苦,尿黄便秘,不思食,舌苔黄腻,舌质胖,目微黄,脉弦而数。证属中清郁热,中正失决。处方:败酱草 60g,夏枯草 15g,枳实、赤芍各 10g,郁金、茵陈、连翘各 15g,法半夏、酒大黄、柴胡各 8g。水煎服,每日 1 剂,每 4 小时服 1 次。药服 4 剂,恶心减,右胁胀痛缓,大便已通,尿清,且纳谷不佳,守方化裁。处方:败酱草 40g,薏苡仁、山药各 20g,生麦芽、生谷芽、黄精、生山楂、冬瓜子各 15g,蒲公英、郁金各 18g,甘草 5g。水煎服,每日 1 剂。守方服治月余而瘳。

败酱草治疗输卵管不畅

山东省东阿县人民医院(252201)

朱彤

败酱草,辛苦寒,能清热解毒,消痈排脓,祛瘀止痛。笔者在临床中用败酱草治疗输卵管不通有特殊疗效。对于输卵管不通(除外先天因素)者常配合入复方中应用,而对一般输卵管通而不畅者多以单味药取效。举例如下。

刘某,女,27 岁。2000 年 6 月 5 日因婚后 3 年未孕就诊。男方外生殖器及精液分析均无异常,夫妻性生活正常。女方行双侧输卵管通液术示:双侧输卵管通而不畅,曾用替硝唑、康妇消炎栓、环丙沙星等药治疗半年未果。舌暗红、苔根部薄黄,脉弦细涩。由气滞血瘀,湿热下注所致。考虑到其经济状况,笔者嘱购败酱草 400g,每取 40g,加水 600ml,水煎 2 次,煎至 300ml,兑红糖 2 汤匙,每日分 2 次服。后让其自行采集败酱草,用 100g 鲜品煎汤服如前法,经治 3 月余,妇科通液术显示,双侧输卵管通畅。又 1 月后妊娠,足月顺产一子。

重用败酱草治疗化脓性关节炎

河南省安阳市中医院(455000)

戴珍

败酱草味辛、苦、微寒,归胃、大肠、肝经,功能清热解毒,消痈排脓,祛瘀止痛。笔者多年用败酱草治疗化脓性关节炎,效果显著。现举例如下。

患者李某某,男,12 岁,1999 年 2 月 13 日就诊。双膝关节红肿、疼痛、活动障碍,伴全身高热、头痛、乏力 1 周,舌红苔黄,脉弦数。实验室检查:白细胞 $1.99 \times 10^9/L$,中性 0.8。关节穿刺:关节液混浊。X 线摄片示:关节间隙增宽,关节囊肿胀。证属热毒内蕴,治以清热解毒、凉血祛瘀。处方:败酱草 30g,黄芩 9g,黄连 6g,

梔子 12g, 桔梗 15g, 连翘 12g, 板蓝根 15g, 马勃 9g, 僵蚕 6g, 升麻 9g, 桃仁 9g, 甘草 6g。水煎分 2 次口服, 每日 1 剂。服药 1 周后关节肿痛明显减轻, 继服 5 日后双膝关节红肿疼痛症状消失, 且行动自如, 随访 1 年未再复发。

化脓性关节炎是由细菌引起的关节内感染, 常为败血症的并发症, 笔者用大剂量败酱草治疗效果稳定而持久。化脓性关节炎属于痹证的范畴, 主要由于正气不足, 感受风热之邪, 与湿相并, 素体阳盛或阴虚有热者感受外邪之后易从热化, 或因风寒湿痹日久不愈, 邪留经络关节, 郁而化热, 以致出现关节红肿疼痛, 发热等症。败酱草长于清热解毒、消痈排脓, 祛瘀止痛, 但须大量应用方可奏效。同时, 配合刺络拔罐, 效果更好。现代药理证明, 败酱草对金黄色葡萄球菌, 绿脓杆菌等有抑制作用, 故治疗效果颇佳。

重用败酱草治疗精液不液化症

山东省济宁市市中区妇幼保健院(272025)

孙 凤 兰

败酱草性微寒, 味辛苦, 具有清热解毒、消痈排脓、祛瘀止痛之功效, 常用于肠痈腹痛、肺痈吐脓、产后瘀血腹痛等。笔者运用败酱草, 治精液不液化症, 证属湿热下注者, 疗效颇佳, 现举例介绍如下。

刘某某, 男, 27 岁, 已婚。于 2001 年 4 月 25 日初诊。婚后 2 年未育。女方检查一切正常。既往有前列腺炎病史。外科检查: 外生殖器无异常。查精液常规示: 精液淡黄, 质粘稠, 60 分钟不液化, 精子活动率 60%, 活动力可, 精子计数 4000 万/ml, 白细胞(++), 辨证为湿热蕴结型, 治以清热利湿, 分清泌浊为主, 佐以活血通络。处方: 败酱草 30g, 牡丹皮 9g, 泽泻 9g, 生地黄 20g, 赤芍 9g, 丹参 20g, 菟丝子 15g, 女贞子 15g, 车前子 10g, 马齿苋 20g, 草薢 15g, 黄芪 15g。每日 1 剂, 水煎分 2 次服。服用上方加减 40 剂, 复查精液示: 30 分钟液化, 精子成活率 80%, 精子计数 9000 万/ml, 共治疗 2 个月, 其妻怀孕。

精液不液化是指射入女方阴道的精液不液化, 始终成胶冻状或团块状。在实验室中是指离体精液在室温下或 37℃ 水浴温箱中 60 分钟不液化或 60 分钟仍含有不液化的凝块, 是导致男性不育症的常见病因。中医认为, 本病多因于阴虚火旺、湿热蕴结、痰浊阻滞等所致, 属中医“精浊”范围。笔者在治疗精液不液化时, 重用败酱草, 主用于湿热蕴结型。此证表现为精液外观大部分属于黄稠状, 粘稠凝块, 有腥味。重用败酱草清热解毒, 行瘀散结, 使精液液化。有报道败酱草有降低

神经系统的兴奋作用, 解除前列腺局部肌肉血管痉挛, 增加前列腺分泌。方中败酱草与其他药物相配伍, 全方清补结合, 共奏清热利湿, 分清泌浊之功。既消除前列腺炎炎症, 促进其血运以利炎症吸收, 又改善精液质量, 以达治疗目的。

败酱草为主治疗皮肤瘙痒症

山东省曹县古营集镇洪庄卫生所(274418)

王思玉 王 鹏

败酱草为败酱科黄花败酱或白花败酱的全草, 味辛苦性寒, 功用清热解毒、消痈排脓、祛瘀止痛。近年来笔者用此药治疗皮肤瘙痒症疗效满意, 现介绍如下。

患者徐某, 男, 60 岁。近 10 年来每逢春末夏初遍身作痒, 夜间尤甚。服抗过敏药及安定方能入睡, 醒后其痒如故。症见患者全身搔痕累累, 血痂成片, 服中西药治疗多年, 有少效尚不能根除。药用: 败酱草 50g, 白鲜皮 30g, 地肤子 30g, 百部 30g, 蛇床子 30g, 苦参 30g, 加水 4000ml, 煎沸 20 分钟待温后用药液擦洗全身, 每日 2 次, 每次 20 分钟。另取败酱草 50g, 当归 20g 煎水内服, 每日 1 次。治疗 7 日, 身痒去其大半, 晚上能安然入睡。用药 14 日身痒痊愈。嘱其停用其他药物, 用败酱草 30g 泡水代茶, 服用月余。随访 2 年, 病未再发。

败酱草为主治疗带状疱疹

山东省成武县中医院内科(274200)

王 加 素

败酱草临床多用于肠痈、肺痈及热毒疮疖等。笔者运用败酱草治疗带状疱疹为临床偶得, 无论内服或外用, 都能取得较好疗效。现举例介绍如下。

例 1: 孙某, 女, 54 岁, 农民。于 1997 年 3 月 16 日初诊。左肋肋部患带状疱疹 1 天, 皮损鲜红, 疱壁紧张, 灼热刺痛, 口苦咽干, 烦躁, 大便干, 小便黄, 舌质红, 舌苔黄, 脉弦滑数。证属肝经郁热, 治拟清肝火, 利湿热。方用龙胆泻肝汤加减。处方: 龙胆草 6g, 黄芩 9g, 梔子 9g, 泽泻 12g, 木通 9g, 车前子(包) 9g, 当归 3g, 生地黄 9g, 柴胡 6g, 生甘草 6g, 延胡索 9g。连服 3 剂, 效果不显, 并述局部刺痛难忍。遂于原方加败酱草 15g, 并以鲜品捣敷患处。1 剂后疼痛大减, 3 剂后皮疹消退, 无疼痛后遗症。

例 2: 王某某, 男, 52 岁, 农民。带状疱疹后遗神经痛 3 月余, 左胸部有散在片状色素减退斑, 刺痛而惧怕触及, 夜间为重, 舌质暗红、苔白, 脉细涩。予败酱草鲜品捣敷患处, 每日 3~4 次, 6 日痊愈。