

过渡细胞。本文观察1例贮脂细胞脂滴增多,虽属个例,但此种改变是可喜的。上述结果表明,经药物治疗后,肝脏病理形态获得一定程度的好转,这一改变可能是患者肝脏功能改善的病理学基础。

参 考 文 献

- (1) 张礼邦,等. 上海中医学院学报 1988; 2(2):22.
- (2) 上海中医学院晚期血吸虫病专题组. 一年多来对晚期血吸虫病肝硬化的临床和动物模型实验治疗的初步总结汇报. 全国血研会论文汇编. 1982.
- (3) 张静波,等. 上海中医药杂志 1985; (7):45.
- (4) 莫若明,等. 家兔血吸虫病性肝硬变的实验治疗. 上海中医学院科研论文汇编 1981; (2):25.
- (5) 高俊德,等. 中药通报 1981; 6(1):3.
- (6) 唐荣江,等. 中草药 1985; 16(11):9.
- (7) 黄明明,等. 中华器官移植杂志 1984; 5(2):58.
- (8) 孙云仪,等. 中成药研究, 1984; (2):22.
- (9) 张 力,等. 药学通报 1988; 23(9):521.
- (10) 刘 成,等. 上海中医药杂志, 1986; (6):30.
- (11) 王玉润,等. 上海中医学院学报 1987; 1(1):22.
- (12) 刘 平,等. 上海中医学院学报 1988; 2(1):22.
- (13) 刘 平,等. 上海中医学院学报 1989; 3(1):25.
- (14) 王江滨,等. 临床肝胆病杂志 1990; 6(1):26.
- (15) 吴本俨,等. 中华消化杂志 1989; 9(5):284.
- (16) Abdel-latif Z, et al. Evaluation of portal schistosomiasis using ultrasound. Clin Ultrasound 1981; 9(8):409.
- (17) 刘艳华,等. 江苏医学 1986; 12(2):63.
- (18) Hirayama C, et al. Pathobiology of hepatic fibrosis. Excerpta Medica Amsterdam-New York. 1985: 913.
- (19) McGee, et al. Lab Invest, 26:429.
- (20) 席与萍,等. 中华病理学杂志 1987; 16(2):87.

溃疡散对消化性溃疡 200 例止痛效果观察

福建省泉州市中医院 林 禾 禧

溃疡散是自拟的中药散剂,对消化性溃疡的止痛效果显著,并对促进溃疡面的愈合有一定作用。近一年来笔者与八家医院合作,用溃疡散共同验证 200 例患者,并与西药治疗组作了对照。现介绍如下:

一、临床资料:以胃部疼痛为主症的消化性溃疡患者 300 例,按 2:1 比例随机分为两组,中药组 200 例,西药组 100 例。中药组中胃溃疡 25 例,其中合并胃炎 4 例;十二指肠溃疡 148 例,其中合并各类胃炎 46 例,胃癌 1 例;经临床体检确诊但未作胃镜或钡餐造影者 27 例。西药组胃溃疡 14 例,其中合并胃炎 2 例;十二指肠溃疡 71 例,其中合并各类胃炎 22 例;经临床体检确诊但未作胃镜或钡餐造影者 15 例。

从疼痛程度来看,疼痛中度,呈痛苦面容,无坐卧不安者,中药组 159 例,西药组 82 例;疼痛重度,呈疼痛难忍,坐卧不安者,中药组 41 例,西药组 18 例。两组各项情况基本一致,具有可比性。

经辨证,中药组胃热证 78 例,胃寒证 75 例,寒热夹杂证 44 例,其他 3 例。

二、治疗方法:中药组单纯服用溃疡散。溃疡散由进口冰片、凤凰衣、元胡、芡实、海螵蛸、浙贝母组成,其重量比例为 3:10:10:33:33:33。以上药物去杂质,后五味药研细粉,过 120 目筛,加入研细的冰片混合成散剂,装瓶内备用。患者胃痛发作时,每次口服 3 克,用温开水送服。西药组每次口服片剂 654-2 10 mg,温水送服。

三、疗效分析:

1. 疗效标准:服药后 30 分钟内胃痛消失,观察 60 分钟胃痛不复发为显效;服药后 30 分钟内胃痛减轻一个级度,或服药后 60 分钟内胃痛消失为有效;服药后 60 分钟胃痛未见消失为无效。

2. 治疗结果及分析:中药组获显效 163 例 (81.5%),有效 25 例 (12.5%),无效 12 例 (6.0%)。西药组获显效 46 例 (46.0%),有效 39 例 (39.0%),无效 15 例 (15.0%)。中药组疗效明显优于西药组 ($P < 0.01$)。经分析,溃疡散对中、重度胃痛疗效基本一致,其显效率均在 80% 以上。中药组胃痛消失时间平均为 14.5 分钟,10 分钟内消失者占 53.7%。西药组胃痛消失时间平均为 21.9 分钟,10 分钟内消失者仅占 11.8%。溃疡散对胃溃疡的止痛显效率为 57.1%,对十二指肠溃疡的止痛显效率为 91.1%。溃疡散对胃热、胃寒、寒热夹杂证等消化性溃疡疗效基本一致。

四、体会:经临床观察来看,溃疡散对消化性溃疡引起的疼痛有良好的止痛效果,其疗效显著优于 654-2。本散剂长期服药无副作用,制酸效果良好,一般连续服用 1~2 月,对溃疡面的愈合或缩小,均有一定的作用。本散中含有冰片,个别患者难于入口,因此制剂有待进一步改进提高。

本工作得到许振宜、涂钟馨、王启章、黄英伟、许孙育、徐建生、周来兴、卓显良、陈诗途以及有关医师的协助,谨致感谢。