

脓疡散加减治疗肝脓肿6例报告

北京儿童医院 燕润菊 刘慧丽 陆淑良

肝脓肿,中医称为肝痛。我科在1979~1986年期间,采用清热解毒、活血化瘀的脓疡散加减,治疗肝脓肿患儿6例,取得较为显著疗效,现报告如下。

一、一般资料

本组6例,男4例,女2例;年龄最小1岁8个月,最大12岁;病程最短20天,最长75天。临床表现为长期发热及右上腹疼痛,不能向右侧卧,拒按,面色萎黄,精神萎靡,胃纳呆滞,消瘦。体检,肝脏均有不同程度肿大,肝区有触痛和叩击痛,2例右下肺叩诊浊音,呼吸音减弱,舌红或红绛,苔黄,脉弦数。实验室检查:外周血白细胞总数及中性粒细胞均有增高,血红蛋白有轻、中度下降。肝功能检查4例不正常。X线透视均见肝影增大,膈肌升高,活动受限,有反应性胸膜影。1例脓培养有白色葡萄球菌生长。6例均做肝脏超声波检查,2例做了肝脏扫描,均确诊为肝脓肿。

本组6例患儿入院前均经多种抗生素治疗,最短治疗2周,最长达1个半月,疗效均不满意,发热不退,肝区痛未消失。1例曾做剖腹手术2次,从肝右叶引流出大量脓液,临床症状仍未得到控制。

二、治疗方法和结果

脓疡散处方:青黛3克,紫草9克,寒水石9克,乳香6克,牙皂6克。以上为一剂量,每日一剂,每剂煎100~200毫升。3岁以内患儿,日服三次,每次服30毫升;3~7岁患儿,日服三次,每次服50毫升;8~12岁患儿,日服二次,每次服100毫升。住院治疗期间未用过抗生素。

本组6例全部获治愈出院,平均服药26剂。退热时间平均为13.5天,肝区触痛和叩击痛消失、肝大消失、精神食欲改善平均为20

天;平均住院时间为25.7天。

三、典型案例介绍

张×,男,11岁,入院日期1986年4月7日,病案号134299。患儿间断发热已有2个半月,入院前曾在外院行2次剖腹手术,从肝右叶引流出大量脓液,脓培养有白色葡萄球菌生长,经多种抗生素治疗无效。入院后查体:发育营养中等,精神萎靡,面色黄,皮肤无黄染及皮疹,心肺检查无异常,腹软,右上腹可见4厘米长手术疤痕,右上腹有触痛,肝区有叩击痛,肝脏在剑突下2厘米处可扪及,莫菲氏征阴性,舌红苔黄,脉弦数。实验室检查:肝功能正常,血培养阴性,血白细胞总数 $21300/\text{mm}^3$,中性粒细胞85%。十二指肠引流未成功,经腹部B超诊断为肝左叶多发性小脓疡。入院后给予输血等支持疗法,未用抗生素,单纯用中药脓疡散治疗。服药7剂,体温由持续高烧 39°C 降至低烧 37.5°C ;服药14剂,体温恢复正常;服药30剂,肝区触痛和叩击痛消失,肝大消失,复查血白细胞总数及中性粒细胞均恢复正常。于1986年5月14日痊愈出院,共住院37天。出院后一年随访,复查肝B超未见异常。

四、讨论

中医称肝脓肿为肝痛,认为本病由毒热内蕴,肝失条达,气滞血瘀,腐败成脓酿成。脓疡散为已故老中医王鹏飞的经验方,方中青黛清热解毒、凉血散肿,善清肝胆郁火;紫草清热解毒,兼能凉血活血;乳香行气活血、散结消肿,为外科痈肿要药;寒水石性寒凉,专清里热;牙皂活血消痈,排脓消肿。诸药合用共奏清热解毒、活血化瘀、排脓消肿之效。根据我们的临床观察,本方能改善病灶的血液循环,减轻其病理损害,促进炎症吸收,对感染性疾病的治疗确有良好疗效。