

正如《内经》所谓“寒气入经而稽迟，泣而不行，……客于脉中则气不通，故卒然而痛。”另外肝肾两经均循行于腹部，肝经复络于阴器，恰是尿石症绞痛发作之部位。足见本病实以肝肾两经阳气匿虚、寒邪内盛，湿浊阻滞为根本病因病机，颇类古之“寒疝腹痛”。缘其肝失疏泄条达，肾失温煦蒸腾，釜底无火则水湿不得气化，寒湿滞留肝肾经络，久积乃成砂石而为祸乱之由，符合《内经》“阳化气”、“阴成形”之特征。治宜遵循“寒者温之”、“虚者补之”大法，同时佐以肃降肺气、开郁去痹之品。方予自拟鹿角霜饮为主随证化裁施治。主方如下：鹿角霜 30~60g，菟丝子 30g，乌药 15~30g，杏仁 15g，桔梗 15g，葶苈子 15g，川牛膝 15g，滑石 30g，全蝎 6g，甘草 3g，水煎服，日 1 剂。连服 10 剂，停 2 日后续服 10 剂为 1 个疗程。方中重用鹿角霜为主药，以其温而不燥，补而不腻乃为首选，伍以菟丝子、乌药以助其温通阳气之功，力专效宏；复佐杏、梗、葶苈宣肃肺气、通调水道，牛膝、滑石引药下行以为向导，且有逐瘀通窍之能；全蝎、甘草搜剔通络，缓急止痛。诸药集温、补、通、缓于一炉，药甫寒散阳复、湿化络通而病可瘳。另止痛后需继续治疗，慢功缓图，方可使结石尽量排出，以防复发。多年来共治疗 140 余例，统计资料完整者 64 例，治愈 39 例（临床症状消失，结石排出，经 X 线、CT、B 超证实结石影消失、肾盂积水消失），总有效率 94%。

综上所述，泌尿系结石主要病机在于肾肝阳虚、肺气痹窒所致之寒湿阻遏、气化不利。部分患者可见湿热征象，多系寒湿久困、从阳化热使然，故临证不应胶柱于清利通淋一途，温通法更切实用而有事半功倍之效。上述方药久用，亦未见伤阴助热等明显毒副作用。重用诸药，系借鉴清代吴鞠通“治下焦如权，非重不沉”之宝贵经验。应用时需随症加减。

鹿角霜治疗直肠癌性溃疡

四川省医药学校医院(614201)

彭 富 祥

直肠癌晚期溃疡，病家正气已虚，大肉渐脱，中气下沉，整日腹胀腹痛大便堵塞难出，或出则脓血便俱下。此时治疗若能带病延年，也算疗效。受阳和汤治阴疮用鹿角胶之启发，选扶正托毒，敛疮泄浊，内服外用均有效的鹿角霜为主药碾粉吞服，临床治疗直肠癌性溃疡有效。

病例 1：薛某，男，60 岁。2000 年 3 月初诊。患者困倦消瘦食少，面觥白，出冷汗如油。腹胀痛，大便堵塞不出和出则脓血粪便俱下交替。诊断：晚期直肠癌，癌性溃疡。处方：鹿角霜 30g，西洋参 10g，均碾细粉。葛根

50g，土茯苓 50g，生甘草 30g，生大黄 5g，水煎分 3 次送服鹿角霜、西洋参粉，每日 1 剂。连服 10 剂，腹胀痛减轻，大便每日 3~4 次，脓血粘液便减少。前方又连服 20 剂，腹胀痛偶有，大便已通，脓血便停止，食欲增强，体重增加。但解便时仍有肿物卡塞不畅感。再拟鹿角霜为基本方，间断服 80 余剂，未出现过脓血便。随访 2 年余，患者有力有神有食欲，可下田劳动。

病例 2：陈某，男，65 岁。1998 年 5 月初诊。患者直肠癌切除（未改道）术后，完成化疗。肛周放疗后出现溃疡，直径 5~6cm，尾骨外露。停止放疗后溃疡呈菜花状。大便时脓血粪齐下。大肉已脱，但食欲尚旺。病属晚期，气血大伤，中气已沉，湿毒内陷。治拟托毒宣肺，温阳泄浊，收敛生肌。处方：鹿角霜 30g，西洋参 15g，均碾细粉。葛根 50g，土茯苓 50g，生甘草 30g，仙鹤草 30g，生大黄 3g，附子 10g，麻黄 10g，水煎送服鹿角霜、西洋参粉，每日 3 次。溃疡处常规外科换药，菜花样瘤块烧灼祛腐。上药每日 1 剂，连服 10 剂，精神好转，食欲增加，溃烂肛门开始收敛。又进 15 剂，肛周溃疡缩小，外露的尾骨上出现肉芽覆盖。又再 15 剂，菜花样瘤块消失，肛周溃疡已缩为 1cm 大小。后继续服用前方，但溃疡始终未全部愈合，也没扩大。带病延年 3 年 8 个月。

鹿角霜为主治疗乳腺小叶增生

山东省蒙阴县人民医院(276200)

柳鲁临 孔凡英

鹿角霜为鹿角熬胶后所存骨渣，味咸，性温；功能益肾助阳，补力虽弱但不滋腻，且有收敛作用；可治肾阳不足，脾胃虚寒，妇女子宫虚寒、崩漏、带下等症。我们在临床实践中，以鹿角霜为主药治疗乳腺小叶增生，疗效甚佳，现介绍如下。

1 一般资料：本组 250 例患者均为中医妇科门诊病例，年龄 25~54 岁，病程 7 天~12 年，均符合乳腺小叶增生诊断标准〔中医杂志 1995；36(8)：484〕。

2 治疗方法：鹿角霜 15g，夏枯草 15g，淫羊藿 15g，柴胡 10g，橘核 20g，荔枝核 20g，麦芽 60g，女贞子 15g，知母 6g，黄柏 6g。水煎服，每日 1 剂。

3 治疗结果：乳房肿块及疼痛消失，各项检查正常，稳定 6 个月未复发者为痊愈，共 170 例。乳房肿块缩小 $>1/2$ ，其他症状明显减轻，各项检查明显改善为显效，共 48 例。乳房肿块变软，缩小 $<1/2$ ，其他症状减轻，各项检查好转为有效，共 22 例。症状、体征与治疗前比较无改善者为无效，共 10 例。总有效率为 96%。

4 体会：乳腺小叶增生的发病机理，目前多认为是卵

巢功能失调后体内雌激素量相对增高,黄体酮分泌减少,引起乳腺导管上皮和纤维组织的不同程度增生,末梢腺管或腺泡有囊肿形成,导致乳腺结构上的变化所致。本病属中医乳癖、乳疔范畴,中医学认为,其病机主要为肝、脾、肾之虚损,肾阴肾阳消长转化失常,肝郁气滞、血瘀痰凝结于乳络、乳络不通而发为本病。方中用鹿角霜合夏枯草散结、化痰、消肿,鹿角霜配淫羊藿调补肾阳,知母、黄柏相须为用以滋肾阴之不足,柴胡、橘核、荔枝核、炒麦芽舒肝理气、止痛、通乳络。诸药合用共奏补肾理阴,舒肝理气,通乳络,散结化痰,消肿止痛之功。多年来每遇乳腺小叶增生患者,必用鹿角霜为主药,收到良好的治疗效果。

鹿角霜治疗慢性淋巴结炎

山东省临朐县人民医院(262600)

宋新安

20年前,笔者见同诊室的宫老先生诊治一患者,症见颌下部位肿大,皮色正常,触之有硬结,不热,微痛,经久不愈。诊为阴疽(慢性颌下淋巴结炎)。处方:鹿角霜 90g,研极细末,用麻油调涂患处,日涂2次,不日即愈。乃请教其医理,宫老先生曰:鹿角霜性味咸温,咸能软坚散结,温能通络消肿,故治阴疽有效。后来笔者在临床上试用此法治疗慢性淋巴结炎10余例,均收到良效。

如治马某,女,12岁。1990年3月10日初诊。诉右腮下触及肿块半年,不红,不热,触之稍痛,曾用消炎药治疗,疗效不佳。遂请中医诊治。观其右颌下部位肿大,皮色不变,触及1cm×1cm大硬结,触之微痛,不热,舌淡苔白,脉细。初诊:慢性淋巴结炎。处方:鹿角霜100g,研极细末备用。每次取10g,用麻油调涂患处,敷料包扎,每日换药1次。7日后复诊,患处肿消大半,继用上法治疗3天,病愈。

鹿角霜治疗卵巢囊肿

山东省沂源县人民医院(256100)

叶因朴

鹿角霜味咸性温,可治肾阳不足,血虚精寒,崩中漏下以及脾胃虚寒,呕吐食少等症。笔者临床重用鹿角霜治疗卵巢囊肿24例,取得了满意效果。

组方:鹿角霜30g,熟地黄20g,白芥子30g,干姜10g,半夏12g,陈皮10g,浙贝母10g,带下偏多者加蒲公英30g,水煎服。

如治周某,女,46岁。B超查体发现左侧卵巢多发性囊肿,最大者4cm×5cm,带下偏多,全身有乏力感,

月经后期,舌苔薄白、舌质淡红,脉沉。即予上方,水煎服15剂,B超复查囊肿消失。

该方为阳和二陈汤加减,笔者原用该方治疗上石疽(颌下腺炎),每收良效。卵巢囊肿中医属症瘕范围,具“阴疽”“痰饮”的病机特点,故重用鹿角霜为君药。其含磷酸钙、碳酸钙、氯化物等,并含一定量雄激素,其味咸,故能温阳散寒,软坚散结。以熟地黄、干姜为臣药,增其温阳散寒之力。佐以二陈汤燥湿化痰,消痞散结,使以白芥子辛温气锐,性善走散,助二陈汤豁痰饮,利气机,通经络。故凡痰阻气机,痰留经络,皮里膜外者无不能除。本方善温养精血,并祛寒饮而不伤生生之气,疗效可靠。

鹿角霜治疗小儿遗尿

宁夏回族自治区平罗县中医院儿科(753400)

梅明

鹿角霜味咸性温,归肝、肾经,功善补肝肾、益精血、强筋骨。笔者在临床实践中,常在辨证论治的基础上重用鹿角霜治疗功能性小儿遗尿症,一般用量15~25g,经长期临床观察,疗效显著,用药安全,无明显毒副作用。临证可根据不同证候灵活配伍,若下元虚寒合桑螵蛸散加巩堤丸加减;脾肺气虚合补中益气汤加缩泉丸加减;肝经湿热合龙胆泻肝丸加减。

如治某女,10岁。尿床5年,冬日尤甚。曾多次就诊,排除有各种器质性病变,服中、西药物3年,疗效不佳。查体形略胖,发育正常,平素怕冷,学习较差,舌体胖大边有齿痕,舌质淡,脉细。证属肾督虚寒,膀胱失约。处方:鹿角霜20g,桑螵蛸9g,益智仁9g,怀山药9g,乌药9g,炙黄芪9g,生牡蛎9g,补骨脂9g,鸡内金6g,五味子5g,水煎服。上方共服10剂后,症状明显好转,再服5剂痊愈。随访1年,未见复发。

功能性小儿遗尿是由于大脑皮质及皮质下中枢的功能失调引起。小儿大脑特别富于蛋白质,而类脂质、磷质和脑苷脂的含量较少,若此时营养物质特别是脂类物质吸收不良,容易影响大脑皮质发育。鹿角中含有丰富的蛋白质、氨基酸和磷脂类、糖脂类、胆固醇及钙、磷等,对脑的发育有很大的帮助。中医认为,遗尿属肾督不固,下元虚冷,膀胱气化失司,不能约束小便,且髓海不充智力未全,对排尿自控能力差所致。鹿角为血肉有情之品,既可补肾固督,温补下元以助膀胱气化,又能益精填髓益智,制成霜剂后虽温补之力减弱,但不滋腻,无壅遏脾胃之弊,符合小儿纯阳之体,脾常不足,运化较弱的生理特点。同时还可收敛固涩缩尿,对于治疗小儿遗尿显示出独特的疗效。