

基础上又经过多年临床实践和反复探索,终于拟定出协定处方大黄调经汤,疗效较前续有明显提高。本方可通用于本病各证型,便于临床掌握运用。方中大黄一味泻火凉血,逐瘀通经,炒用更能止血,为本方主药,配以三七、元胡、当归、蒲黄炒阿胶、炒地榆可增强活血止血、止痛之力。因失血而致气血亏虚,气虚则无以

载血,又能加重出血之症,故用术、苓、芪补脾益气,脾气健旺,既能统摄经血,又能化生气血。用香附、柴胡、当归、阿胶疏肝养肝,生地、熟地、巴戟天补肾固冲。大黄、黄柏、地榆与当归、三七、黄芪、巴戟天等药同用,其清热解毒燥湿之功尤著,对于慢性炎症的消除有较好的疗效。

羊洪膈治疗冠心病和高血压病466例分析(摘要)

陕西省中医药研究院附属医院内一科心血管病组

雷忠义 苏亚秦 吴亚兰 戴淑芬
党俊民 常世安 金美煊 王莎莎

羊洪膈 (*Pimpinella thellugiana* Wolff) 系民间中草药,常用于防治家畜衰老性疾患,六十年代初曾用于防治克山病取效。1975年我们用以治疗冠心病取得较好疗效,1977~1987年间我们又先后五次继续对冠心病、高血压病进行系统治疗观察,积累了一定资料。现将466例的临床总结摘要报道如下。

一、对象与方法

1. 病例选择与分组: 冠心病263例,年龄均在40岁以上,随机分为羊洪膈治疗组(简称观察组)178例,心得安治疗组(简称对照组)85例;高血压病203例,均为II期以上患者,年龄多在40~60岁之间,随机分为观察组105例,对照组98例。

2. 治疗方法: 观察组服用羊洪膈糖衣片(本院药剂科制备),每片含生药13.4毫克,每日三次,每次4片。治疗30天为一疗程,停药一周后继续下一疗程治疗,治满2个疗程统计疗效。对照组服用心得安糖衣片,每片含心得安3.33毫克,服药方法和疗程同观察组。治疗期间生活、工作、饮食均不加限制。

二、结果

根据1979年全国心血管病流行病学和人群防治工作座谈会上所拟定的疗效标准判定疗效。

1. 冠心病: 观察组有心绞痛64例,对照组有59例。治疗结果: 观察组获显效18例、改善29例、无效17例,总有效率为73.4%;对照组分别为11例、21例、27例,总有效率为54.2%。两组的心绞痛疗效相比较无明显差异($P>0.05$)。

观察组中有63例统计心电图疗效,结果获显效15例、改善23例、无效25例,总有效率为60.3%;对

照组统计心电图疗效62例,结果分别为7例、23例、32例,总有效率为48.4%。两组心电图疗效相比较,差别也不显著($P>0.05$)。

据临床观察,观察组有一定的抗胆固醇血症作用,而对照组服药后甘油三醇明显升高。两组均能明显减慢心率及心肌张力时间指数。观察组治疗后左室收缩前期(PEP)明显缩短,而对照组则可见到左室收缩时间(LVET)延长。此外,治疗后观察组红细胞电泳活动能力增强,全血粘度改善,机体免疫功能也得到调整,而对照组则无此类作用。

2. 高血压病: 比较两组的降压疗效。观察组105例,治疗后获显效50例、有效22例、无效33例,总有效率为68.6%;对照组98例,治疗结果分别为39例、31例、28例,总有效率为71.4%。组间比较差异不显著($P>0.05$)。在降舒张压疗效上观察组优于对照组。

三、毒副反应

观察组服药后有口干24例,嗜睡9例,腹胀6例,恶心9例,未及停药即自行消失;治疗后经作胸透、眼底检查以及肝功能和血、尿常规化验均无明显改变。对照组服药后多数出现较重反应如头晕、乏力、恶心、心率缓慢、I°房室传导阻滞、短暂晕厥等。

四、小结

十余年的临床实践证明,羊洪膈与心得安均有减慢心率、降低心肌氧耗、降低血压、抗心绞痛等作用,但羊洪膈有优于心得安方面,如毒副反应小,并有正性肌力作用、改善血液流变学作用等,值得进一步深入研究。